



Mr. J.

Van der Horst, C.R.

477 <sup>to</sup> (2,1)









**D E**  
**A R T E M E D I C A .**



**C. PRUYS VAN DER HOEVEN,**

DE

**A R T E M E D I C A,**

**LIBRI DUO AD TIrones.**

---

---

**LIBER SECUNDUS.**

**DE MORBIS CHRONICIS.**

**PARS PRIOR.**

---

---


**LUGDUNI BATAVORUM,**


**APUD S. ET J. LUCHTMANS,**

**Academiae Typographos.**

---

**1859.**





---

*Medicina Temporis filia.*

---

Bayerische  
Staatsbibliothek  
München

DE

ANTONIO DE HAEN

MEDICINAE PROFESSORE MERITISSIMO.

---

---

*Luctor et emergo.*

---

---

---

BOERHAAVII disciplina eo praecipue nomine celebranda est, quod germanam HIPPOCRATIS doctrinam sartam tectam servaret ac posteritati traderet: quo factum est, ut medias inter rerum vicissitudines opinionumque turbas non interiret parva gens Hippocraticorum. Ex hoc fuit numero scholae Boerhaavianae decus et ornamentum, ANTONIUS DE HAEN, cujus viri excellentis merita renovando hanc operis nostri partem quam optime auspicabimur.

*Is quam praeceptore BOERHAAVIO didicerat scien-*



tiam, eam tanto prosequeretur studio, ut Dissertatione sua inaugurali ejus patrocinium susceperet adversus iniquas doctorum, semidoctorum indoctorumve calumnias atque sic causam defenderet suam, ut theoriam Anatomicorum principum suique etiam ALBINI, HARVAEI denique inventis immortalibus; praxin vero rationis Hippocraticae excellentia cum maxime vindicaret, cujus, ipso praecipiente, historia testis est, quanta molis esset medicam condere artem.

Nequaquam vero, ut solent fere noviter creati doctores, pulcerrimos atque uberrimos sibi spondebat studiorum et honorum Academicorum fructus. Nam praedixerat ei venerandus medicinae parens earum artium e numero esse, quae quum communi bono quam plurimum conferant, exercentibus sese nil nisi molestias creant.

Ipse vero quali mente arduam hanc provinciam aggressus sit, haec illius verba significant, quibus dissertationis scribendae finem fecit. » Itaque salutem proximi prae oculis habens solumque in tuta conscientia Deum testem intuens, hujus

*mihi favorem, artis exercitium auspicaturo imploro, ipsi acceptum relaturus, quidquid in humanarum calamitatum solamen vel docte excogitavero, vel rite administravero, vel probe gesserō." Et sane fidem solvit: siquidem eo auctore haec nobis professio salutaris increvit plurimum. Nimirum non ille ut vulgus medicorum lucri quaerendi causa artem fecit, sed BOERHAAVII ad exemplar verum et quaerere et sequi et tradere aliis, commendare, laudare denique non desiit.*

*Testentur doctae HAENII, tunc temporis medici Hagani, de colica pictonum deque deglutitione impedita commentationes, doctarum lucubrationum fructus saluberrimi.*

*Damnabat enim abjectos illorum animos, qui officium medici atque dignitatem metiri soleant fama, honore, pecuniis: quum contra religio nos cogat animo longe alio medicorum officium intueri: esse scilicet eos a divina providentia eo destinatos, ut quaecunque vitae humanae in sanitate tuendae labentique resarciendae, quondam sint prodesse visa, haec illi, qua sedulitate atque accura-*

tionem et possint et debeant, cognoscere studeant  
satagantque intelligere: quae vero obscura quaeque  
prorsus latent abscondita, haec eadem erucere e  
tenebris ac memoriae prodere, quovis molimine  
pertinent. Lege porro inviolabili eosdem id ut  
assequantur, teneri. Futurum enim diem, cum  
Supremus Iudex, quae cuique commiserit confisus-  
que talenta sit, cum foenore sit repetiturus.

Eruditionem vero medicam quo loco habuerit,  
jam prius in Dissertatione declaraverat inaugu-  
rali, eorum refutans opinionem, qui hanc sper-  
nentes solum usum artis difficillimae magistrum ja-  
clant: » medicinam cum unoquoque medico renasci  
velle, haud minus foret absurdum, ita juvenem  
audimus docte prudenterque disputantem, quam  
velle nauclerum quemque solo observatu discere et  
indefessa indagine expiscari oportere astrorum  
fixorum errantiumque doctrinam, juxta quam na-  
vim dirigeret et nauticam acumen vimque, qua do-  
natur, magneticam; geographicas quoque tabulas,  
quae regiones, quo pergendum, quae scopulos evi-  
tandos rupesque indigent. Sane millena prius

*naufragia erroresque contingerent, quam rudis quisque homo Palinurus fieret."*

*Inprimis vero qualis quantusque medicus fuerit HAENIUS adparuit, postquam SWIETENIO suasore, Viennam medicinae Professor vocatus, praeclaro hoc munere fungebatur.*

*Sic in Germaniam institutionis Batavae fructus transportare, inter Germanos novam BOERHAAVII scholam fundare, medicinam Hippocratice tradere, Hippocratice amplificare ipsamque antiquo splendori restituere, auctore SWIETENIO, studeat. Hoc autem consilium quo pacto sit executus, scire cupientibus ostendet illius Ratio medendi, disciplinae Hippocraticae monumentum, quod ad omnem omnino posteritatem laudes nomenque viri traducet.*

*Professoria institutio id vulgo incommodi habet, ut scientiam proponat auditoribus complam, ornatam, ac prorsus admirabilem, qualis nec est, neque futura est umquam: quo fit, ut quum ex scholae umbris in mediam hominum vitam prodeant juvenes, crebro decipiantur pluresque res,*

quae prius non sine molestia didicerant, postea dediscere cogantur. Quam alienum habuerit animum ab hoc professorio fastu HAENIUS, declarant editae compluribus locis querelae de signorum fallaciis, remediorumque incertitudine ipsiusque medicinae imperfectione. Nec tamen hic substitit: sed strenuam operi manum admovit, perpetua auctorum optimorum lectione ac commentatione, cadaverum inspectione, prudenti cautaque periclitatione: ac ubicunque vel morbum offenderet minus cognitum, vel signum ejus aut causam obscuram, vel incertum dubiumque remedium, omni labore ac studio rem illustrare, indagare, absolvere conabatur, neque a labore remittebat, priusquam suo potitus erat fine: immo siquid novi delegeret postea, aut inveniret, quod rei antea tractatae lucem affundere posset, denuo ad laborem intermissum revertebatur, neque umquam a mente cogitationeque demittebat: quae causa est, cur in scriptis ejus tot capita iisdem nominibus inscribantur.

Erat illud animo ejus insculptum: vitam im-

pendere vero. » *Deo vivimus, inquit, et proximo, vivimus veritati, non patri fallacias et mendacii, diabolo.*» *Eaque mente monitos suos lectores voluit, ut quae observata communicaret, ea novis dignarentur experimentis urgere sique forsitan violasse hinc inde prudentiae regulas videretur, ut id publico, suo etiam expresso nomine, palam facerent.*

*Medicam scientiam Academiae civibus non fictam tradebat, quae saepenumero traditur discen-  
tibus, ex opinione natam, sed, qualis revera est,  
mancam adhucdum et imperfectam et incertam  
omnino, et dubiam. Accipite quaeso praeceptoris  
optimi et veritatem et scientiam et discipulos suos  
vere amantis egregie dicta.» » Audire mihi vi-  
deor, qui conquerantur, medicinam a me incer-  
torem reddi, a me scilicet, cujus foret, proprii  
vi muneris, eandem tironibus reddere quotidie  
certiorem. Hos autem rogatos velim, quo demum  
pacto artis exoptent certitudinem? An suffocan-  
do naturae vocem, quae ut aliis, sic et mihi eam  
falsam esse clamet, quam hucusque credideramus*

*certitudinem? Profecto, qui nihil prius veritate habent, aegre non ferent, me medicinam non aliam tradidisse, quam eam, quae minime a systemate opinioneve, verum ab ipsa natura depicta, descriptave fuerit."*

*Nolite tamen existimare, ex eorum fuisse HAE-  
NIUM numero, qui de omnibus rebus dubitando,  
aliorum sententias refellendo magis, quam defen-  
dendo suas excellunt, quique sacram scientiarum  
causam deserere potius, quam tueri velle viden-  
tur. Nam ipse neque scepticus, neque empiricus;  
verum ex dogmaticorum erat familia medicorum-  
quasque invenerat veritates eas mordicus tenebat,  
et defendebat acriter. Hinc classicam HIPPOCRA-  
TIS BOERHAAVIQUE disciplinam summis laudibus  
extollere ac custodire suisque proponere, numquam  
desiit. Hinc vana inoculatorum promissa derisit.  
Hinc nova placita HALLERI de sensu partium,  
quae morborum phaenomenis suaeque pathologiae  
non viderat consonantia, impugnavit. Hinc Bor-  
devianas de pulsu haereses damnavit, postquam eas,  
per multos annos etiam coram studiosa juventute*



*ad aegrorum lectulos examinasset. Hinc auctorum Francorum reprehendit judicii temeritatem; qui HIPPOCRATIS opera titulo meditationis mortis excipere ausi sunt: non minus miratus, quam dolens, quod ii, qui magnorum medicorum auctoritatem ac famam ambiunt, ejusmodi calumniarum se praestent fabros. Hinc iis, qui ab Hippocratico naturae studio temere aberrant practicis, objicit sententiam immortalis inter Anglos medici RADCLIFFE: qui cum medicus quidam propter aegrum febre acuta laborantem eodem, quo leve purgans sumpserat die, ex hypercatharsi mortuum, accusaretur isque medicamenti lenitatem adlegaret, hoc judicium protulit: fuisse intempestivum, impeditam inde crisin adeoque occisum aegrum.*

*Ecquid mirum, HAENIUM acrem rerum medicarum censorem, praesertim senior cum esset, in controversiis subinde fuisse acerbiorum: quod, ut cum STOLLIO, posthumorum operum editore, dolemus, ita laetamur, ex hac nostra BOERHAAVII schola prodiisse, qui etiam apud externos methodum Hippocraticam, quae ipsius est methodus na-*

*turae, promovit ac praestantem illam BOERHAAVI  
propagavit institutionem: scriptis denique et exem-  
plo ipse suo docuit, qua quam optima ratione ars  
Hippocratica coli et juventuti Academicae tradi  
oporteat.*

Scribebam in villa d. 16. m.

Julii a. 1839.



---

## DE MORBORUM CHRONICORUM DOCTRINA.

**A**pud veteres de medicina scriptores in more erat, morbos longos, chronicos a brevibus acutisque secernere deque singulis seorsum exponere. Hunc veterum morem nunc negligere, vel etiam carpere medici solent, quia nec suos cuique generi characteres certos atque constantes adscribere licet, neque suos cuivis ponere limites. Ego qui veterum ea in re simplicitatem, nostrorum vero hominum sapientiam miror, cur simpliciores maluerim, quam sapientiores imitari, sinite me o Amici! quam brevissime potero, significare.

Quod in caeteris quidem doctrinis et cognitionibus hominum animadvertimus, idem in hac quoque medicina nostra observamus: ars fuit, priusquam scientiae nomen ac dignitatem sibi sumpserit. Jam pridem, quo tempore ars erat, haec

*Lib. II. Pars I.*

\*\*

morborum acutorum et chronicorum reperta est distinctio. Ubivis in veterum scriptis chronici acutis, acuti chronicis opponuntur, conferuntur, comparantur rursusque segregantur ab invicem. Hoc tempore esse morbos acutos, esse chronicos; nullus dubitavit: priores celeriter et cum periculo decurrere, alteros tarde et sine ea periculi propinquitate: in illis et febrim esse et crises et omne symptomatum activorum genus, in hisce deesse: illos brevi tempore eventum expectare, hos diu admodum aegros prehendere: illorum promptam esse debere curationem, horum tardam omnino; utrumque suum exigere artificem: alterum ingenii celeritate, alterum cunctandi prudentia insignem. Haec illi, quo tempore ars erat medicina. Nos, quum utrum jam scientiae nomine ipsum condecoremus, nesciamus, interim quasi ars foret, hactenus ea veterum auctorum placita paulisper interpretabimur deque hoc morborum chronicorum genere colloquemur.

Si comparemus auctores, qui de morbis acutis egerunt, cum iis, qui morbos pertractarunt chronicos, horum doctrina quam ardua sit, perspicimus. Aut quid caussae esse putatis, cur cum

tot tantique viri ingentem ediderunt librorum eorumque lectu dignissimorum copiam, in quibus acutorum rationem, genera, praesagia, curationes tradiderunt, tanta sit eorum paucitas, qui de chronicis exposuerunt, quid inquam caussae esse putatis, nisi ipsam hanc rei difficultatem? Nimirum acutorum signa vel ignarus quisque et imperitus advertit: adeo manifesta sunt inque sensus incurrentia; chronicorum vero symptomata vel expertos latent saepe maximeque peritos: tamque occulta sunt, tam a sensibus remota, ut medico divinatore magis, quam observatore videantur egere. De horum loquimur initiis morborum, quae prudentissimos etiam fallunt interdum. Sunt autem eo accuratius praescienda, detegenda, observanda, notanda, quo magis in ipsorum curatione Nasonis illa vox audienda est: *principiis obsta*. Accedit magnus chronicorum in his praesertim regionibus numerus lateque extensum dominium, ex quo praevideo ac praesentio, longe majorem aegrorum vestrorum partem ex genere chronicorum fore. Quapropter quo major est rei difficultas, eo majori etiam virium contentione nitendum, ut eam superemus.

Quaecunque igitur ab optimis artis magistris propriaque observatione de hoc morbi genere didicerim, ea vobis tradam quam fideliter, ut qui meae uti institutione velint meque in his studiis sibi optent ducem, ad hos quoque morbos curandos non imparati accedant artifices. Mihi enim nihil antiquius est nihilque prius, quam vestris, id est amicorum, inservire commodis et utilitatibus. Verum e diverticulo in viam.

Veteres acutorum nomine dicebant, qui celeriter et eum periculo decurrunt: in chronicis igitur et tardum decursum requirebant et periculi urgentis et febris absentiam. Erant haec vulgaria maxime cujusque classis signa. Nam licet quaedam sint ex genere chronico, quae non ita diu corpus tenent, qualis apoplexia est, haec tamen altero illo caret acutorum signo, febre videlicet: et quamvis ab altera parte subinde febris morbos chronicos comitetur, haec minus ad ipsorum naturam, quam ad symptomata accidentaria pertinere dicenda est. Nam vulgo chronicos designat et comitatur functionum languor et torpor, unde quam memoravimus decursus tarditas et febris absentia intelliguntur: quo sensu CELSUS: » in mor-

bis longis neque sanitas in propinquō; nec mors est." Ex quâ dispari indole in utriusque generis curatione dispares requiri in medico artifice ingenii animique dotes, RICHTERUS recte praecipit. Nam in acutis, in quibus actionem exigit officium et captanda est agendi occasio, quae saepe per conjecturam cogit determinare, quod per scientiam sat cito nequit, in acutis iudicii opus est celeritate, ingenio quod dicitur practico illaque naturae felicitate et excellentia, quas interdum etiam absque doctrina valuisse novimus. In chronicis vero summa adhibenda est animi contentio, ingeniumque adferre oportet omnibus doctrinae atque eruditionis medicae copiis instructum: et quemadmodum alia est imperatoris virtus in praelio committendo, alia in expugnanda arce, sic in acutis morbis medicum quaerimus sagacem, peritum, callidum occasionis venatorem, in chronicis constantem, indefessum, eruditum, cunctatorem prudentem.

Errant igitur, qui putent, medicum sola experientia absque doctrina ad summam pervenire posse artis laudem. Nam etsi callidos quosdam novimus artifices sine doctrina magnam sibi com-



parasse nominis famam, hos tamen in chronicis, qui maiorem complectuntur nostrarum valetudinum numerum, saepenumero vidimus deficientes. Quamobrem recte CAELIUS AURELIANUS: » celeres vel acutae passiones etiam sponte solvuntur et nunc fortuna, nunc natura favente; chronici morbi solius medici peritiam postulant, cum neque natura, neque fortuna solvantur.”

Et ARETAEUS de difficili earundem curatione: » Ubi me hercle, inquit, in magna animi constantia diu praestanda, auxiliis variandis, jucundis citra noxam aegris concedendis ipsoque decipiendo medici virtus atque excellentia cernitur.”

Itaque renisus ea symptomata, acutis omnino propria, abesse solent a chronicis. Praeterea nascentium obscura sunt minusque manifesta initia, natorum ingens symptomatum mutabilitas, compositio, decursus anomalus, eventus denique dubius, incertus. Scilicet quam plurima morborum chronicorum genera lente obrepunt, falsaque benignitatis specie fallunt, ut saepenumero quo tempore nata fuerint, ipsos aegrotantes lateat. Postquam vero adoleverint, aliae semper novaeque laeduntur, afficiuntur partes: sic increscit usque

symptomatum multitudo, aliaque alia excipiunt, mutantur, pervertuntur, complicantur, componuntur diversimode inque toto morborum decursu magna notatur irregularitas, anomalia, neque certos habent exitus, quales habent acuti. Quae quidem cuncta, ut antea monuimus, ab ipso vitae sunt viriumque renisu repetenda, aut oppresso, impedito, aut incomposito, irregulari, aut torpente, languente, nimis debili: unde certa illa symptomatum ratio, typi illi et periodi acutorum certam designantes certisque legibus adstrictam reactionem vitalem, in his desunt ac tanta in chronicis plerisque est symptomatum anomalia, quantus in acutis quamplurimis eorundem ordo, symmetria, concentus.

Falleretur tamen, qui ab hisce turbis omnes abesse naturae leges, censuerit: quandoquidem constans est ac certa affectionum successio et adfinitas. Etenim omnis morbus chronicus suas infert corpori mutationes suasque habet sequelas praefinitas, ut caussa quaevis physica. Scorbutus, syphilis, scrofulosis, arthritis peculiare praecipue invadunt et percurrunt corporis telas propriaque decurrunt ab invicem distincta stadia. Et quod

ante omnia notari meretur, naturales sunt morborum adfinitates ac successiones, quibus ab una specie in alteram fit transitus. Rem declarant scrofulosis, tubercula, phthisis, cognatio inter morbos rheumaticos, arthriticos, podagricos, calculosos, aut convulsionum spasmodorumque inter se. Gravior epilepsia sive ad apoplexiam, sive ad maniam disponit. Magna est haematemesis, alvi cruentae, haematuriae, haemorrhoidum adfinitas. Asthma in hydropem pectoris, aut pulmonum transire, catarrhus chronicus in phthisin trachealem observatur. Icterus et hydrops crebro junguntur; morbus scrofulosus et verminosus, chlorosis et leucorrhoea, dolor colicus et urinarum retentio. Ejusmodi vero morborum connubia, vicissitudines, successiones testantur subesse occultas naturae adfinitates et viam monstrant, qua ab una transeant ad alteram metamorphosin morbosam, ita ut chronicis morbis quoque quasdam leges posuisse naturam confiteamur, necesse sit.

Neque inter chronicos tantum ipsos magna est naturae cognatio, verum etiam inter hos et acutos etiam. Nam multi chronici ab acutis nascuntur, ut quandoque difficile dictu sit, ubinam incipiat

chronicus, desinat acutus. Ab inflammationibus viscerum ulcera, phthises, hydropes, a phrenitide mania, ab hepatitide icterus, ab intermittente leucophlegmasia, cachexia, morbique lienis.

Itaque distinguere oportet inter chronicos protopathicos et deuteropathicos, quorum hi illis longe numerosiores: utrique rursus vel dynamici, vel organici. Organicorum numero comprehenduntur, qui organica habent corporis vitia: ex quo sunt genere homoioplastici, heteroplastici. (Cf. *Initia Discipl. Pathol.* §. 271 sqq. pag. 95 sqq.) Ad dynamicos referuntur inprimis neuroses.

Inter causas chronicorum, praeter acutos praegressos, memorare primo loco ac principe quodam oportet pravam vivendi genus: qua mente non immerito SYDENHAMUS: acutos Deum habere auctorem, sicut chronicos nos ipsos, scripsit. Haec enim regula etsi multas patitur exceptiones, longe plurimis tamen experientiae testimoniis firmatur.

Quot enim quantaque harum valetudinum genera nascuntur a vitae deliciis et voluptatibus, a Venere et Baccho, a neglecto corporis cultu, ab animi perturbationibus: odio, livore, avaritia, immoderatis gloriae, opum, honorum, divitiarum

cupiditatibus; quot ab ignavia, a tepidis muliercularum sorbitionibus, a calidis suppedaneis, a vestitu incongruo, a neglecto corporis motu, ab eruditorum vigiliis et lucubrationibus, quae omnia si de chronicorum numero detraheremus, ex tanta multitudine pauci quidam superessent endemici, ad locorum naturam revocandi et sanandi diaeteticis praesertim auxiliis.

Ad chronicos praedisponere dicuntur debilitas, senectus, temperamentum phlegmaticum, melancholicum, nervosum, sexus denique femineus. Cavete tamen credatis, omnem morbum chronicum ex debilitate esse, immo saepe ex virium oppresione, aut stimulo peregrino: quamvis ab altera parte deficiens vitae vigor faciat saepenumero, ut hanc chronicam formam induant latentes in corpore irritationes et aegritudines.

Chronicorum prognosis res est perardua. Nam vix sponte solvuntur nullasque ostendunt veri nominis crises: licet interdum salutaria quaedam notentur naturae conamina. Cum autem quo vetustior morbus, eo latius extensus magisque universalis, pluresque partes occupans, non paradoxa vobis videbitur sententia CELSI: » Acutus quidem

quo vetustior est, longus autem quo recentior, eo facilius curatur."

Universe dynamicorum, quam organicorum faciliior sanatio, propter mutatam in hisce ac depravatam partium fabricationem. Accedit ipsa curationis requisita diuturnitas: quae faustam minus reddet eventus futuri praesensionem: » Nam laborantes, ita ARETAEUS, aequo animo ferre usque in finem non audent, quin immo si aequo animo fuerunt, in victus ratione nimis longa delinquant."

Mors ex chronicis triplex fere est: vel ab inanitione ac debilitate, vel a vitio organico, vel a febre hectica: prioris exemplo sint profluvia, alterius aneurysmata, postremae denique phthises.

Atque haec quidem ex maxime communibus est chronicorum terminis, quibus vulgo tandem febris hectica jungitur: quae tamen si HAASIO fides, ita differt, ut respondeat semper morbi chronici naturae.

Optime curantur pauca remediorum supellectile prudentique vitae regimine, sic quidem instituto, ut diaetetica auxilia cum therapeuticis consentiant. Etenim bene praecipientem audimus BOERHAAVIUM

nostrum, Aph. 1056: » Chronicos hosce varietate quidem infinitos ratione symptomatum, tamen ex origine non adeo composita pendere, neque tam varia medicamenta medendive methodum requirere."

Et profecto in tanto chronicorum numero magna est plurimorum naturae societas et convenientia. Uni inflammationi atque irritationi quot quamque diversae supersunt reliquiae, quot et quanta ex abdomine originem trahunt et gastrico systemate! Quam numerosa ex inanitione, atonia, cachexia surgunt mala! Quam multiplex est neurosium species, ab uno eodemque principio nata!

Itaque pauca genera summa quam plurimas complectuntur species et varietates, cunctas pari methodo generica curandas.

Remedia ipsa praecipue quaerenda sunt ex fonte diaetetico omneque vitae genus ad artis praecepta instituendum est ita, ut tum medicina, tum diaeta in aegri salutem conspirent. Hic vero diaetae et medicinae consensus a recentioribus vulgo neglectus (quo factum est, ut quae una tantum esse deberet medendi scientia, in duas partes ma-



le fuerit distracta (\*), nullibi major arctiorque sit oportet, quam in hoc, de quo agimus valetudinum genere. » Nempe, ut SYDENHAMI utar verbis, corporis habitus omnis alio traducendus est atque homo integer deinceps, quasi nova incudo refingendus." Quae cum ita sint, ea requiruntur remedia, quae in omne corpus mutandum vim et efficacitatem habent maximam.

Neque etiam temere, aut cito mutanda sunt remedia. Ad chronicos namque morbos chronica medendi ratio idonea est. » Alterum illud ignorari non oportet (sic hac de re prudentissimus CELSUS) quod non omnibus aegris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi authores quasi sola venditaverint, prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare authorem, quanti aegrum et experiri aliud atque aliud: sic tamen ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam solvit, non statim con-

---

(\*) Unus tamen excipiendus est BOERHAAVIUS, qui recte materiem diaeteticam cum materia medica conjunxit et conjunctas tradidit.

demnatur, quod non statim profuit: minus verò removeatur, siquid paulum saltem juvat: quia profectus tempore expletur."

Inter efficacissima vero chronicorum auxilia totius vitae generis notanda est mutatio, qua pertinacissima etiam passionum longarum genera curari posse jure merito sperarunt veteres: unde peregrinationis, rusticationis perspicitur utilitas, nec non partim thermarum salubritas. Aëri enim puriori et viae et corporis motui et vitae securae non ultima debetur pars sanationis, quam ab aquarum mineralium fontibus petunt aegri; quocirca Graeci veteres in locis saluberrimis Asclepieia condidisse et Hygeae vovisse dicuntur.

In medico praeterea chronicos rite curaturo summae multumque variae sint ingenii animique dotes. Nam, etiamsi CELSUS dixerit: magis ignoscendum esse medico parum proficienti in acutis morbis, quam in longis, propterea, quod in his et deliberandi conceditur et remedia mutandi tempus, duplicem tamen adjecit conditionem ac legem: alteram scilicet, ut inter initia medicus accedat, alteram, ut aegrum habeat sibi obsequentem: quae utraque quam raro medicis obtingat felici-

tās, experientissimus quisque optime noverit, nec latuit ARETAEUM, qui: » nam laborantes, inquit, aequo animo ferre usque in finem non audent, quin etiam si aequo animo fuerunt, in victus ratione nimis longa delinquant. Quare aeger fortis sit et cum medico adversus morbum conspiret, necesse est." Hoc consilio medicus sibi ante omnia aegri fidem conciliabit, nec aegros fallaci spe brevis curae lactabit: longe enim animosius et morbos et diuturnae curationis taedia ferre praemonitos, majoremque fiduciam in medico ponere, qui vanis promissis illos numquam deluserit, a SWIETENIO, summo artis magistro, docemur.

Est tamen, ubi non mutata indicatione mutari debent remedia, tum ne corpora nimium iisdem adsuescant, tum ne diutius adhibita aegrotantibus fastidium moveant. Neque hos magna medicaminum farragine terrere, nec nimis severum sese praestare debet medicus. Aegro interdum morem gerat, saepe animum erigat, pias subinde usurpet fraudes, quo sensu ARETAEUS: in ipso decipiendo medici virtus atque excellentia cernitur.

Itaque summa opus est medico artifice non tantum arte, verum etiam sagacitate, calliditate, pru-

dentia, sapientia: opus est illa vivendi arte, quam ex naturae humanae, hominumque studio reportamus; opus est inprimis humanitate generisque humani caritate, brevi eo animi sensu, quo homines propter ipsos diligimus, amamus, colimus, nihilque humani a nobismet alienum putamus.

Etenim non satis est medicum esse eruditum, prudentem, peritum ingenioque praestantem, *hominem* quaerimus, qui, miseris succurrere cupiens vitae humanae calamitates nisi tollere possit, lenire saltem ac mitigare conatur: quod quanti sit in illis morbis, quorum magna pars palliativam tantum, aut symptomaticam recipit curationem, ipsi, ni fallor, sponte intelligitis.

Quadruplex vulgo ponitur in his morbis tractandis medendi consilium, sive indicatio: prima jubet caussas amovere: altera debilitatem emendare; tertia vitia organica corrigere; quarta denique symptomata mitigare.

Caussarum nomine subintelligimus caussas remotas: mutando regimen vitae, sopiendo in neurosi-  
bus nimium nervorum sensum, minuendo plethoram in aliis huic indicationi sive medendi consilio obtemperamus.

Ad alteram, qua debilitatem emendare jubemur, minus tonica, adstringentia, cardiaca proprie ita dicta, quam quidem alimenta refero, tempore, copia, legitimis praebenda. Nam alimentum summum est in rerum natura cardiacum, multaque sunt, quae sola nutrientia ferunt mala chronica, uti phthises v. c. quaeque febris hectica comitatur; multa, quae haec praecipue requirunt, ut omnia ab inanitione nata.

Tertia indicatio vitia organica spectat, cui quidem raro satisfieri potest; quoniam illa utplurimum, praesertim vetustiora, insanabilia omnique arte superiora sunt existimanda. In hisce igitur quarta solummodo superest indicatio, palliativa illa, quae minime tamen parvi pendenda, quia vim habet eximiam ad sublevandas morborum incurabilium miserias ipsamque vitam reddere potest aegris mortalibus tolerabiliorem. Atrocissimos cogitate dolores, quos movent carcinomata, et somnum, opio inductum, oblivionis poculo.

Superest morborum chronicorum classificatio, quae, ut omnis aliarum rerum distributio aut dispositio, manca esse atque imperfecta debet. Systema enim artis est, non naturae opus. Quodsi

*Lib. II. Pars I.*

...

tamen aliquid seligendum sit, illud optimum videtur caeterisque anteponendum, quod a duplici vitae ratione ductum, saniori physiologiae maxime respondet, quae quoniam docet hanc vitae organicae et animalis distinctionem non tantum in duplici regno organico, verum etiam in corpore humano ab ipsa natura esse sancitam, inde traximus divisionis nostrae fundamentum atque principium. Subdivisiones autem optimas subministrabunt praecipua organorum corporis systemata eorumque functiones.

Ad vitam organicam ut pertinent functiones digestionis, sanguificationis, respirationis, nutritionis, secretionum, excretionum quaeque has functiones peragunt organa et organorum systemata: intestina, viscera abdominalia, genus vasorum, pulmones, genus lymphaticum, systema uropoieticum, sic ad priorem classem retulimus morbos gastricos, morbos pituitosos, morbos generis vasorum tum sanguinem, tum lympham ferentium, morbos phthisicos, morbos systematis uropoietici, tum etiam qui generationis officinam potissimum tangunt, venereos: qui aptissime hoc loco collocari posse, nobis videbantur.

Ad alteram classem, quae organa et functiones vitae animalis complectitur (quorsum spectant musculi, cerebrum, genus nervorum) pertinere censuimus morbos rheumaticos, arthriticos, spasmodicos, convulsivos, lethargicos, comatosos et vesanias denique, sive morbos, qui dicuntur, mentales.

En igitur secundum hanc nostram divisionem morborum chronicorum schema!

Cl. I. *Morbi vitae organicae.*

Genus 1. Morbi gastrici.

2. — vasculosi.

3. — mucosi.

4. — lymphatici.

5. — phthisici.

6. — systematis uropoietici.

7. — venerei.

Cl. II. *Morbi vitae animalis.*

Genus 8. Morbi rheumatici et arthritici.

9. Neuroses.

10. Vesaniae.

Caeterum monendum est, me de omnibus et singulis non esse acturum morbis chronicis, sed eos solummodo expositurum esse, quos tanquam typos spectare oportet, unde caeterae quaecunque species intelligi poterunt, ita quidem, ut ubicunque illud commode fieri possit, praemisso universali generis summi conspectu, communes maxime adjungam species, quibus tanquam rerum exemplis universalia illa sum interpretaturus. Omnes enim et singulas tradere species neque necesse est, nec sinit instituti nostri temporisque ratio. Inprimis autem illas explicabo adfectiones chronicas, quae in patria nostra nostrisque hominibus observari solent.

In hac divisione eum secutus sum ordinem, ut a digestionem facto initio, ad sanguificationem, nutritionem, secretionem et generationem tandem pervenirem et in secunda classe quae motum, sensum et sensorium commune tangunt aegritudines, pertractarem. Hunc autem ordinem non tam exacte secutus sum, ut interdum ab eo non aliquantisper recederem, ubicunque nempe ipsa naturalis morborum adfinitas alium postulare ordinem videretur. Hanc enim naturalem morborum adfi-



nitatem potissimum et ante alia sequendam esse existimavi ac praesertim practicam quaesivi morborum cognationem.

Eapropter inter morbos pituitosos retuli et muciprofluvia et morbum verminosum, ad neuroses etiam partium organicarum revocavi affectiones nervosas, neque a neurosibus reliquis secrevi has, licet in vita organica primam originem habeant.

Et de divisione quidem hactenus: quae quo minus perfecta haberi omnibusque numeris absoluta possit, ipse vetat naturae concentus et ordo. Nam res naturales mirabiliter contextae multiplici adfinitatum serie vario modo secum invicem nectuntur; quo quidem vario et multiplici rerum naturalium nexu efficitur, ut plurima condi possint naturae systemata, quorum quodvis aliam complectitur rerum naturalium seriem, nullum vero universam complectitur naturam. Tantopere enim distant haec systemata hominum a systemate naturae, quantopere mens humana distat a mente divina.

Haec de morbis chronicis universe; de quorum doctrina generali qui plura scire aveat, libros legat CAROLI LUDOVICI DUMAS et ANDREAE GULIELMI

**HAASE:** illius: *Doctrine générale des Maladies Chroniques*, 2. Ed. Paris 1824.

**Hujus vero:** über die Erkenntniss und Cur der chronischen Krankheiten des Menschlichen Organismus 2. Aufl. Leipz. 1820.



## INDEX CAPITUM.

---

PRAEFATIO. . . . .	Pag. v.
De morborum chronicorum doctrina. . . . .	— xv.
De dysphagia. . . . .	— l.
De dyspepsia et vomitu chronico. . . . .	— 53.
De diarrhoea. . . . .	— 102.
De ictero. . . . .	— 116.
De scorbuto. . . . .	— 154.
De morbo maculoso haemorrhagico Werl- hoffs. . . . .	— 176.
Ulcus noma, sive stomacace puerorum. . . . .	— 180.
De chlorosi. . . . .	— 184.
De cyanosi, sive morbo caeruleo. . . . .	— 189.
De melanosi. . . . .	— 210.
De cordis eurysmate, hypertrophia et vitiis valvularum. . . . .	— 213.
Aneurysmata aortae. . . . .	— 238.
De blennorrhoeis, sive muci profluviiis. . . . .	— 242.
De vermibus intestinalibus et morbo ver- minoso. . . . .	— 245.
De morbo scrofuloso. . . . .	— 275.
De rhachitide. . . . .	— 299.
De hydropo. . . . .	— 318.

De phthisi pulmonali. . . . .	Pag. 370.
De urinae vitiis universe. . . . .	— 427.
De calculo renum et vesicae. . . . .	— 428.
De diabete. . . . .	— 454.
Enuresis. . . . .	— 461.
De ischuria. . . . .	— 467.
De syphilide, sive lue Venerea. . . . .	— 483.
De morbis organicis proprie ita dictis. . . . .	— 531.



---

## DE D Y S P H A G I A.

**E**st morbus oesophagi, dysphagiam vocant, quo clausa ad ventriculum via, TANTALI poenas subeunt miseri quosprehendit aegri et fame atque inedia confecti pereunt.

— *epulisque ante ora paratis,*

*Regifico luxu, Furiarum maxima juxta*

*Accubat et manibus prohibet contingere mensas.*

Iste morbus etiamsi a multis de medicina practica auctoribus neglectus, nobis tamen nequaquam praetermittendus esse videbatur, quoniam uti crebrior esse inter nostrates solet, sic optimos pariter inter nos nactus est descriptores. Siquidem de hoc valetudinis genere scripserunt ANTONIUS DE HAEN, MATTHIAS VAN GEUNS, ALEXANDER PETRUS NAHUYs et JANUS BLEULAND. Prior in Dissertatione *de deglutitione, vel deglutitorum in cavum ventriculi descensu impeditis*: alter et tertius in responsis datis ad societatem scientiarum Harlemensem, quae de illo proposuerat quaestionem, BLEULANDUS deni-

*Lib. II. Pars I.*

que in Specimine Academico inaugurali: *de difficili aut impedita alimentorum depulsione* publice defensa in hac Academia Anno 1780, quod quinquennio post auctum prodiit sub titulo: *Observationum anatomico-medicarum: de sana et morbosa oesophagi structura.*

Nonnunquam derepente, saepius vero lente oboritur, cum sensu molestiae, aut doloris sub deglutitione. Huic sensui sive molestiae, sive obicis cujusdam sub alimentorum per oesophagum descensu aut citius, aut tardius crescente malo succedit vomitus ingestorum, qui tamen magis exscretio, quam vomitus dicendus est. Rejiciuntur autem cibi ex oesophago, quapropter vomitum oesophageum, aut quod rectius, *ruminationem* vocavit WICHMANNUS Archiater Hannoveranus, in libro aureo, quem de morbis specie similibus discernendis ante hos quadraginta annos primum edidit. Una cum cibis insignis rejicitur salivae, muci, pituitae copia, quo provector morbus, eo spissioris, ut tenacissima tandem prodeat plurimaque pituita. Vomitus autem iste, seu ruminatio absque sudore illo frigido, nausea, anxietate, musculorum abdominalium retractione, brevi absque ullis vomitus veri symptomatibus oboritur. Quoniam vero corpus cibo ali ac refici desinit, ex atrophia pereunt aliis aliisque accedentibus iisque gravioribus continuo morbi symptomatibus, qui ex hoc morbo aegrotant, homines. Verum adponero

habet graphicam BLEULANDI morbi historiam. Est enim morbus, quem ab ipso principio novisse plurimum refert: est initio levis et fallax, in progressu etiam ratione causae proximae fere semper dubius. » Antequam ulla adsit mali perceptio (sunt verba BLEULANDI) saepe causa formalis jam adest, hac autem evoluta aegri incipiunt sentire signa, ita tamen, ut nondum videant necessitatem ab arte auxilium petendi; sensim tamen sensimque cum increscente morbosa conditione incommodi incrementum percipiunt, donec cogantur urgentibus symptomatibus ad medicum confugere, a quo tunc frustra saepe auxilium implorant. — Fixa jam adest mali sedes, manifestum est obstaculum, quousque admittuntur satis facile alimenta, ultra quod autem vel neutiquam, vel vix nisi cum adhibita vi et magnis moliminibus protruduntur! Quandoque juvat prona corporis inclinatio per aliquod tempus; quandoque ope tubi in oesophagum inmissi ingerenda assumuntur; alias prudenter et tarde deglutiendo malum diu absque magna molestia ferunt: dantur, qui sola fluidorum assumptione difficulter quidem, tamen diu vitam protrahant. — Saepissime tamen malum ita increscit, ut haec omnia nihil juvent, sed plenaria capacitatis fiat abolitio; tunc oriuntur insignes anxietates ad quaevis deglutiendi conamina et frequenter cum murmure gargarizantis ingerenda multo cum muco rejiciuntur. Haec symptomata in

nonnullis desinunt pro tempore, donec fame incitati iterum cibos adsumere tentent, quando eadem renovatur tragoedia: in aliis etiam perdurant symptomata, quamvis ab actione tubus quiescat: patiuntur aegri anxietates intolerabiles; vexantur flatibus dolorificis, torquentur ingenti fame et defatigantur, incredibilis quandoque copiae muci nunc tenacioris, nunc tenuioris exscreatione, emaciatur corpus ad speciem sceleti usque, ita ut praeter osseam cratem cutimque parum remanere videatur; debilitatur quam maxime totum corpus; humores non reparantur a chylo et vitae actione acrimoniam contrahunt; oriuntur leipothymiae, asphyxiae et tristissima vita, propter exhaustos nutritionis fontes, atrophica tandem morte terminatur.

Fit etiam aliquando, ut circa vitae finem omnia quidem symptomata cessent et quae assumuntur satis facile descendant, absque tamen ut debitum ab assumptis accipiat corpus nutrimentum. Fit tamen etiam, ut aegrotantes ab adsumptis remediis et debita diaeta pro aliquo temporis spatio levamen symptomatum cum vera habitus emendatione experiantur eaque denuo negligentes in pristinum illabantur statum; dum exstant etiam pauciores licet observationes, quae docent justum remedium usum, aegrorum patientiam et medici sagacitatem concurrentia perfectam sanationem effecisse.

Descripta modo ratione morbus procedit, si oria-



tur a caussis obscuris, initio levibus. — Quandoque vero cito, et violenter hominem aggreditur et in summum vitae periculum jam statim conjicit, si producat a talibus caussis quae subito et violenter agunt." Hactenus BLEULANDUS.

Multiplex dysphagiae caussa est sive in ipso oesophago quaerenda, sive in partibus vicinis. Nimirum vel ex ipsius oesophagi valetudine laeditur deglutitio, quorsum cum alia vitia, tum stenochoria pertinent, vel partibus vicinis comprimitur, ejusque cavum clauditur, angustatur, quod *θλῦσις* antiquiores pathologi vocabant. Laeditur deglutitio propter morbum oesophagi, sive inflammatio, sive ulcera adsint fungosa aliave, sive scirrhus, induratio nimiaque rigiditas, spasmus, atonia, paralysis. Tum etiam partes vicinae vel coarctare possunt et irritare oesophagum, vel viam penitus occludere: glandulae scilicet oesophago adjacentes: thymus, thyreoidea, glandulae dorsales, Vesalianae ad quintam dorsi vertebra, lymphaticae aliae, artiarum aneurysmata, steatomata, pulmonum vomica, scirrhus, diaphragmatis vitia caet. ex quibus tamen caussis illas praecipue interpretabimur, quae ad ipsum oesophagum propius spectant suntque caeteris crebriores, reliquis ad sua quaeque loca translatis.

Inflammatio oesophagi quandoquidem rarior est ejusque exempla perpauca a medicis descripta prostant, ipsius nulla prius a nobis mentio facta est.

Ne autem huic capiti quid deesse videatur, proferam casum a BLEULANDO in semet ipso observatum atque descriptum lib. I. pag. 54. » Memini me ipsum, sic scribit ante aliquot annos, postquam fratri carissimo scarlatina febre maligna extincto, perpetuo adstiteram, inflammatione in faucibus loco magis inferiora versus, quam qui in angina inflammatoria occupatur, correptum esse, comitantibus dolore acerrimo, febre continua acuta cum delirio satis valido, dum plenarie eram privatus potentia nixum deglutitionis edendi: abibat malum hoc in suppurationem, ita ut abscessus formatus doloris quidem ac febris afferret remissionem, sed omnium aeque potulentorum ac esculentorum transitum impediret: rupto autem eo et eructata magna puris quantitate, sensim sensimque pristinum oesophagus recuperavit vigorem, quo et adhucdum laetus gaudeo.

Non autem semper ita felicibus nobis esse licet; talis enim abscessus saepe aliam sibi quaerit viam ac perforat tunicas oesophagi, ita ut exteriora versus rumpatur; vel quod frequentius fit, abit in indurationes indissolubiles scirrhasas ipsamve gangraenam: et licet talis abscessus feliciter rumpatur, atque materies purulenta evacuetur per os, fieri tamen potest, ut aperturae factae remaneant, aut cicatrices majores formentur, quae viam quodammodo primo angustant, deinde autem perpetua adsumtorum irritatione increcant et plenariam tandem

producant obturationem canalis ad vitam adeo necessarii (Cf. l. l. pag. 54 sq.)

Si reputetis, oesophagum intus epithelio, tanquam cornea epidermide esse adversus acres ingestorum rudioresque contactus munitum raroque inflammatione prehendi pura, saepius contra impura, a caussis internis, humorum inprimis dyscrasia suscitata, lubenter assentiemini BLEULANDO atque explicabitis et inflammationum oesophagearum prae inflammationibus ventriculi et intestinorum paucitatem et crebrum earum in ulcerationes indurationesque transitum.

Maxime vulgarem oesophagi morbum esse ulcus: haecque ulcera utplurimum scirrhusae naturae esse; animadvertit BAILLIE, ac sive mox infra pharyngem, sive prope cardiam reperiri. Rem exinde interpretari solere HUNTERUM, quia superior locus proxime contactum patitur rerum acrium irritantium, inferior contra sphincteris vices obiens sponte in coarctationem pronus est illudque fieri praesertim, ubi diathesis ad scirrhum subest: se tamen observasse; ulcera sponte sua et a caussis internis in ipsoque oesophago positae, nec facile definiendis, fieri.

Pervolventes, VOIGTELII Anatomies pathologicae compendium, aut si mavelitis repertorium, complura invenietis ulcerum oesophagi exempla citata atque sententiam ejus, quem citabamus, anatomici pathologici Angli confirmatum circa ulcerum eorum naturam scirrhusam: is ulcera et stricturas oesophagi praeclaris iconibus illustravit. Verum agite unum

alterumque exemplum proferamus. In casu BLEU-  
LANDI abscessus erat. Ulcerum carcinomatosorum  
casus ex VALSALVAE Schedis, MORGAGNUS profert  
duos, quorum prior ad hunc modum se habet.  
» Vir annos quinquaginta natus queri incipit de  
impedita deglutitione. Impedimentum paulatim  
augetur: vox amittitur: in deglutiendo non levis  
dolor: cibi portio in faucibus remanebat, quae sen-  
sim postea in os redibat, interdum, ut videbatur,  
corrupta: macescit corpus: nihil exterius praeter  
naturam conspicitur; sinistra duntaxat maxillaris  
interna glandula percipitur indurata. Repente qua-  
si suffocatus moritur. Glandula modo memorata,  
dura habebat ad latus internum materiam albu-  
minis similem. Plures autem in pharynge et ad  
summam laryngem tumores conspiciebantur, qui  
carcinomatis habebant naturam.

Juvenis quoque (est alter VALSALVAE casus) post  
consimilia morbi signa eodem fere pacto mortuus,  
ejusdem naturae tumores ostendit, praesertim ad  
supremam laryngis partem, et proxima pharyngis  
latera. Sed tumores nonnullis in locis jam exulce-  
rati ipsamque epiglottidem ulcus perforaverat. An  
carcinoma verum, an serofulosum tuberculosum  
hujus juvenis malum? Ulcera isthaec interdum  
perforasse oesophagum, interdum vicinas etiam  
partes: tracheam (\*), pulmonem, aortam laesisse

---

(\*) Dysphagiae exemplum ex ulcere oesophagi in asperam

leguntur, aut ab hinc ulceratis esse suscitata, idque nec raro postquam cum iisdem prius concreverunt. Rariores illi casus sunt, in quibus ex ulcere inducta cicatrice oesophagi parietes inter se coaluere.

Quemadmodum in aliis etiam mucosis: urethrae, vesicae v. c. evenit, ut hae ex hypertrophia cavi angustiam faciant, ita oesophagi quoque mucosa eique subjecta cellulosa justo crassiores factae cavum isthoc angustant. Hanc hypertrophiam reliquas etiam tunicas ipsamque musculosam invadere testatur fig. 2. Tab. IV. fascicul. III. iconum anatomien pathologicam illustrantium Celeb. BAILLIE, quam HUNTERUS, ex cujus Museo Anat. specimen hoc est, quod ea figura adumbratur, tanquam exemplar proponit *scirrhi* substantiae musculorum. In cartilagine ipsiusque ossis duritiem transiisse oesophagum referunt anatomes pathologicae auctores. Hunc transitum an causam dysphagiae habeatis, dubitabitis, si quae summus MORGAGNUS de ea annotavit, perpenderitis. Is, postquam de coalitu per cartilagine scripserat, in quo oesophagus a cartilagine sic impeditus erat, vix ut exiguum exstaret foramen," quid vero, quaerit, si cartilago non introrsum extuberaret; sed patentem na-

---

arteriam etiam penetrantis protulit CORN. JOH. KNEPPELHOUT vir doct. in Spec. Inaug. anno 1805. in hac Acad. defenso. Erat autem morbus in sene robusto natus, post scabiem repulsam.

turali amplitudine viam relinqueret? num putas illaeram futuram deglutiendi facultatem? Mecum certe VICTORIUS GORNIA medicus experientissimus dissectionem communicavit, in Germania habitam cadaveris Celsissimi et Eminentissimi Principis, cuius oesophagus exterius membraneus, interius autem erat cartilagineus, imo stomachum versus ad pollicis latitudinem osseus. Princeps tamen ille non modo ultimo biennio quotidie duabus a prandio horis vomuerat; sed de nulla unquam in deglutiendo molestia aut difficultate conquestus fuerat. An igitur non secus ac sanguis per osseam arteriam cordis vi et retro positarum arteriarum impellitur, eibus quoque a validioribus pharyngis musculis impelli potest per gulam non conniventem, neque explicandam, sed patulam a rigidis parietibus perpetuo servatam?"

Huic opponere lubet casum, quem ingenti eruditionis adparatu protulit DAN. WILH. TRILLER in Diss. *de fame lethali ex callosa oris ventriculi angustia. Opusc. Med. et Medico-philologic. cur. CAR. CHRIST. KRAUSE* Vol. I. pag. 9. » Vir quidam nobili genere natus ann. XXXVII. opibus fortuna relictis haud labore partis abundans, pinguioris aqualiculi juxta ac ingenii et ingeniosioris gularae, quam capitis; erat nempe ex isto desidioso hominum male vivorum genere, qui vivunt potius ut edant, quam edunt, ut vivant et propter sola convivia nati esse videntur: hic, inquam, ne-

potum altissimus gurgēs, jam ab aliquot retro annis, gravem quandam glutiendi molestiam secum perceperat, praesertim quoties solidioris quid cibi in vacuum demittere stomachum vellet. Tunc enim primum confusus et insoliti affectus novitate quasi attonitus animadvertibat, alimenta non libero et jucundo lapsu in eundem deferri; sed potius in primo velut itinere, pertinacius hærere et in ipso aditu aliquamdiu acrius luctari: donec tandem aliquo post tempore, vel difficillimo nisu sensim descenderent, vel quod saepius accidebat, violentiore vomitione, cum sudore frigido capitisque acerbo dolore, semesa et indigesta redderentur; adeo, ut saturum esse liberet quidem, mox autem saturum esse ob summos angores et molestias rursus pigeret. Quod quum tanti adhuc mali ignarus, cui leve quid suaeque sponte iterum mox transiturum ab initio contempsisset, invalescente tamen indies auctis subinde viribus, molestissima illa cibos detrudendi difficultate, non omnia hic tuta esse moestus anxiusque recte coniecit. Tum igitur ancipiti mentem formidine pressus serio circumspicere coepit sera nimis medicorum consilia et auxilia, ut scilicet insidiosum illum hostem, adhuc incognitum, liberiores ciborum ingestorum descensum ab aditu importune arcantem, prompta strenuaque manu, extemplo abigerent et expugnarent. Aegerrime enim omnino ferebat, tantopere adamatam gulam jugulumque sibi ipsi

nunc peti, in cujus tamen voluptuosa pastione unicum quasi totius vitae suae tabernaculum hactenus firmiter collocaverat. Verum haec omnia vano consilio speque inani sic agitabantur: quoniam nempe morbi non intellecti nulla erat curatio speranda. Quo magis enim arte medendi pugnatum fuit a peritissimis artis salutaris magistris, a remotissimis fere mundi angulis, ingenti sumtu frustra arcessitis, eo minus tamen laudabili conatui respondebat laetabilis eventus. Exitium enim superabat opem, quaesitaeque potius nocebant artes, adeo ut omnes salutiferi auxiliores postquam varia nunc bene, nunc male tentassent, inglorii hinc discederent. Quin potius eo usque quotidie increbbebat insuperabilis mali dira saevitia, ut quoties ad mensam lautis admodum opiparisque dapibus onustam ministeriisque instructam accederet hic helluo miserrimus, toties ad cibos capiendos eo usque inhorresceret, uti ad formidatas aquas intremiscere, foedo spectaculo solent a cane rabioso clanculum admorsi. Acerrimis enim licet stimulis vacui ventris impulsus, nihil tamen in tanto ciborum lautiorum adparatu usquam reperiebat, quo latrantem stomachum lenire posset: immo potius gulotis quasi oculis, inter lamentabiles questus et lacrimosa suspiria, adpositas dapes, inani saltem pastu, ventriculo ipsi nihil profuturo devorabat.

Ipsi igitur melioribus ferculis alias adsueto, ad



vitam miseram utcunque sustentandam mortemque ipsam aliquantisper adhuc arcendam confugiendum denique vel invito fuit ad liquidissimas solum sorbitiones, quas tamen et ipsas tanta quidem cum molestia et anxietate per lentissima intervalla et temporis spiramenta subinde sensim ingessit, ut vel duodecim tantum earundem cochlearibus exsorbendis longissimum sex septemve horarum spatium aliquando vix sufficeret: obortis tamen interea simul crebris vomendi conatibus, tetris artuum tremoribus sudoribusque tractuosis, fronte potissimum, tergo atque pectore ingenti copia expressis. In hac denique deplorata rerum suarum conditione me quoque ipsum, vix tum e longinqua peregrinatione reducem arcessit montesque aureos, imo dimidiam bonorum suorum haud mediocriam partem mihi munificentissime pollicitus querulo ore, irriguo fletibus vultu et submisso paene poplite, per omnia sacra me rogabat, ut sibi mortalium omnium miserrimo et foeda nec voluntaria fame proxime perituro, quantumcunque possem, opis quid afferrem obturatumque hucusque per quaedam praepedimenta saeva incognita ostium, cibis capiendis alias liberum et apertum auxiliatrice manu potenter reserarem, neque ullis proinde parcerem sumtibus ad salutarem illum scopum citissime consequendum: se quippe malle omnino pane secundo siliquisque pauperem vivere, quam fame opulenta divitem interire. In hunc autem

fere modum istum suum atrocem insolitumque affectum vivide satis describebat: scilicet sese omnes oblatos cibos perquam commode et sine ulla offensa ab initio demittere posse, ast ubi recto cursu per gulam descendissent tunc denique omnes simul immotos plane perstare neque ullam amplius eosdem detrudendi potestatem sibi superesse; postquam subito oriri dolores acres pressione quadam gravantes vehementes vomendi conatus et perpetuas praecordiorum anxietates, sudore saepe frigido committatas. Hinc igitur sese jure vereri, ne oppositum forsitan sit ipsi quidem ventriculi ostio aliquod peregrinum et insolitum repagulum aut remora-  
men, quo cibi per gulam demissi ab ulteriore in stomachum ipsum introitu violenter arceantur et contra, turbato naturae ordine, repulsi ad superiora retro agitentur. Quibus omnibus id etiam denique addebat, sese per omnem fere vitam nive atque glacie adeo supra modum delectatum hactenus fuisse, ut per omnes aestivos dies et potionibus nivatis et bellariis glacie conditis, largissima copia sese quotidie implevisset: quo scilicet novum voluptatis sensum reciperent fauces quasi emortuae et cibis ardentibus occallatae. Interim tamen minime credere, veram et unicam hanc esse causam tam funesti eventus, quin alium potius subesse fontem, quo ista clades sit derivanda. Ad quae ego cum alte ingemuisssem, occidit, occidit spes omnis cheu! mecum tacite exclamavi ipsique

perquam exigua ingentis luctus solatia dedi, quoniam ex hactenus relatis facile colligere et praevidere poteram, fida jamjam experientia aliquoties probe edoctus, superius ventriculi ostium ita summa vi esse constrictum, coarctatum longoque temporis tractu, adeo usque intractabile fuisse factum, ut nulla amplius medicina locum commode habere posset: sed omnia nunc potius desperata et conclamata essent. Ideoque ipsi exitio jam suo quasi destinato, suspensis non nihil ac obscuris verbis ultimam propemodum necessitatem denuntiavi atque ne sese vanis longioris vitae blandimentis frustra amplius induci pateretur, serio monui. Ne tamen exspes plane a nobis dimitteretur, ipsius rogatu praescripsi quasi in speciem clysmata quaedam ventrem flatibus turgidum commode exoneratura, nec non externa fomenta atque epithemata delenifica, quibus atrox malum, si non penitus tolleretur, quod nempe nulla amplius medicina, ut modo dixi, efficere poterat, at levaretur tamen aliquantum et mitigaretur: quod et per aliquod tempus ita utcunque successit ac profuit.

Neque tamen multum post sefellit triste nostrum augurium: anno enim nondum plene exacto misellus iste homo in tam diras durasque demum angustias redactus fuit, ut itinere illo cibario interea penitus clauso et obsepto, ne minimam quidem vel tenuissimae sorbitionis particulam in debilem tantum vitae ruentis fulturam intromittere

amplius posset. Et miserandum sane erat spectaculum cunctis, quum cibos, haustus et omnia vitae oblectamenta imperiosa fames simul fastidiret et posceret. Hinc exhausto sic per longa jejunia, omni paene spiritu vitali famisque plus quam Erisichtoniae lentitudine viribus sensim fractis et confectis, animam tandem jejunam indignantemque cum gemitu reddidit, magnus inter opes inops et medias inter luxuriosas dapes famelicus. In cujus enim plura poscentem ventrem Luerina conchylia, Afra avis et attagen Jonicus haecenus, rabida cum voluptate descenderant, ut cum poeta loquar, is inquam fatali necessitate eodemum miseriarum adactus fuit, ut ad tenuem spiritum sustinendum mortemque differendam ne minimam quidem panis mollissimi buccellam ingerere amplius valeret sicque luxuriosae gulae promeritas quasi poenas daret, qui antea per eandem nimia liguritione peccavisset.

*Sic corpus clade horribili absumtum extabuit.*

Aperto autem post fata cadavere rugosa macie horrido et sola lurida cute tecto, illico dictis nostris aut divinationibus vera constitit fides. Namque mox cum ingenti visorum praesentium stupore, deprehensum liquido fuit, in ventriculo flatibus congestis vesicae adinstar distento, superius ejusdem os ita a naturali et consueto sui ordine monstruose deflexisse, ut potius cartilagineam, imo paene osseam naturam induisse videretur, tanta

quidem cum coarctatione callosaque duritie, ut ne summum quidem specilli acumen aut extrema pennae scriptoriae pars, nisi suprema vi admota per istud angustatum nimis maleque pervium ostium in ipsum ventriculum commode dimitti posset. Imo adeo usque durum atque renitens repertum fuit exiguum illud atque contractum ventriculi ostium, ut vix ipsius acuti scalpelli acie discindi a chirurgo potuerit, stupentibus cunctis atque hinc ineluctabili fato merito ingemiscentibus. Sic enim manifestissime patuit et mali inexpugnabilis immensa magnitudo et vanum infructuosae medicinae conamen et veridicum denique futuri tristic eventus praesagium, ipsa nempe experientia et oculata quasi fide affatim confirmatum. Istud namque latens malum opinione prius, quam oculis et suspicionem ante quam manibus deprehenderamus."

Cum hac observatione TRILLERI convenit prima observatio GEUNSI (p. 123. l. l.) senis piscatoris, potoris et fumigatoris strenui, cui oesophagus extus scirrhus constrictus, intus circa cardiam cartilaginea duritie coarctatus cernebatur. Atque sic sponte a stenochoria, de qua hactenus vidimus, ad thlipsin sive compressionem traducimur, de qua nunc videbimus.

Prius autem quam de hac dicemus, notetis velim, ab aliis fungosas, ab aliis polyposas excrescentias in oesophago tanquam dysphagiae causas fuisse repertas, interdum ex inflammatione oesopha-

gum pseudomembrana fuisse obductum, qua excreta atque ejecta nonnullis visum est, internam oesophagi tunicam expuisse aegrotantes; denique ex tumoribus scirrhis nata ulcera carcinomatosa sublatoque absorbtione ulcerosa deglutiendi impedimento, quorumdam animadversionem explicari posse, restitutae ultimo vitae tempore deglutiendi facultatis, quod in viro sene scirrho et carcinomate oesophagi in Nosocomio Academico extincti ita contigisse videtur. Nolite putare, hanc duritiem semper subesse, ubi propter internum vitium impedita deglutitio est. Est enim, ubi ex internae membranae plica occluditur canalis, rem notante Celeb. BAILLIE ac confirmante SOEMMERRINGIO, qui tantam angustiam reperit, ut vix specillum admitteret: immo GEUNSIUS observationem medici Harlingensis STINSTRA scripto consignavit, in qua oesophagi strictura erat, absque ulla praeter hanc ipsam hujus partis, ut videbatur, valetudine (ibid. pag. 141).

Θλίψις ea species angustiae dicitur, quando externa vis cedentia cavitatum latera introrsum urgens, diametro per gradus imminuta tandem distantiam eorundem per mutuum intus contactum prorsus tollit, GAUB. §. 209, 3. Cff. *Initia discipl. pathol.* §. 252 sq.). Ea compressio varia est et multiplex. De qua audite quaeso MORGAGNUM.

» Partes autem oesophago proximae, ut non uno modo possint deglutitionem impedire vel eae os-

tendunt observationes, quas cum alias perscripserimus, hic satis erit, ut promissimus indicare. Neque enim eae partes nocere duntaxat queunt ita comprimendo, ut via interceptiatur, quemadmodum tumefacta illa in octogenaria muliere glandula, aut dilatata in tubicine arteria magna, aut ambae etiam facile in viro a VALSALVA adolescente dissecto; sed et absterrendo a deglutitione, quando via etiam aperta, compressae ipsae a deglutitis alimentis suffocationis periculum afferunt, ut dilatata aorta in femina, ab eodem secta, in Marchione PAULUCCIO et in medico FERRARINIO. Sed ad glandulas oesophagum comprimentes ut redeam, quid thymus possit tumefactus et sepulchreti haec sectio indicat et VERDRIESII observatio confirmat. Aliae autem sunt glandulae, quae nulla re interposita gulam sua distentione prementes angustiam et coalitum quoque efficiunt, inprimis quae dorsales appellantur: — et praeter has alias esse dico non semper anatomicis occurrentes, quanquam nec dorsales semper occurrunt; imo potius, aut saltem saepius morbosas, quae facere idem possunt, ut quae a MAUCHARTO proprius oesophagi finem et ad ipsum finem conspectae sunt, facturae erant, si magis intumuissent, ut illae intumuerant, quas VALLISNERIUS simul cum ea in cartilaginem mutationeprehendit. Idemque in fine ipso oesophagi factum esse a tumore sive scirrroso, sive e dura pinguedine compacto, BONETI prae caeteris et

Chirurgi a MAUCHARTO laudati observationes ostendunt. Porro alia et ea quidem in omnibus pars est, quae infimam gulam praeter modum constringens impedimentum afferat deglutationi. Ea pars diaphragma est, cujus inter lacertos extrema gula trajicitur. Quamobrem vides, cur in servo illo, cujus diaphragma Cel. HEISTERUS valde inflammatum conspexit, fuerit deglutationis impotentia et cur hystericæ aliquot mulieres in loco modo designato obicem deglutationi oppositum sentiant. — Praeter ea, quae dicta sunt, animadverti aliam esse partem quae gulam possit et infimam quidem comprimere. Ea jecur est. Cum enim in posteriore hujus margine excavatio fit a Cel. WINSLOWIO commemorata, quae locum cedit tum spinæ, tum extremo oesophago jam in ventriculum se explicaturo, facile potest intelligi, si hepar ad eam potissimum sedem praetumidum fiat ac durum, spinæ apprimere oesophagum posse."

Habetis potiores compressi oesophagi causas ab immortalis MORGAGNO traditas, ea perspicuitate eoque ordine, ut haud inmerito a GEUNSIUS omnibus praeponatur de hoc morbo auctoribus. Quoniam vero ab omnibus illis non suppar periculum imminet: operae profecto pretium erit, singulas a singulis discrevisse vidisseque et quae crebriores sint et quas aut rariores, aut dubias habere oporteat.

Ipse GEUNSIUS quarundam censuram egit: aliaeque cum aliis conjunctae visae sunt, ut quid cui-



que tribuendum sit, non facile definire poterimus, nisi plures casus contulerimus et comparaverimus.

Ex partibus, quibus hoc vitium adscribunt, sunt glandulae conglobatae et quidem primo loco dorsales sive Vesalianae, quae a VESALIO dicuntur in medio propemodum stomachi ductu saepe non appositae modo, sed in posteriori ipsius sede et ad latera adnexae, sive ut alio loco docet, glandulosum corpus, stomacho frequenter adnatum, quae quintae thoracis vertebrae corpori insidet. — Has neque semper hoc loco reperiri, neque ut ibi reperiantur et tumeant solas vix causas haberi posse dysphagiae lethalis, monet GEUNSIUS; quodsi inde nascatur, decubitu in dorso inter deglutendum levare animadvertit WICHMANNUS et casum citat pueri septennis hoc morbo, ut videbatur, laborantis et decubitu horizontali post pastum atque mercurio et cicuta sanati.

Quamvis igitur antiquiores observatores has prae aliis culpent, illas magis formidandas esse, quae inter oesophagum et tracheam interjacent capropter GEUNSIUS existimat, quia simul membranaeae tracheae partem comprimit natus ibi tumor citatque casum TULPII nostri sequentem lib. I. c. 44.

» Viduae cujusdam naupegi succrevit paulatim ex destillatione humilis ac latus tumor insidens firmiter lateri asperae arteriae paulum supra jugulum. Hinc impediri evidentur spiritus et tandem tantopere deglutitiones, ut circa summum tumo-

ris incrementum vix quicquam amplius transmissit gula, nisi forte exiguas aliquas lactis vaccini guttulas, quarum ope nequaquam ubi restaurarentur debite vires, majoris opis indigae, emarecuit necessario corpus et excessit ipsa non invita e vita.

Dissecto autem cadavere et denudata convenienter cute, offendimus hunc tumorem adinstar carcinomatis colore lividum et radicibus diffusum, per quamcunque colli partem. Potissimum vero circa gulam, premendo eam tam arcte, ut ex complicatis ipsius tunicis excrescerent intus varia filamenta, obturantia intricata sua textura usque adeo perviam hanc fistulam, ut ne ferreum quidem specillum per eam nobis licuerit transmittere. Intumuerant ad haec a perenni pituitae cursu tam vehementer glandulae in medio thorace gulae extrinsecus adpositae, ut nemo miraretur amplius, mulierem hanc incidisse non modo in summas angustias, verum in famem inexpugnabilem et novissime ineluctabilem mortem." Animadvertite quaeso, duo hic a TULPIO memorari vitia organica: alterum tumorem carcinomatosum, a quo vitio neque interna oesophagi facies immunis fuit: alterum tumentes glandulas pariter scirrhasas in medio thorace, gulae extrinsecus adpositas, ut huic soli tumori glandularum morbum adscribere vereamini idque eo magis, si observationem alteram GEUNSI cognoveritis anus obesae ex alio morbo

mortuae, in cuius corpore numerosissimae ad gulam cernebantur glandulae interque eas dorsales tumentes duraeque callosae, oesophago libero.

Praesertim glandulam thyreoideam prementem morbum facere, medici perhibent. Exempla proferunt inter nostrates HAENIUS et GEUNSIUS. In quarta apud GEUNSIUM observatione non tantum durior erat thyreoidea verum etiam inter oesophagum et asperam arteriam durae cernebantur glandulae quodque probe notandum, circa sedem thyreoideae paulloque infra eam stenochoria erat, crassioribus factis oesophagi tunicis simulque durioribus atque callosis. In HAENII observatione, secunda est, praeter thyreoideam, supra asperae arteriae dichotomiam, oesophagum inter et asperam arteriam scirrhus deprehensus est densissimus, solidissimus, durissimus, nucis moschatae fere aequans molem; oesophago quidem laxius, asperae autem arteriae lateri arctius adhaerens quodque dolemus, nulla oesophagi facta est mentio: quod eo aegrius ferimus, quia velum palatinum et columella admodum inflammata fuisse scribuntur. Itaque in illis quas pervestigare licuit observationibus cum *stenochoria* fuit: neque unius duntaxat glandulae vitio circumscribi solebat malum, sed plures simul erant vitiatas: immo GEUNSII observatio altera glandulas eo loco vitiatas ostendit, deglutitione licet non impedita.

Verum operae pretium est, proferre MORGAGNI

observationes, cujus summa in perscrutandis morborum caussis ac sedibus diligentia notissima est. In muliere octogenaria Epist. XV. art. 15. spirandi magis, quam deglutiendi difficultate confecta, tumor erat in asperae arteriae tergo, gulam quidem retropositam premens, sed tracheam multo magis. — Ex gulae sectione perducta ad pharyngem, haec intus maxime rugosa comperta est, sic tamen, ut digitis rugas dissolvere liceret pharyngemque ad amplitudinem justam reducere.

In tubicinis casu in quo aneurysma arteriae magnae et spiritum offenderat et deglutiendi nixum, de oesophago nihil relatum legitur, nihil in viri a VALSALVA adolescente dissecti, nihil in feminae ab eadem dissectae, nihil in ANTONII FERRARENSIS medici. In Marchione PAULUCCIO, absente ex officio MORGAGNO, ne sectio quidem facta est.

Quocirca in hanc rem ulterius inquirendum tenendumque erit, in bene multis casibus ad externam causam accessisse internam, nec raro plures in eodem corpore junctas cachexiam indicasse tanquam complurium morborum originem. Exemplo sit observatio prima BLEULANDI in qua compositum vitium fuit. Cadaver examinans, inquit, inveni in colli dextra parte supra claviculam carotidem inter et asperam arteriam induratum glandulam, habentem cartilagineam fere duritiem circiterque ovi columbini magnitudinem; circa septimam colli vertebrae nova detegebatur durities et

inspissatio, quae ipsum occupare oesophagum apparebat. Cum pulmonem dextrum a posteriore parte quodammodo pleurae accretum manu sinistrorsum reclinare conabar, vi illa, utut levi, solvebatur adhaesio non tantummodo, sed laceratio fiebat et ex foramine sic facto mox erumpebat materies albo-cinerea, spissa, grumosa, lac corruptum odore et habitu plane referens. Praesentiam vomicae illo in pulmone suspicans per factam aperturam inmittebam digitum et revera inveniebam saccum, medio in lobo amplum, dicto magmate repletum. Deinde prudenter digitum volvens revolvensque, ut de extensione ejus sacci judicaret, alterum offendo foramen et per quod intrans digitus ipsissimam materiem offendit. Sublato post haec pulmone vidi, quemadmodum ex dictis praevisum erat, patulam ex oesophago in incumbentem pulmonem fuisse viam: neque recenter facta videbatur haec communicatio, quum margines dictam aperturam cingentes essent valde scabri, inaequabiles, incrassati et viderentur etiam esse gangraenosi. Infra hanc degenerationem oesophagus parum inflexus ad longitudinem trium fere digitorum transversorum eandem servabat duritiem et ibidem tantopere per tunicarum spissitudinem diminutam habebat suam capacitatem, ut calamus scriptorium vix transmitteret. — Praeterea et hoc notandum, pulmonis dextri superiorem partem hic et illic exhibuisse puncta albida, ejus-

dem coloris, ac erat materia in ipso pulmonis sacco praeternaturali contenta. — Ventriculus in ejus curvatura superiore inter cardiam et pylorum ad sinistram magis, quam dextram partem habebat glandulam induratum superius memorata non multo minorem ejusdem duritiei ac coloris: adiacebant et huic corpuscula graniformia etiam dura.

Suberat igitur cachexia tuberculosa, quae et pulmonum vomicam creaverat et glandularum tumores et dysphagiam et febrem hecticam lethalem. Nonne indurationes istae scirrhusae vitii tuberculosi ipsiusque scirrhi adfinitatem subindicant ex intima ea quae heteroplasiae cujuscunque est cognatione. Cf. *Init. discipl. pathol.* §. 279 sqq.

Peculiare hujus generis signum est sensus obicis ad aliquam oesophagi partem, absque dolore cum quadam pressione ad dorsum et scapulas, qui quo magis versus inferiora percipitur, eo verosimilior opinio est, subesse oesophagi scirrhum. Nempe ille sensus obicis ad eandem semper sedem ejusmodi tumorem, indurationem vitiumque organicum denotat. Quoniam vero oesophagi scirrhus praecipue sedem inferiorem prope cardiam occupare solet, sensus ille obicis, ubi scirrhus iste subest, ad hunc potissimum locum percipietur. Caeterum hoc in casu lentiolem, tardiolem fore ciborum rejectionem, non est, quod moneam. Interim tamen tenere oportet, quo provectior fuerit morbus, eo citius reditura esse ingesta, prop-

ter ingravescentem oesophagi valetudinem auctamque ciborum aversionem, quemadmodum animadvertit medicus diagnosticus WICHMANNUS. Quodsi deuteropathica sit sive ex aneurysmate, sive ex pectoris abdominisve morbo dysphagia, ad illorum symptomata haec accedit, quemadmodum in tubicine fuit apud MORGAGNUM aortae aneurysmate interempto. Si ulcus oesophagi aortam exedat, ex haematemesi lethali peribunt, ut in observatione prima DOEVERENI factum videtur; historia enim morbi prohi dolor! deest; si asperam arteriam, deglutita partim in hanc illapsa tussim movebunt summamque anxietatem, ut in secunda DOEVERENI observatione accidit, in qua duo foramina in parte posteriore membranacea tracheae et materiam ulceris purulentam et potum et medicamina transmiserunt, quae omnia vasa aerifera pulmonum adeo oppleverant, ut hi ne minimum collaberentur, sed eandem retinerent figuram, quam sanissimo in statu habent, quamdiu nullus aër inter pulmones pleuramque se insinuavit.

Alia dysphagia ab oesophagi spasmo est, quae WICHMANNO teste a priori specie deflectit, primo quod interdum vespere praesertim remittat, quo tempore BURSERIO recurrere dicitur, deinceps vero, eodem WICHMANNO teste, perpetuo tenet, quemadmodum in alia quavis specie fieri solet. Quapropter ab ipso principio mentem advertere proderit ejusque repetere memoriam, etiamsi nec reticen-

dum sit, aliis quoque dysphagiis accedere spas-  
mum ex musculi oesophagi renisu vitali ideoque in  
hisce quoque non semper parem sentiri deglutien-  
di difficultatem, id quod et alii observarunt et  
Clar. etiam BLEULANDUS. Videlicet quamdiu non  
penitus occludatur oesophagi lumen, accedente  
spasmo ea deglutire non poterunt, quae eodem so-  
luto transibunt sat facile. Fallere igitur hoc sig-  
num posset, nisi ad reliqua attendatis. Itaque  
secundo loco praecipit WICHMANNUS, impedimentum  
deglutiendi ab aegrotante sentiri vulgo ad infimam  
oesophagi sedem ventriculo proximam ab eaque  
per hunc ipsum diffundi aut globum hystericum  
aemulari. Tertio plerumque subito nasci maxime-  
que urgere maximisque stipari incommodis, dum  
quae ex vitio succrescit organico, in principio lenis  
est et fallax atque ut BLEULANDI verbis utar: »tan-  
quam hostis est, qui per insidias atque latebras  
subdole irrepens, suas copias tacite ac paulatim  
adauget, donec tantas acquisiverit vires, ut qui-  
busvis auxiliis pertinaciter resistat, ac tandem ob-  
sessae provinciae plenariam inducat ruinam."

Quarto propter antispasmodicam caloris virtu-  
tem vel HIPPOCRATI notam, potus calidi tepidive  
facilius transeunt quam frigidi, si scil. parca simul  
copia sumantur.

Quinto liquida lente adsumta transeunt: cito  
aut copiose, statim revertuntur.

Sexto hunc spasmum aliarum etiam partium



spasmi comitantur motusque convulsivi: flatus, ructus, singultus, tremores, horripilationes, dolores vagi, verbo intemperiei nervorum symptomata.

Reim sequens historia morbi a WICHMANNO exempli loco proposita illustrabit.

» Puella quindecennis, nulla febre nulloque neque in collo, neque in oris cavo rubore aut tumore existente, quam primum liquidi quid aut potulenti epiglottidem tangeret, ingratham experiebatur sensationem idque exscreare cogebatur, ut pauxillum duntaxat per oesophagum descenderet: quo facto notabatur continuo ructus aliquis aut singultus, sine nausea aut vomituritione. Jam sine causa manifesta convellebantur digiti, jam tussis excitabatur spastica, jam delirium aut visus obnubilatio, aut dolores incidebant colici menstruales: eaque cuncta symptomata remediis antispasmodicis duodecim intra dies evanuerunt ipsaque aegra pedetentim liquida solidaque alimenta deglutire libere coepit. Verum anno sequenti rediere haec mala magisque saeva periculum minitari videbantur, e quo eripuit eam WICHMANNUS larga manu datis camphora ac moscho atque cordis scrqbiculo vesicante emplastro imposito, quibus remediis valentioribus ipsi prius uti nequaquam opus fuerat. Suppar JONSTONII aegra tincturae thebaicae guttulis quindecim omni quadrihorio adhibitis, sexta vice sanata est inque ZIMMERMANNI hysterica malum quinque annorum paucarum horarum spatio cataplasma antispasmodicum sustulit.

Casus, quem jure suo inter rariores numerat ZIMMERMANNUS, sequens est. » Bernae d. 21 Octobr. 1752. vocatus sum ad virginem annos natam xxxvi. Habitus c. erat tenuioris, nullo morbo acuto unquam afflicta, chlorosi olim per decem fere annos obnoxia, ita tamen ut menstruorum fluxus raro inde impediretur, quoties vero id accidit, malum semper cum difficultate respirationis conjunctum fuit. Hysterica inde facta est, jam diu enim con-questa erat de flatibus, *vaporibus* sic dictis, cephalaea, convulsionibus vehementissimis olim, nunc mitioribus et rarioribus. Sed malum, de quo agitur, vitium deglutitionis est, quo per quinque annos continuos laboravit. Cibum qualemcunque summo oportebat deglutire cum conatu, verum non descendebat per oesophagum, sed in ipsius media circiter longitudine subsistebat, sursum iterum rejiciebatur et in os regurgitabat, unde dolor oriebatur per totum oesophagum ad ventriculum usque; quare diaeta per quinquennium usa tenuissima, jusculis nempe omnis generis et quae similia sunt. Vitium hyemali tempore, noctu subito natum, difficultas tunc longe major erat, lingua etiam et uvula valde dolebant. Eodem tempore singultu saepe laboravit. Dolor etiam spasmodicus fixus praecordia per totum morbi decursum plerumque tenebat, unde respiratio non parum laedebatur. Oculi nullum extus detegebant vitium. Si uvulam excipias, quae grandior vido-

batur uno tempore, alio minor, ut adeo in illo tumore nihil fuerit constans. Medicus statim ab initio advocatus pronunciavit malum esse insanabile, idem dein a pluribus decretum est, aquas soterias Gurnigel quidem, ut interim aliquid fiat, adiit, sed pessime inde habuit. Curationem itaque sequenti ratione suscepi. Ex theriaca herbis et seminibus aromaticis, oleo macis spirituque vini camphorato cataplasma confeci, vulgare quidem, morborum enim altior cognitio, non magnificae novaeque remediorum formulae constituunt verum medicum. Ejusmodi cataplasma jussi, ut imponeretur calide collo et pectori a suprema parte ad scrobiculum cordis usque, non enim morabatur propositum loci affecti ex parte distantia. Cum adeo magna vi angustissimos corporis meatus penetrandi polleant ejusmodi pharmaca calide applicata. Eo ipso enim momento, quo superficiem earum partium tangebatur cataplasma, pharynx, oesophagus, ventriculus motu aliquo peculiari, ut agebat aegroti, affecti sunt, qui inprimis in pharynge per totam fere noctem perduraverat; hinc die insequenti panem jam deglutire valuit facile, absque obstaculo, absque regurgitatione, id enim cibi genus per quinquennium nunquam adsumpserat. — Reiterato cataplasmate eadem ratione, eadem ratione mane ejusdem diei ad prandium panem tunc deglutivit cum oryza (ut experimentum fieret) absque ullo praeternaturali conatu; inte-

rim in pharynge, ut ajebat, aliquod leve supererat impedimentum, quare totam maxillae inferioris partem cataplasmatibus quoque texi. Die tertio ad prandium ante novam cataplasmatidis adplicationem, carnem de capite vituli deglutivit cum levi ad uvulam obstaculo, caeterum absque ullo per totum oesophagum impedimento; aderat aliquis doloris sensus circa praecordia, sed ille deglutitionem non impediēbat. Sub vesperam, me praesente, crustam panis deglutivit ter, prima vice non nisi debilitatem percepit in musculis deglutitionis, altera vice uvula leve videbatur obstaculum afferre, tertia nullum plane aderat. Die quarto in uvula nullum supererat, impedimentum et nullus inter deglutiendum dolor, interim tamen ad illam actionem se praeparans aegrotis impedimentum inveniebat, sed spasmis tunc et tumore affecta erat maxilla inferior in uno latere, quod antea etiam alteri accidit. Die antecedente tumorem etiam in uvula observaveram, imprimis in apice, qui valde videbatur elongatus; sed brevior nunc erat et tumoris expers, ergo ubi spasmi erant, ibi tumor. Die quinto omne in deglutitione impedimentum penitus sublatum erat, evanuerant etiam spasmi ad angulum maxillae inferioris, quare tunc medicamentis internis curationem confirmandam esse judicavi. Dedi itaque pilul. Ruffi eodem die grana viginti, unde modice purgata, sub noctem pargoricum ut mos erat. SYDENHAMO. Die sexto ac-

cepi iratam praeterita die fuisse, quare convulsionibus passa est noctu, repetitis vicibus, quas excipiebant colica hysterica, deglutendi vis interim minime imminuta. Praescripsi tunc aliud paregoricum sub noctem iterum adsumendum, dein limaturam ferri cum extr. amaro in pilulas redactam per mensem integrum adhibendam. Hac ratione per aliquot dies sensim sensimque melius se habuit, sed redierunt paroxysmi hysterici et cum illis vitium deglutitionis, minori quidem gradu, quam antea. Pugnavi iterum iisdem medicamentis dato subinde syr. papav. alb. Ita ad diem usque 12 Nov. deglutitio restituta in integrum; addidi tunc martialibus antihysterica fortissima; sic sensim sensimque sanitas rediit, quae sub finem Decembr. 1752 integerrima erat. Optime se habuit aestate praeterita tota et etiamnum m. Januario 1754 quo ultimo de statu virginis illius inquisivi."

» Hysterica mala (ita de hac specie HAENIUS nostras) quam frequenter pessimas anginas aemulentur, deglutitionem laedant, hancque ob causam imponant incautis, notum adeo, ut opus explanatione non habeat; nec reperias qui haec ab eo quem tractamus morbo, non brevi discernat. Tamen mihi temperare nequeo, quin memorandum casum addam. Anno 1743 mense Novembri, contigit ut femina quinquagenaria, menstruo fluore carens, macilenta, hysterica, melancholica avidissime pisa dicta grisea comedens, sentiret fauces

sibi subito constringi, ut nec sursum premi videretur bolus, nec deorsum posse. Incassum fere omnibus, quae artis essent, tentatis, injiciendum esse decrevi enema eccoproticum ejusque peracto effectu, aliud ex vj unc. lactis dulcis et opii gr. iv paratum esse inmittendum. Oboriebatur inde placidissimus somnus eoque finito restituta in hunc usque diem deglutitio."

Superest tertia species dysphagiae, ab atonia et paralyti, senibus, apoplecticis, exhaustis propria, quae cognoscitur omnis doloris, ponderis, tensionis malique topici et obicis cujusdam sensus absentia, faciliori denique solidorum, quam liquidorum deglutitione. Nimirum oesophagus organon est musculare, quod et spasmo adfici et paralyti potest. Paralysis autem vel gravissimum spasmus sequitur, vel, quod crebro observatur, ab inanitione, summo senio, vitae torpore oboritur. Nec rara quoque apoplexiae sequela est, ex nervorum propter cerebrum oppressum resolutione. Haec dysphagia praeter eas quas indicavi notas: esse scilicet senum et apoplecticorum, facilius transire solida, quam fluida, nullam ab aegro designari posse sedem affectam nullumque excitare sensum neque doloris, neque tensionis aut ponderis, etiam specillo cognosci, nullum impedimentum offendente, monet WICHMANNUS simulque dolet hujus usum adeo molestum esse ac perdifficilem. Hanc etiam dysphagiam ipse exemplo illustrat. Vir robustus ac sanus quum magno appetitu offam grandiore non manducatam

cito devorasset, actutum impedimentum deglutien-  
di ita percepit, ut primo supra in oesophago tum  
infra in cardia deglutienda quaevis haerere viderentur. Nullibi doluit: sed mox omni deglutitione plane impedita etiam cochlear liquidi per oesophagum quidem descendebat, mox autem sine vomitu in os regurgitabat. In hac conditione versabatur usque ad sequentem diem sine dolore, dum nihil liquidi in ventriculum illaberetur. Sustulit malum WICHMANNUS liquore anodyn. Hoffm. ex saccharo, quod sensim in ore liquesceret. In hoc casu ex nimia distensione oesophagi atoniam paralyticam natam esse, verosimilis medici diagnostici conjectura est. Suppar casus est, quem ex *Praxi med. chirurg.* Obs. 8. Doct. VAN DER STERRE citat HAENIUS, rustici deglutiendi facultate adeo privati, ut nec liquida deglutire, nec solida posset; doloris caetera immunis. Caussam expiscanti sibi in praegressa aëris frigidi in calidum corpus alluvie eam sitam esse visum esse: extemplo ex sp. c. c. et tinct. castor. parata injectione sustulisse malum. Gulae quippe fuisse incipientem absque inflammatione resolutionem. At vero triennio posthac elapso contigisse idem, ad sese ut rediret agricola, quaeritans quam carnis offam esset deglutiturus, eam imis immobilem faucibus haerere. Tum primo pulcerrimae curae immemorem alia adhibuisse: sera autem vespera dum priora recordaretur, se hominem eodem quo olim modo de integro curavisse,

GEUNSI cognata, postquam annum et dimidium trium medicorum celebrium et peritorum consiliis frustra usus erat, tandem sanata est tinct. amara alcalisata ex gentiana contraj. lign. colubr. et c. curac. cum sal. tart., interposito subinde remedio laxante. Todiŭ aegrum ab hoc malo liberavit inf. quassiae, cujus extracto larga dosi dato feliciter etiam usus est WICHMANNUS.

Huic affinis est alia dysphagia, quam descripserunt GRASHUYS, BURSERIUS et BAILLIE. Nascitur ea ab expansione ac dilatatione tunicae oesophagi internae, aut quemadmodum vulgo animadvertitur, fit *pharyngocele*, *hernia pharyngis*, *oesophagus succenturiatus*, *diverticulum oesophagi* depictum in *Medical Observat. and Inquir.* Vol. III. cujus vitii egregia exstat BURSERII descriptio, quam hic adponam. "Obiit mense Decembri A. 1782 quidam ex dominicana familia 40 annos natus, quem ad summam maciem adduxerat dysphagia oesophagea, qua jam diu laborabat cujusque noxios effectus a prima juventute coeperat experiri, cum nisi sensim lenteque admodum mandere posset eique manu guttur, ut facilius deglutiret, comprimendum esset; et siquid cibi extremo suo vitae curriculo sumeret, licet omnino aut ferme liquidus foret, usque ad ima stomachi minime pervenire videbatur; sed illum identidem paulatimque aeger ex ore cogebatur rejicere. Dissecto cadavere hoc unum vitium organicum in eodem repertum est. Summitas oris



oesophagi aliquanto erat adstrictior. Pone oesophagum autem, quo nempe desinit pharynx, cavum inventum est, ad infundibuli speciem efformatum, in quod alimenta transibant. Quâ latius patebat, erat hiatus sive initium ejus apertum; infra post oesophagum descendebat adpendicee occlusa, inter ipsum nempe et colli vertebrae VI aut VII latos digitos longitudine adaequans. Statim ac ad oesophagi initium, quo nimirum arctior erat, pervenerant alimenta, a recto tramite deflectendo dictum cavum sive saccum ingressa ibi tamdiu morabantur, donec vi alicujus spasmi in eodem excitati sursum retropulsa exirent. Hujusmodi saccus erat quaedam veluti hernia extremitatis inferioris et posterioris pharyngis. Cactera nulla laesione erant affecta." Suppar casus est, quem cum GUL. HUNTERO communicavit experient. Chirurgus Bristollinus LUDLOW icone illustratus in *Med. Obs. and Inq.* Vol. III. p. 85 sqq. Cf. Tab. V. fig. 1, 2, 3. In hoc casu ex mechanica laesione manifesto natus erat morbus. Mechanicae pariter originis fuit casus dysphagiae a luxatione et musculorum pharyngis violenta distensione; quando videlicet nimis copiosa nec bene mansa cibarium quantitas in pharyngem protruditur, potest luxationis species succedere in appendicibus cartilagineis ossis hyoidis, quod in muliere Bononiensi observavit VALSALVA a deglutitione crassioris boli bovillae carnis non bene mansae. Putabat mulier (sic ipse rem refert

*Tract. de Aure* c. 11.) multisque imposuerat, se divexari a bolo in faucibus haerente; quem ut inde deturbaret, varia manuum et medicamentorum auxilia tentavit; sed incassum. Jamque elapsum triduum erat absque eo, quod ullum cibum, vel potum assumere potuisset, cum denique a me opem quaesivit. Ego vero omnibus perpensis, cum in aliqua ex appendicibus cartilagineis ossis hyoïdis luxationem suspicarer, partem, ut anatomica indicabat cognitio, ita digitis contrectavi: et ilico per unam, vel alteram contrectationem, omnia in pristinam sanitatem redacta sunt sic, ut immediate absque ullo incommodo jusculum sumere et cibum mulier modo desperata potuerit."

Caussarum, tum seminiarum, tum potentiarum nocentium genere comprehendunt senectutem, sexum femineum, diathesin scrofulosam, nervorum intemperiem, temperamentum melancholicum, animi affectus tristes, victum farinaceum, potuum spirituosorum, glaciatorum, ferventium abusum, tabaci fumigationem, voracitatem. Nec tamen omnibus procreandis omnes caussas aptas esse, facile tenebitis, varias cogitantes dysphagiae species antea a nobis propositas.

Itaque de singulis disseramus. Ad primum genus disponere dicitur senectus, in primis in sexu femineo, diathesis scrofulosa, temperies melancholica, quibus si accedunt moeror, tristitia, livor aliique animi affectus tristes, vitam deprimentes

et sorbitio theae aut caffeeae calidae fervidaeque victusque farinosus magna fore mali nascendi oportunitas.

Morbi historias relegentes, videbitis, plerasque feminas spectare easque seniores, nec paucas virgines annosiores. Apud HAENIUM casus primus feminae fuit senioris et casus alter et septimus et decimus et undecimus. Apud GEUNSIUM casus alter feminae fuit (quamvis induratis licet glandulis nulla fuit dysphagia) et tertius et quartus et quintus et sextus et octavus et decimus et duodecimus et decimus tertius et decimus quartus et decimus quintus et ex his quidem, plerasque post annos climactericos morbus prehendit. Mulieris etiam fuit casus a DOEVERENO relatus, quem memoravit in Dissert. sua BLEULANDUS, ejusdem obs. 1<sup>a</sup>. est hujusque observatio quarta, virginis annosioris: quadraginta nimirum et quinque annorum. De multis narratur, eas sorbitionum calidarum fuisse amantes. Ex viris aeger tertius HAENII, 50 annos natus antea spiritibus vegetabilium fermentatione et destillatione productis abusus esse dicitur. Aeger PRINGLIJ, num. 5<sup>o</sup>. ap. HAENIUM relatus, vir generosus erat, qui quum Maio mense a. 1712 esset perbacchatus, hoc morbo corripitur. Senex GEUNSIJ (*Obs. I.*) et vini spiritum et tabaci fumum ardebat et multum ab aëris intemperie passus erat. Strenuus etiam potator et fumigator erat vir, quem (*Obs. 10. num. 2.*) idem memorat. » Inter rerum

naturalium abusus (BLEULANDI animadversio est), referri hic debet nimia Tabaci fumigatio, quae suam amatoribus certissime plura damna, quam emolumenta profert. In iis enim, qui salivam copiosius affluentem continuo excernunt, privatur corpus humore ad masticationem, deglutitionem et concoctionem valde necessario; in iis autem, qui salivam hanc fumo mixtam deglutiunt, acritate nocet, exsiccatur partes internas et systema nerveum turbatur. Praeterea accedit huc, quod, dum de siccitate oris et excoriatione faucium conqueruntur, convivae remedium quaerant in proverbio: *ore vinoso bene fumatur*, dum saepius suo damno postea experiantur, quod hoc *in accensis ignibus ignis erat*.

Callosam cardiae angustiam natamque inde famem lethalem, quam vidit descripsitque Erud. TRILLERUS, induxerant potus glaciati quibus nostri quoque Luculli et Appii in mensis secundis delectantur. De potionibus fervidis caussarum numero adscribendis dubitant TRILLERUS et MORGAGNUS. Quo jure si quaeratis, respondeo illum frigore condensari quaevis ac indurari, calore contra relaxari, molliri scripsisse: atqui non de calidis aut tepidis, sed de fervidis sermo est. Hic miror, inquit, cum saepe veteres et certe cum Sinae, suarum consuetudinum retinentissimi, potu sint usi, utanturque ferventi, non saepius apud eos inventos esse et inveniri, qui laesa aut impedita

laborarent deglutitione , sed nec saepius apud nos , imo raro adeo cartilagineum oesophagum deprehendi , ut in Italia non meminerim , qui adhuc repererit praeter VALISNERIUM , qui tamen in eo homine et loco et tempore id repetit , ut abs theae aut caffeeae abusu repeti posse non videatur." Sane si haec aut unica , aut praecipua foret caussa , longe crebrior deberet esse inter nos , quam nunc est. Nec tamen esse haud raro non facile negaverim , neque ut negem me movent allatae ab MORCAGNO rationes. Nam , ne memorem , desiderari testimonia , quibus constet non saepius Sinenses ex laesa deglutitione laborare , neque si ita esset , negligendum esse clima nostrum humidum frigidum , quale et Angliae est , in quo vitium non minus vulgare est , monendum plus seminio ac diathesi sive scrofulosae sive scirrhusae , quam nocentibus potentiis tribuendum esse : unde fit ut feminarum hoc sit virginumque senescentium praecipue malignus , quibus tamen , ut viris ex vini spiritu , aut glacie niveque , ex potu calido seu fervido similis caussa subnasci occasio debet , qua fiat , ut *hanc* ante alias partem scirrhus teneat.

Errant tamen , quicunque putent , solam aetatem senescentem huic morbo patere. Casus quartus , quintus et sextus apud HAENIUM ex Act. Edimb. mutuati viros spectant aetate florentes. Casus sextus et septimus GEUNSI , alter mulierem 30 annorum , alter puellam ann. 17. verum priori ex para-

lysi, alteri ex scrofuloso vitio morbus originem traxerat. *Obs.* 11. BLEULANDI infantem attinet quinquennalem, de cujus tamen morbo non liquet, quamvis extispicium probabilem reddat ex tumore oesophagum premente futuram dysphagiam (l. l. p. 102 sq.) et WICHMANNUS, praeter PERCIVALLI casum, tres alios a semet ipse observatos profert (l. l. p. 175 sqq.) Ad spasticam dysphagiam disponit intemperies nervorum. Voracitas denique qua frustra nimia aut duriora deglutiuntur, tum nimia distensione atoniam paralyticam, tum pharyngis herniam, tum ossis hyoidis luxationem poterit facere. Recordemini quaeso quae supra de hisce animadversa traditaque a nobis sunt.

Vulgo malum habetur insanabile: quod sinistrum praesagium praecipue tangit dysphagiam ex caussa organica, sive scirrhosam, sive a glandulis induratis, sive ex pharyngis hernia; quae vitia organica, quo proVectiora, eo minorem admittunt spem sanationis. Nec tamen prorsus insanabilia esse, docent exempla a GEUNSIO, WICHMANNO aliisque prolata. Spasnum absque intermissione vidit sanavitque duodecimo die NIC. OOSTERDYK; post quinque annos in femina hysterica ZIMMERMANNUS. Paralyticam dysphagiam curasse legimus GEUNSIUM nostrum, TODIUM, WICHMANNUM. Cernitis, etiamsi rarae aves in terris sint, tamen non deesse exempla curationum feliciū morbi, qui vulgo, nec sine caussa, incurabilis reputatur. Verum agite

morbi atrocis undique conquiramus remedia eaque singulis casibus aptemus.

Itaque primi generis curatio solventem poscere methodum, alterius antispasmodicam, tertii antiparalyticam ferunt. Prisca remediorum solventium sive resolventium classis per omnem patet sylvam medicam, ut et lenissima dulciaque et acerrima maxime et virosa hoc nomine medici complectantur. Vos igitur si scire aveatis quaenam tandem sint illa resolventia, in quibus spem ponere vestram liceat tanti mali curandi; nam de hoc nunc dicemus, ne nimium aberremus; hydrogalam, lactis serum, lac ebutyratum cum melle laudabit HAENIUS, mercurium RUYSEIUS, hunc et antimonium et cicutam et saponem nostrates pariter GEUNSIUS et DOEVERENUS et BLEULANDUS. En lenia simul et acria, immo acerrima! quippe mercurius etiam corrosivus hoc nomine celebratur; quorum leniora mitioribus forsitan ingeniis, acriora audacioribus arridebunt; alii cui fidem habeant auctori dubitabunt. An igitur viri illi quos laudamus forte fortuna inciderunt in haec medendi genera? Durum foret ita de singulis statuere, quorum nullus, me iudice, empiricorum gregi adnumerandus est. Quare conabor dissentientes artis magistros inter se conciliare et variam singulorum methodum suo loco et pretio habere: sic ipsi inde forsitan proficiemus. HAENIUS igitur simplicioris medicinae Hippocraticae fautor densam quidem esse sylvam] reme-

diorum ad obstructa reseranda fatetur, sed simul inertem eorum in rebelle malum actionem esse queritur. Methodum aliam ergo examinandam esse quam vaga experimenta docuerint, effectus probarint, confirmaret ratiocinium. Qui inchoante morbo medica ope vel non utuntur, vel carent, hydrogala, lactis serum, lac ebutyratum abunde haurire: multosque screatum incipientem pectori adscribentes ad moderandam illam mel adjicere iisque quam plurimum usos levamen saepe capere. Mortalium candidissimum simulque sapientissimum HERM. BOERHAAVE se hac in re suum errorem addidisse fatentem, quondam risisse se ajebat HIPPOCRATIS simplicitatem in variis abdominis morbis aquam mellitam, iners remedium, praecipue laudantis: ea quippe se fuisse opinione imbutum, ut acriora medicamina sola esse crederet in morbis quae forent actiosa: id tamen observasse, qui systematis hujusce poenas luerent, ipsos aegros suos esse, scirrhusa imprimis diathesi laborantes, Hinc sese taedio affici, infortuniis lassari, legendoque ac ruminando HIPPOCRATI se totum se integrum dare asseverareque sese et posse et debere, Hippocratica sequentem se egregie nonnunquam inveteratos morbos curasse, immedicabiles levasse feliciter. Cui praeceptoris testimonio haec addit discipulus HAENIUS: sane quotquot hujusmodi aegros curandos habui, hos vitam observavi tolerabiliorem egisse, dum in *provectiore* hoc morbo hisce simpli-



cissimis uterentur; immo nonnullos integræ sanitati redditos, qui, inchoante malo, horum usum et copiose et diu adhiberent: efficaciorē autem hæc opem attulisse, cum herbis et emollientibus et saponaceis apte juncta."

Notate, leniora mitioraque hæc remedia ab HÆNIO laudem potissimum in morbo scirrroso eoque provectiore. Jam vero HÆNIO adsentimini reputantes, verum scirrhum insanabilem esse et propter carcinomatis metum sola leniora demulcentia admittere: alia efficaciora resolventia tunc tantum tuto posse adhibere, ubi suspicio sit tumoris scrofulosi. Tunc præsertim ea utilia deprehenduntur, quæ antiscrofulosa virtute maxima pollent: mercurius, antimonium, cicuta, quibus vel solis, vel unitis ut in formula Plummeri utendum est. Et mercurium pridem jam in hoc morbo commendavit adhibuitque summus noster RUYSCHIUS *Advers. Anat. Dec. 1. n. X.* sive potius RUYSCHIO consilium probante Vir. Doct. MENNES Physicus et Consul Civitatis Hulsti in thesaurario Groningano, qui pyralismo mercuriali feliciter sanatus est. Neque in hoc aegro tantum ex tumoribus glandularum, verum ex ipso oesophago morbo deglutitionis vitium natum esse existimabat Doct. MENNES, qui in Epistola ad RUYSCHIIUM data: partem affectam ponebam latitare, scribit, in tunica glandulosa oesophagi aliisque faucium gutturisque glandulis, præprimis circa quintam aut sextam colli vertebam:

ad haec quoque symptomatice tunicam musculosam fore affectatam.

Quocirca minus accurate WICHMANNUS, primo RUYSCHIIUM invenisse hoc remedium, secundo in glandularum tantum morbo adhibitum esse praecipit, in dysphagia ex causa occulta inventum esse recentiorum temporum, atque Anglorum praesertim. Quisquis autem methodi fuerit inventor, quam vel ante RUYSCHII aetatem cognitam esse conjicio, certum est saepius postea fuisse adhibitam, nec sine fructu. GEUNSI observatio septima et octava vim mercurii salutiferam testantur, pariter quatuor aliae ex relatione aliorum medicorum, sub observationis nonae titulo consignatae: quorum alii mercurio dulci, alii mercurio sublimato corrosivo; alii solo hoc remedio, alii simul sulph. aurat. antim. extr. cicut. usi sunt. Quo loco animadvertendum Obs. VII. GEUNSI spectare puellam scrofulosam, Obs. VIII. virginem 32 annos natam, cui mercurius quamdiu eo utebatur profuit; postquam ab eo desistebat, malum increvit tandemque hectica lethalis accensa est; reliquarum aetas non relata est. Neque relata est in uxoris historia sutoris, quam cum amico WICHMANNO communicavit medicus Brunsvicensis WAGLERUS, quae ex deglutatione difficili primum, impedita dein septem menses integros laborans solaque liquida, non sine magno molimine detrudens jamque ex hectica febre deperiens intra tres septimanas perfecte convaluit

pilulis ex mercurio sublimato majoribus Hoffm. quales descripsit Jacobi. Ipse utiliter usus sum Plummeri formula ex merc. dulc. sulph. aur. extr. cicut. in femina sene. Magis tamen placent frictiones mercuriales, propter ipsam deglutiendi difficultatem. Caeterum remedia ea forma sunt praescribenda sive solida, sive fluida, qua facillime possunt exhiberi. In puerulo septenni, cujus avus ex dysphagia perierat, post adhibitum frustra mercur. dulc., sanationem perfecit WICHMANNUS pilul. de sapone et extr. cicut. similique emplastro, scrobiculo cordis imposito, tum decubitu horizontali per horam post pastum. An in hoc glandulae dorsales Vesalii, quae WICHMANNI opinio, induratae? (p. 173 sq. *Cff.* p. 175 sqq. l. l.)

Haec indolente scirrho aut tumore serofuloso tentari poterunt. Quamprimum vero sentiuntur dolores et suspicio suboritur scirrhi in carcinoma tendentis, solis utendum est involventibus anodynis omniaque caute vitanda sunt stimulantia, acria. Atque haec de primi generis curatione.

Alterius generis curatio antispasmodicis absolvitur, sive stimulantibus: asa foetida, castoreo, moscho, camphora, quorum priora hystericis praesertim et hypochondriacis idonea sunt; sive sedantibus, opio inprimis, tum extus tum intus adhibitis.

Feminam *Obs. X. Art. 1. ap. GEUNSIUM* commemoratam in morbo plurimum spasmodico multum levaminis percepisse a cataplasmate emolliente ex se-

min. lini similibusque, ipse refert. Cataplasmate antispasmodico ex calidioribus parato ZIMMERMANUS, ut vidimus, diuturnum solvit in muliere oesophagi spasmum. WICHMANNI puellam hystericam sanarunt medicinae antispasmodicae et vesicans nuchae impositum cunque reverteretur, camphora et moschus magna dosi et epispasticum ad cordis scrobiculum. Praecipue vero celebranda opii virtus est, quo tum medicus Anglus JOHNSTONE, tum ante eum nostras DE HAEN usi sunt. HAENII casum propter curationis simplicitatem retuli. Is uti enema opiatum sapienti consilio injiciendum curavit, sic mihi tum opiatum emplastrum, tum linimentum opiatum collo infricandum proficua fore videntur.

Tertii generis antiparalytica curatio (nisi vera subsit oppressio virium) stimulantibus perficitur excitantibusve auxiliis, quorum ab aliis laudatur injectio ex spir. cornu cervi et tinct. castorei, ab aliis gargarismata vinosa, spirituosa, ab aliis suffitus et frictiones aromaticae, ab aliis emplastra vesicatoria inter scapulas, fluidum electricum, liquores alcoholici, tinctura quassiae amarae. Sed felicitum sanationum exempla quaedam proferre praestat, quam, ut fieri solet, medicaminum exhibere ambiguum catalogum. Itaque agricolae, cujus meminit, citatus antea medicus VAN DER STERRE, ex oesophagi paralysi rheumatica aegrotanti extemplo ex sp. c. cerv. et tinct. castorei pa-

rata injectio sustulit malum. PLATERUS vetulam in Nosocomio cum amissa loquela in summam incidentem deglutiendi difficultatem pluribusque septimanis jure carniū et lacte aegerrime sustentatam, demum sanitati integrae reddidit solo, quem ex salvia vino incocta parasset, gargarisatu et aqua vitae, cui thymus intabuisset, ore contenta. In suppari atoniae casu liq. anod. Hoffm. saccharo instillato, ut pedetentim in ore liquesceret, virtutem nerveam restituit WICHMANNUS idemque quatuor annorum puerulum cibis potulentisque frigidis curavit, curae succedente febre ex intermittentium genere. GEUNSI aegro, cujus supra mentionem fecimus, tinct. amara alcalisata profuit. TODIUS aegrotantem ab hoc malo quassiae infusione liberavit inque casu consimili extr. quassiae largiorem usum saluberrimum expertus est WICHMANNUS. Ab atonia ejusmodi saepenumero vitia organica originem ducere, quae morbi primordia feliciter tolli posse potione anti-emetica Riverii aut sale absynthii ex vino rhenano, GEUNSI conjectura est.

Ne miremini AA! me longiorem fuisse in cunctis hisce remediis enarrandis. Malum enim pertinax magnam requirit medicaminum supellectilem.

Caeterum alimenta euchyma, eupepta ex lacto; lacticiiniis, ovi vitellis, decocto panis cum vino rhenano aut vino rubro austero, in alia specie alia conducunt: in paralytica solidiora, nutrientia, excitantia; in reliquis fluidiora, lacticinia, ovi vi-

tella; in spasmodica potulenta tepida. Quodsi via angustior nihil admittat, tubi ope alendi sunt aegri, aut clysteribus nutrientibus ex lacte, carniurn jusculis, praemisso enemate eccoprotico: quales clysteres nutrientes quoque injiciendi, ubicunque immedicabilis subfuerit pharyngis hernia, caeteris quibusvis sepositis.

Jure suo monet WICHMANNUS, ne male sano purgantium usu aegrotantium vires pessumdent perdantque medici, id quod sese vidisse testatur, pituitam videlicet, quae magna semper copia exscreatur, evacuandi consilio. A quo errore eo magis caveant oportet medici juniores, quoniam hanc solam mali causam esse opinantur aegri: cum tamen recte praecipiente SWIETENIO, minime morbi causa sit, sed effectus vocandus.

De clysterum nutrientium utilitate testatur casus, cujus mentionem fecit RAMAZZINUS (*Const. Epid. A. 1691. num. 21. Opp. p. 90 sq. Ed. Lond. 1717.*) » Sacra virgo de nobili familia Fontana, annum agens 25, habitu non malo praedita, sed in victu non satis temperata, ac praesertim in vini potu, affectione hypochondriaca laborare coepit, unde in omnimodam fere a quacunque re esculentata abstinentioniam incidit, ut ex solo vino victitaret. Persaepe illam monui, sibi ex hujusmodi victus genere superventurum gravem affectum, cui nulum postea esset remedium; quod contigit media hyeme, dum enim ad ignem adstaret, gravi syn-

cope correpta, mox in lectum delata, sibi restitui visa est, cumque ad illius vires ac spiritu restaurandos a monialibus porrectum fuisset jusculum, illud nullo modo deglutire potuit; factum experimentum de modico vino generoso, sed et illud licet adeo gratum in faucibus perstitit, nec guttulam quidem potuit demittere. Sic cum ad unicum diem sine febre, integris caeteris corporis partibus, sine cibo et potu perstitisset, apparuit qualis esset affectio, oesophagi nempe paralysis. — Ab eo ergo tempore, quo tali affectu correpta est, usque ad 66 dies nihil omnino esculenti aut potulenti descendere potuit in stomachum hujus miserandae virginis; vixit tamen per solum clysterem ex jure cum duobus vitellis ovi, singulo die meridianis horis inditum. Ad egerendas vero faeces tertia vel quarta quoque die indebatur clyster ex jure cum uncia semis hie-rae pro clysteribus, quo pacto faeces ex illo clystere relictæ excluderentur. Cum autem haec nobilis virgo ad diem 30. in lectulo semper jacens, adeo miserabilem vitam pertaesa, protestata esset sibi chariorem futuram mortem, quam hujusmodi vitam, respuit omnino hoc alimentum per clysteres, nec ullis precibus adduci potuit, ut sineret sibi hoc pacto produci vitam, donec Deo placeret, sed tandem circa vespas gravi deliquio correpta est, sed moniales ad solitum clysterem nutrientem, tanquam ad verum cardiacum confugere, ex quo miraculi ad instar aegra oculos aperuit et loqui

coepit atque ex gravi periculo tanquam expergefacta, usum quotidianum soliti clysteris admisit usque ad 66, ut diximus, diem, in quo monialis me praesente et monente, modico vini spiritu exhibito, deglutire coepit et spatio bidui restituta animalis facultas oesophagi laesi, ac in posterum non solum potulenta, sed esculenta libere coepit assumere, sed lectulo semper affixa, ob maciem summam, ad extremum spirituum languorem, ut pulsus vix perciperetur, erat perducta, subsequentis postmodum crurum doloribus et pedum contorsione. Casus iste admirandus hujus nobilis virginis non solum apud medicos, sed etiam per totam civitatem satis notus fuit. » Quorum (ita MORGAGNUS in hunc locum) diuturniorem usum utilioremque legisse non memini; quod auxilii genus in deglutitione non modo ex paralyti, sed etiam ex quacunque alia caussa impedimento, semper, vel quod facile, vel quod innocuum est, a medicis tentandum, *Ep. 28. art. 14.*

Ad levem itidem paralytin refert idem sequentem casum ab HEISTERO narratum." Vir nobilis isque jam senex a longo tempore hoc patiebatur, ut cum deglutire omnia posset, ultimum tamen bolum non posset, qui propterea ab uno saepe pastu ad alterum in faucibus remaneret, donec in subsequenti deorsum protruderetur. Nimirum haud aliter id contigisse credidi, scribit MORGAGNUS felix casus interpret, quam in senioribus urina om-



nis, alia aliam urgente, extruditur, donec ad ultimas guttas perventum sit, quas infirma vis musculorum nequit prorsus expellere. Sic etiam in illo viro priores boli insequentium pondere propellebantur, donec ultimus eo auxilio carens, a pharyngis autem musculis non satis adjutus, cogere-  
retur subsistere.

An casus ille prorsus immedicabilis; an frigidi aut glaciati potus aut cibi cum quadam spe successus tentari potuissent? An alia auxiliorum genera profuissent?

---

#### DE DYSPEPSIA ET VOMITU CHRONICO.

Antea vidimus de laesa ciborum deglutitione; sequitur laesa ciborum concoctio, quae dyspepsia vocatur. Illa oesophagum, haec ventriculum spectat. Eum videlicet nobis praescripsimus ordinem, ut quae ad vitam organicam pertinent chronicorum morborum genera, ordiamur a vitiata digestionem, tum de sanguificatione, porro de secretionibus excretionibusque, denique de nutritione agamus.

Et digestio quidem perficitur ventriculo, intestinis. succo gastrico, pancreatico, bile, humore enterico, quarum partium humorumque laesa valetudine ipsam quoque laedi necesse est. Nimirum ciborum in naturam naturae corporis nostri analo-

gam permutatio ventriculi partim actione absolvi-  
tur, quae actio suscitatur alimento, tanquam ven-  
triculi stimulo maxime naturali, cui accedat oportet  
succus gastricus tanquam stimulus inquilinus,  
quibus quidem stimulis cietur motus ventriculi  
peristalticus ejusque vires musculares. Quare si  
laesa fuerit ventriculi aut vita aut fabrica siquo  
mutati fuerint ipsius stimuli: alimentum aut suc-  
cus gastricus, ipsa quoque mutabitur digestio.

Nuper de hoc argumento librum edidit medicus  
Anglus WILSON PHILIP sub titulo: *a Treatise on  
indigestion and its consequences, called nervous  
and bilious complaints; with observations on the  
organic diseases in which they sometimes termi-  
nate*, cujus septima editio prodiit Londini anno  
hujus seculi trigesimo tertio. Librum hunc vobis  
de meliori nota commendatum cupimus: quando-  
quidem ab auctore morbi hujus phases perquam  
perspicue atque accurate traduntur. Ejus quippe  
tria stadia posuit: primum neurosin, alterum phlo-  
gosin, tertium vitium organicum comprehendit,  
ut quod in aliis etiam morbis prehendere licet, a  
nervorum valetudine ordiatur tragoedia inque or-  
ganorum remotorum etiam, sed tamen consentien-  
tium laesionem finiatur.

Dyspepsiae symptomata vulgo esse feruntur:  
sensus molestiae et ponderis a cibo sumpto, ructus,  
flatus, borborygmi, sapor oris depravatus, ano-  
rexia, carebaria, abdominis dolores, epigastrii ten-

sio, horripilationes, lumborum, artuum gravitas, alvus irregularis, ut plurimum tarda, quibus additur, aegros sentire sensum istum oppressionis ad cordis scrobiculum, alimenta in ventriculo moram agere, spontaneam subire fermentationem; hinc fieri ructus, flatus, borborygmos, saporem oris vel acidum esse, vel fatuum, vel tanquam ab ovis corruptis putridum, prouti alia aliave in ventriculo haereat colluvies; depravari adpetitum; propter consensum capitis percipi et artuum gravitatem, alvumque ob torpentem motum intestinalem tardari; urinamque saepe turbidam esse. Praeterea sub ipsa digestionem febriculam oboiri: hinc a pastu horripilationem, frigus, cutim anserinam, manus, pedes frigidos fieri, capite calido; inde circulationem auctiorem esse, redeunte calore: hosque motus febriles turbatam indicare ventriculi actionem.

Haec symptomata partim idiopathica et protopathica, partim sympathica, deuteropathica minime cuncta eodem tempore accidere solent, sed alio alia, pro ea qua increverit morbus ratione, quemadmodum bene vidit exposuitque, quem laudabamus medicus physiologus WILSON PHILIP; cujus igitur factae circa ea variaque morbi stadia observationes vobis tradendae sunt. Idcirco percurramus, eodem duce, haec morbi stadia ac quae singulis propria sint symptomata discernamus.

Prima symptomata dyspepsiae, hoc auctore, ea

sunt, quae continuo nascuntur ex ipso alimento crudo indigestoque, aut conditione ventriculi et hypochondriorum, quae morbum creat, nervorumque irritatione, quam tum cibus crudus tum ipsae eorundem secretiones depravatae faciunt. Quae ab alimento crudo proveniunt symptomata haec sunt: flatulentia, distensio ventriculi et hypochondriorum, ructus acidi, rancidi, putridi. A ventriculi intestinorumque debilitate nervorumque irritatione major subnascitur symptomatum varietas. Cogitate vel emetici, quamdiu ventriculo continetur actionem, qua adpetitus deletur, nausea concitatur, subinde dolor et ex sympathia cum universi corporis partibus debilitas universalis, quae proxime remota est a syncope. Cutis pallida est, frigida, contracta cordisque vi fracta, pulsus fit parvus et debilis: tremant artus ipsaque mens anxiosa est atque oppressa. Verum singula persequamur. Saepius homines accusant sensum plenitudinis stomachi post pastum et flatulentiam ructusque acidos; valetudine fruuntur caeteroquin prospera atque victu mutato ab his molestiis liberantur. In plerisque casibus autem, sive propter aegri incuriam, sive propter causae pertinacitatem, haec symptomata redeunt. Id nunquam fit, quin aliae canalis cibarii partes in mali societatem veniant. Itaque harum incipiunt secretiones a sanitatis norma deflectere: os mucosum fit, lingua immunda, mane potissimum: secretiones intestinorum et

copia minores et mutatae dotibus; hypochondria tensa, praecipue a pastu, alvus irregularis. His symptomatibus concitatur aeger ad sumenda quae alvum reserent: siticulosus est, adpetitu vario, pedibus frigidis. Ea symptomata pedetentim increſcunt majorque notatur imbecillitas mentisque languor inque somnum proclivitas et jam mens anxia fit deque morbo sollicita. Tum alvi dejectio abnormis fieri, varia, multicolor, biliosa, mucosa, crudâ, membranacea, nec levans et urina demutari et sedimentum deponere rubrum, lateritium, album et oleosam pelliculam contrahere et tandem alvus cruenta deponi et spasmo stringi rectum (\*). Interea temporis aeger variis symptomatibus opprimi, colicis doloribus, ardore ventriculi, cephalalgia, sensuum hallucinationibus, faucium ulcerationibus, affectionibus vocis et loquelae, spasmis trunci, artuum torpore, macie veraque virium imbecillitate, horripilationibus, congestionem in cerebrum, inflammationem palpebrarum, tinnitu aurium, temporum pulsatione, hebetudine, somno turbato, dolore capitis frontali, vertigine, anaesthesia, pectorisque visceribus laeſis, dyspnoea, tussi, palpitatione, dolore lateris,

---

(\*) Sedimentum rubrum cute sicca ab acido lithico (urico) esse: sedimentum album phosphaticum eesse similemque pelliculam opinatur auctor; ex recti strictura denique faeces exire contractas filiformes.

dorsi, scapularum, femorum, pectoris abdominisque nocturno, pulsuum anomalia, in syncopen proclivitate specieque anginae pectoris. Haec primi stadii symptomata, tum idiopathica, tum sympathica a genere nervorum sunt.

Alterius stadii symptomata sunt partim ab hepate aegro, partim inflammatoria. Nempe vario morbi tempore ut plurimum post crebras functionis hepaticae turbas acutior sensus epigastrii dextri. Ita neurosis mutatur in phlogosin affectionesque sympathicae fiunt profectu temporis idiopathicae et quemadmodum ab uno hoc fonte puerorum encephalitides, puberum phthises, adultorum seniorumque arthritides, calculi urinarii provenire crebro animadvertuntur, sic in Angliae (nostroque etiam climate) omnium creberrima dyspepsiae sequela est phthisis dyspeptica, in qua cum primae officinae aegritudine pulmonum morbus jungitur: animo tristi, habitu corporis cachectico, tussi sicca, praecipue post pastum, deinde temporis profectu humida, expectoratione mucosa, purulenta, cruenta, dyspnoea sub decubitu majori, periodice recurrente, dolente cordis scrobiculo, sensu ponderis sub sternum, febricula ac macie nonnisi sero demum accedentibus, flatulentia, acore primarum viarum, alvo irregulari, lingua sordida, appetitu contra ac in reliqua phthisi deficiente: brevi cunctis symptomatibus haec phthisis stipatur, quae dyspepsiae sunt stadio altero, cum quibus crescen-

tibus, decrescantibus, increscit decrescitque phthisis. Universe postquam morbus stabilem in pulmonibus figerit sedem, dyspepsiae symptomata remittunt, imo vigente phthisi tuberculosa, evanescent prorsus, in aliis vero casibus quaedam saltem perennant, neque plane explicatur pectoris morbus; Post obitum eadem in cadavere, quae in alia phthisi adparent pulmonis aegri signa, verum conjuncta cum hepatis vitio. Videtur autem morbus a ventriculo pyloroque ad vicinum hepatis lobum et ab hepate in proximum pulmonem dextrum progredi, ut si pylori, aut hepatis valetudo potuisset cohiberi, pulmo fuisset servatus, ex cujus vitio mors proximè pendet (\*). Procul dubio hoc pulmonum intestinorumque contubernium longè crebrius foret, nisi pulmonum esset viscerumque abdominis antagonismus, HIPPOCRATI jam animadversus.

Causae morbi remotae maxime duae sunt: tum laesa potestas discernendi, tum infirmatum robur ventriculi tunicae muscularis, ex duabus, quae hanc functionem absolvunt, actionibus: altera chemica, altera mechanica. Ex hoc sunt genere ventriculi a nimio cibo potuque ultra modum distensio, ex illo animi pathemata tristitia, gravis diuturnaue mentis contentio. Aliae praeterea causae sympathicae sunt: aër humidus frigidus, cutim et per

---

(\*) In pneumonicis lienis affectus crebro notavit MORGAGNUS.

hanc ventriculum laedens, tum morbi capitis, calculus renum, vesicae, caet.

Omnes autem caussae illae sive cominus, sive eminus nervos primae officinae feriunt, quibus aegris, ipsa tandem vasa aegrotant, ex neurosi nata phlogosi tum pylori, tum hepatis, morboque in pulmones translato ibique sedem figente, phthisis exoritur dyspeptica, serius ocyus lethalis.

Habetis succinctam dyspepsiae historiam, duce eo, quem modo citabamus, auctore. Quam ei adjunxit ille curandi methodum eo redit, ut in primo stadio laudet diaetam corporisque exercitationem, medicinas aperientes, stimulantes, tonicas easque, quae vitiatas secretiones corrigere aptae sunt: quo facto sympathicae affectiones evanescunt. Altero stadio ea, quae phlogisticae conditioni contraria sunt atque impediunt, quo minus sympathia in idiopatheim transeat. In tertio denique stadio, quae alteri quoque proficua habet mercurialia, sed parca dosi eaque crebro repetita. Nolo singula persequi, quae et empirica prorsus ratione et neglectu therapeutices universalis ad tironem conturbandum quam adjuvandum magis idonea mihi videntur. Quapropter quae ipse in hoc morbi genere utilia expertus sum, exponam.

Itaque cibandum est lente, modice, raro: cibus utendum est euchymis, eupeptis, nec acidis, nec pinguibus, nec liquidis nimium, corpus movendum est ante cibum et quoad per tempestatem li-



ceat, sub divo, adcommode ad vires, ad sudorem, aut lassitudinem certe: quae citra defatigationem sit, nec negligenda prorsus mentis exercitatio est. Post cibum demum bibere praestat; quam inter edendum, nec potu multo uti: post coenam alii haustum aquae frigidae purae cum saccharo: alii vini poculum commendant; quae praecepta singulis et morbi caussis et aegrorum naturis erunt adcommodanda. Nihil autem magis prodest, quam victu et copia et tempore uti iisdem, nihil contra nocet magis, quam qui multorum dyspepticorum mos est, eorum praecipue, qui ex nervorum intemperie aegrotant, victum perpetuo varium sequi et mutabilem, ut nullus dies alteri similis sit, quo nec stomachi vires probe cognoscere, nec alimenti, quâ corpus eget, copiam computare licet. Caeterum de omni hoc loco cum fructu consuletis tum Tractatus de Dyspepsia auctorem, tum prudentem doctumque Codicis Sannitatis scriptorem Jo. SINCLAIR. Nam longum nimis foret haec omnia explanare, praesertim cum non sufficiat communia tradere, sed vel maxime propria cognoscenda sint accurateque exponenda: quod in nullo magis genere morbi opus est, quam in eo, de quo dicimus. Therapeiam bene incipiunt ab emetico plerumque, ad amovenda scilicet cruda in ventriculo haerentia. Tum ubi acidi ructus antacida: magnesia, calx, pulv. terrestris, alcalina; ubi cum debilitate, corporis habitu frigido.

liquor cornu cervi; ubi alvus tardior, magnesia; ubi fluidior, pulv. lapid. caner. calx, cum mucilagineis juvabunt, ubi vomitus pertinax, pulv. aërophorus, aqua menthae, aut his morbo tollendo imparibus, pilul. ex opio et camphora ac vesicatorium in epigastrio ab auctore laudantur. Ante omnia vero causas respicere oportet. Alia dyspepsia est ex plethora ventriculi topica, in puellis propter catamenia non rite fluentia: haec curationem postulat antiphlogisticam, revellentem, derivantem, per sanguinis detractiones, venae sectionem in pede, hirudines ad femora, epigastrium, eccoprotica, clysmata demulcentia, pediluvia similiaque. Quae corporis inanitionem sequitur, cardiacam poscit medicinam, inprimis nutrientem illam, eupeptam, prudenter adhibitam; quae a topica ventriculi debilitate atque atonia tunicae muscularis amara, stomachica, praecipue flaved. cort. aurant. quassiam, gentianam, columbo. Nervinae hystericarum, hypochondriacorum dyspepsiae antihysterica, antispasmodica optime medebuntur auxilia. Rheumaticae antirheumatica opponenda remedia: pulv. doveri refracta dosi, vesicans, aut semivesicans, in cordis scrobiculo; gastricae subemetica, emetica, purgantia eaque quae bili, pituitae habentur adversa, aut bilem cicurare, pituitam e corpore subducere, evacuari valeant medicamina. Sympathicam dyspepsiam emendabunt, quae morbis primariis corrigendis idonea sunt. Tenendum

porro, duplicem esse ventriculi debilitatem: alteram cum irritabilitate, cum torpore alteram. Quae cum irritabilitate est, nulla fert irritantia, amara, spirituosae; ei medentur frigus, fomenta frigida ad epigastrium, alimenta, potulenta frigida, acida mineralia, aquae frigidae, saccharatae potus, scutum stomachicum opiatum, potio Riverii. Quae cum torpore est, amaris spirituosus tolletur, victu animali, vino post coenam sumpto, emplastro aromatico, aut epispastico, ad ventriculi regionem. Ad corpus denique universum roborandum cort. Peruvianum adhibere oportet, et martialia. Cum hisce tamen tonicis caute mercandum. Nam in ipsis corporibus senescentibus saepenumero plethora subest: in feminis ex aetate, cessantibus menstruis, in viris ex constitutione venosa haemorrhoidaria, arthritica morboque adultiori ejusque altero et tertio stadio, aut hepate, aut pulmone aegrotare incipientibus: quo in casu menstruae parcialesque sanguinis depletiones, hirudines ano admotae, purgantia leniora, eccoprotica antiphlogistica ventriculi viscerumque aliorum valetudinem restituent, iisque adhibitis, mercurio dulci suspensa manu porrecto, cum hyosciami, cicutae extractis, scut. stomach. ex empl. de hydrargyro et conio maculato imminentem praevertere scirrhum sola poterunt, quae roborantia tonica, amara, stomachica omniaque id generis remedia toties in summum aegrorum damnum praescripta, maturarent. Ex

iis quae hactenus disputavimus, intelligitis A A !  
quam vere dixerit WICHMANNUS, ventriculi debilitatem non semper, quin immo raro roborantibus solis emendari, quia non caussa sed effectus alius valetudinis esse consuevit, quae si curetur, curabitur ipsa.

Ea si negligatur curatio dyspepsiae, in vomitum transit chronicum, morbum gravem, discriminis plenum, saepe insanabilem, lethalem. Quae de dyspepsia praemisimus, faciliorem facient vomitus chronici intellectum. Est videlicet quaedam in morbis chronicis progressio notanda, qua quae primo fere dinamica fuerant vitia, tandem organica fiunt ipsaque organica magis usque increscunt: quae quidem progressio partim exinde intelligitur, quod cum in acutis vitae renisus morbi actioni adversetur, in chronicis contra validus ille renisus soleat desiderari hique igitur tardo gradu procedant semperque cum majores fiant, tum graviores. Is igitur vomitus chronicus, a pravo victu inductus, primo matutinus, inde post pastum observatur. Descripsit eum Jo. PET. FRANK in *Epit. de Curand. Homin. Morb.* Libr. V. P. 2. p. 369, quem de omni hoc loco conferatis. » Ob victum pravum pridie, vespere inprimis assumptum, potissimum cerevisiae, vini, spirituosorum abusus, alterâ mox die, hora matutina circa stomachi regionem constrictio ingrata, salivae copiosae aut pituitae tenacis excreatio, pravus oris sapor, ructus, nau-

sca et praecordiorum percipitur ardor. Sequitur haec aut aquae limpidae, aut albae tenacis pituitae vomituritio et cum ciborum reliquiis hinc inde commixtae eructatio. Ab his grata aegro quies levitasque oppressi prius ventriculi conceditur; sed in pristina diaetae vitia si revertatur, eadem quoque revertuntur, languet ciborum desiderium majorumque congeries malorum accedit." En Frankianam hujus valetudinis descriptionem, quam saepenumero in aegris meis verissimam expertus sum!

Ex observatione diagnostici acutissimi WICHMAN-  
NI in viris potissimum cernitur, facie florida, appetitu optimo cumque signa sint valetudinis prosperae, non facile sibi persuadent illi homines sese aegrotare, cum tamen symptomata memorata morbi lethalis indicent principium. Huic hoc tempore, id est in morbi principio nulla medicamina, sed sola medebitur mutatio diaetae, ita ut a coena largiori, praesertim vero a cerevisiae, vini, spirituosorum usu illo verpertino et abusu abstineant, quod nisi faciant vomitumque illum matutinum tanquam salutarem promoveant, sensim inmedicabilis oborietur ventriculi, aut intestinorum scirrhus. Nempe diaeta non mutata, post pastum semper revertitur vomitus, cum dolore obtuso ex cibis ingestis, aut manus attactu aucto, quae natum jam vitium ventriculi organicum indicant. Haec enim dolor ille obtusus in cordis scrobiculo et vomitus post pastum characteristica sunt ven-

triculi indurati, scirrhusi signa. Tum lactus perit in facie color, deletur appetitus, ipse habitus fit cachecticus, urget magis magisque bibendi necessitas, tremit nisi Baccho plenum corpus, summo maue jam vinosis spirituosus erigenda vita est et excutiendus artuum torpor, ut solo vini spiritu homines isti animari et vivere posse videantur. Ventriculi haec induratio interdum absque vomitu observata est, qui tamen si cum dolore isto adsit, magis certo illam indicat. Vomitus quo crebrior, eo caussa ventriculo prior; quo citius post pastum, eo certius haec in ventriculo ejusque orificiis latet. Est regula diagnostica, quam bene posuit WICHMANNUS l. l. pag. 179. Quamvis exceptiones ipsius complures esse, rerum testimoniis prolatis monstraverit WICHMANNI doctus interpret SACHSIUS l. lib. I. pag. 436 sq. Cf. pag. 515 ibid. Nec minus tamen praestabit hoc etiam signum in morbo perobscuris notasse. Scirrhus praecipue pylorum occupare deprehenditur: nec tamen semper ventriculum tenet, subinde etiam ad intestina nascitur eorumque cavum aut hanc ab caussam, aut ex aliis aliorum organorum vitiis arctatur, quae sua habent eaque propria symptomata. De his autem priusquam videamus, agite anatomen practicam adhibeamus vomitus chronici interpretem.

In memoriam redeuntis eorum, quae supra capite de gastritide a nobis adnotata sunt, intelligitis, qui viventes crebro et diu vomuerant, eos

mortuos ventriculum monstrasse scirrhum aut carcinomatosum (\*). Rem testantur ex antiquioribus VALSALVA atque MORGAGNUS, ex recentioribus PINELLIUS atque ANDRALLIUS. Quamobrem si quos aegrotantium vestrorum vomitus chronicus molestat, continuo scirrhi vel futuri, vel praesentis vobis metus incutietur, praesertim si senescens aetas et victus insalubris coiverint. Ne tamen, quod crebro accidit, semper accidere putetis, facient permulti casus alio referendi, de quibus hoc loco verbulo monendi estis. Mecum primo percurrite Sepulchretum Bonetianum ejusque Sectiones VII, VIII et IX. T. II. Et hic primo incidimus in Observationem XXI. Sect. VII, quatenus hujus loci esse videtur: fuit enim vomitus, non ab inflammatione ejusque sequelis concitatus idemque chronicus, quem scirrho perperam tribueritis, descriptus ab observatore probabili et cognitu dignissimus. » Ventriculi dolore diu premebatur immaniter faber lignarius, qui biliosi humoris vomitu mitescebat: hic post quatuor dies iterum recrudescere et eodem vomitu levabatur: malum biennio rediit in orbem, remediis minime succumbens. A flatu esse subortum medici inculcant, at calidis intus et extus adhibitis exasperatur. Sed cum excretum esset biliosum et continuo oris pateretur

---

(\*) Libr. I. Pars I. psg. 105 sqq.

amarorem, quae omnia ex igneo hepatis calore scaturire omnes norunt, frigidis curatus, nempe venaesectione, sero lactis, balneo et aliis convalescere non potuit: ecce inflammatione ventriculi oppressus triduo extinctus est. Dissecto et aperto corpore et investigata origine mali impliciti, vas choledochum ad ventriculi fundum implantatum inventum: meatus ergo qui regurgibat in intestina bilem, natura sua ad imum ventriculi locum implantabatur, unde miser hic continuo ob bilis suapte natura acris confluxum, tum dolore, tum bilis vomitu conflictabatur." ZACUTUS *Praxis Admiranda* lib. II. Obs. 1. Exemplar obfert vitii congeniti voinitus chronici caussae; unde verosimilis opinio, ab initio hunc exitisse, ut ipsa caussa aegro conata fuit; quamvis non diserte id indicatur (\*). Neque hoc perpetuum esse, alio discite exemplo consimili apud VESALIUM. » Is (*de Corporis Humani Fabrica* lib. V. cap. VIII.) nullam, inquit, vel minimam bilis vesiculae meatus portionem in ventriculum porrigi animadverti, praeterquam in uno pontificis tiremium remige. Hic enim ut aliis quibusdam organis et praecipue circa thoracis costas et musculos ab aliorum hominum fabrica variabat, ita et meatum hunc in duas dissectum portiones obtinuit, quarum minor graciliorve ventri-

---

(\*) Aliquando pylori contractionem et duritiem esse congenita, exemplis probat Doct. KNEPPELHOUT in Diss. laud.



culi fundo, qua primum vena dextram inferioris ipsius sedem ambiens, ventriculo committitur, inserebatur. Vir iste calidi quidem sicciue temperamenti fuisse videbatur. Ut autem resciscerem, num vomitu bilioso, quem hujusmodi hominibus frequentem GALENUS esse testatur, vexari consuevisset, ab ejus familiaribus diligentissime quaesivi, ecquid ejusmodi in illo observassent. Asserebant itaque, se nunquam illum vomentem; aut in maximis etiam procellis nauseabundum vidisse: verum ut erat robustissimus, ab omnibus eum praedicari affirmabant, quod longissimo spiritu subinde cornu inflaret, omnesque commilitones gravi voce et uno spiritu recensendis numeris longe superaret." Vos autem notate in ZACUTI fabro lignario ductum choledochum ad ventriculi fundum implantatum inventum esse; in VESALII vero remige in duas fuisse portiones meatum dissectum, quarum minor graciliorve ventriculi fundo inserebatur, ut ambigendi locus sit; utrum hac, an majori altera meatus portione praecipua bilis non in ventriculum, sed in duodenum uti oportet, et quorsum ducebat illa portio, effunderetur.

Suppari caussa, a vitio congenito nempe, ille vomitus est, cujus primo meminisse fertur GERARDUS BLASIIUS. » In dissecto cadavere 35 annorum creberrimis vomitibus diu vexato (id est, ut ego quidem conjicio, in cadavere hominis creberrimis vomitibus diu vexati) invenimus ventriculum du-

plicem, ita ut *prior*, qui oesophago continuus, ab altero, qui intestinis, manifeste distingueretur, *illo*, minor altero, ast crassioris substantiae, infinitis plicis iisque insignibus interius exasperatus, *hic* vero iis omnino destituebatur, tenuis valde conditionis: in *illo* fibrae carnosae plurimae occurrebant varii generis: in *hoc* vix ullae, saltem haud adeo observabiles; locus ille ubi duae hae cavitates a se invicem separabantur, interius valde angustus erat, sic ut vix digitum minimum reciperet: substantia ipsa hic crassa, duraque admodum, mollioris quasi cartilaginis speciem referens: et hanc angustiam frequentioris vomitus in hoc aegrotante causam fuisse conjicio (Obs. Med. IX. pag. 4.

Huic affinis casus est apud MORGAGNUM, Epist. XXX. art. 7. » Nobilis matrona Patavina, quae ab ortu usque saepe adeo lac rejiciebat, ut nutrix victuram desperaret, adulta nihilominus, nupta et jam plurium liberorum parens, cum quartum annum ageret et trigesimum, coepit in puerperio saepius vomitu laborare, a quo duobus post mensibus se liberum fore in posterum credidit, cum globum rejecisset quendam diametro duos pollices superantem, materiae tunc mollioris, sed quae mox aëri exposita, durissima post triduum inventa est. Verum spei non respondit eventus. Vomitus perstitit et quamvis a pluribus medicis diu multumque, modo lenius, alias vehementius oppugnata,

ad mortem usque, i. e. viginti quatuor ipsos annos perduravit. Redibat quotidie duabus a prandio horis. A coena non redibat, nisi postridie mane. Et licet alimenti genera mutarentur, semper recurrebat ad eundem modum, materiamque semper eiciebat subalbam, crassam, ductilem. Quam si mulier conaretur retinere, magnas in ventriculi regione patiebatur molestias, donec redderet; reddebat autem non sine conatibus: sed a vomitu omnia sedabantur. Alvus nihil nisi sollicitata egerbat: quod jam diu uno sine aegrae noxa obtineri poterat remedio, pilulis ut Venetiis vocant S. Fuscae, quarum perpaucae noctu retentae, mane leniter ut solent, alvum solvebant, sed nihil fere praeter aquosa dejicientem. *Coccolata* quoque retinebatur et ventriculum juvabat. Hujus regionem si manu explorares, nihil ibi, ut neque in reliquo ventre percipiebat, quod esset praeter naturam. Ad ea quae narravimus, accesserat biennio ante obitum pulsus intermissio. Matrona tamen solita vitae munia domi forisque obire non destitit, donec minus bene se habere sentiens et debilior facta novissimum vitae mensem in lecto exigere coacta est. Ibi cum omnia et in his *coccolata* quoque nauseosa jam essent, febris animadversa est, quae horis pomeridianis quotidie, vix aliqua tamen facta pulsus mutatione, increescebat noctuque calorem augebat. Pulsus erat potius magnus, sed ut solebat, intermittens. Cum propter alvi duri-

tiam medicum exorasset, ne obstaret sibi consuetis pilulis uti cupienti, immanis oborta est cordis palpitatio, quae etsi paucis unciiis sanguinis e brachio detractis ferme statim sedata est, mox tamen iterum ingravescens totidem e pede coegit detrahere, unde rursus imminuta est, non sic tamen, ut postea in sinistrum latus cubare sineret. Nulla misso sanguini crusta insidebat. Dies post aliquot, duritia alvi rursus urgente, lene clyisma palpitationem incitavit. Cum adversus hanc externa remedia nihil prodessent, interna autem ab aegra, quae alimenta vix aliqua et invita sumeret, pauca omnino admitterentur, in quibus stillata cerasorum aut melissae aqua et compositionum castoreum habentium nonnihil, quibus semel opii granum adjunctum est, nec quicquam esset, quod aut vomitum averteret, aut palpitationem sedaret, postremis quinque diebus pulsu infirmissimo, perexili et formicante facto, palpitatione autem persistente, alvus sponte soluta est, vel nimium, ut saepe et multa etiam dura ejiceret. Itaque perstantibus caeteris et paulatim extremis corporis frigescentibus, vivendi finem fecit matrona optima et ob id etiam vita multo longiori digna, quod mandavit moriens (id quod perpaucae mulieres facerent) ut diurni sui vomitus causa, per anatonem quaereretur, si forte illa inventa, auxilium ferri posset filiis, in quibus erat, quae jam vomitionibus tentari inceperat, adversus haereditarium morbum,

eodem enim quo ipsa vomendi incommodo, mater quoque jam ante plures annos extincta laboraverat. Itaque cum a me petisset nobilissimae familiae nomine collega meus ornatissimus Vallisnerius filius, ut dissectioni praeesse vellem, cumque a medico spectatissimo, qui annos postremos duodecim miti, ut decebat, curationis genere matronae affuerat, Petro de Marchettis, Petri Equitis nepote, ea omnia quae haecenus scripta sunt, accepissem: coram ipso aliisque medicis, in quibus cl. vir fuit, auditor olim meus, Dominicus Militia, dissectionem accurate instituendam curavi sub noctem ejus diei, quo die mane aegra discesserat VI. Idus Aprilis A. 1774.

Cadaver macilentum erat, nec tamen plurimum et sine artuum oedemate. Venter aquam habuit subflavam non paucam: omentum pauca pinguedine instructum, magnam intestinorum partem obtegens annexumque ad peritonaeum latere sinistro: ventriculum contractum et ubi accedere incipiebat ad pylori antrum, ibi contractum magis, ut in duos quadantenus esset divisus, parietibus et colore, si exterius adspiceres, secundum naturam, sed facie interiore quasi ab inflammatione rubentem. Inerat pars aquae, an jusculi novissime sumpti? cum quibusdam crassioribus portionibus viscidae illius materiae, quae vomitu ejici consueverat. In pyloro ipso et duodeno intestino nihil morbidum praeter internae faciei colorem, ejus similem, qui in ventriculo dictus est. Pancreas justa alioquin

magnitudine, quantum quantum erat, adeo candidum fuit, lobulis autem cum dissecari jussissem distinctis adeo et exsuccis, ut si aliquanto duriores fuissent; erant enim duriusculi, non modo ad scirrhi naturam accedere, sed in scirrhum jam prorsus conversum pancreas esse pronunciasset. Lien et jecur interius sana, etsi ille exteriore sola facie, hoc inferiore a dextris pallebant. Sed fellis vesicula parietibus cunctis tam crassis erat, ut nunquam sic vidisse meminerim: itaque etsi bile erat plena, quippe in ea quae tot dies tam pauca sumsisset, eaque bilis nigra erat adeo, ut interiori vesiculae faciem atro colore infecisset; facies tamen ejusdem exterior albicabat. Ob illam quam modo tetigi causam, ut ventriculus fuerat, sic intestina omnia et tenuia praesertim valde erant contracta, ut ea etiam, quae nuperrime praecesserat, nimia alvi evacuatio requirebat. Una ex omnibus intestinis appendicula vermiformis paulo erat turgidior eademque exterius rubebat. In mesenterio et reliquis ventris partibus nihil non secundum naturam animadvertimus.

Quae vitia in pericardio et corde reperta sunt, quatenus ad palpitationem et intermittentem pulsum attineant, aliis a me locis est indicatum. Quae vero in fellis vesicula et pancreate, illa ad vomitum spectare existimo. Crederem fortasse illam etiam ventriculi contractionem, per quam in duos quadantenus videbatur divisus; nisi eandem tibi structuram in duabus aliis mulieribus

descripsissem, quarum neutra vomitioni obnoxia fuerat, ut neque femina princeps, neque alia praeterea, in quibus ita se ventriculum habuisse memini. — Quodsi in VIII. Sect. Sepulchreti observationem invenies Blasii, qui ventriculum offendit duplicem in viro creberrimis vomitionibus vexato, has illum videbis non ab ea duplicitate, sed a magna angustia repetere ejus foraminis, per quod alter ventriculus cum altero communicabat: cujusmodi angustia in iis, quas ego observavi, nunquam fuit. Quid quod si observationem illam apud Blasium legas, conjunctam cum altera animadvertes ejusdem generis, in qua etsi angustia inter ventriculum utrumque non modo magna, sed maxima et summa fuit, homo tamen, nisi quod valde famelicus, erat bene sanus et quod consequitur, vomitionibus haud obnoxius. Quod si nihilominus in proposita matrona istam ventriculi structuram ipsam quoque aliquid ad vomendum fecisse malueris, quippe a primordiis facile junctam cum prava illa vesiculae et pancreatis dispositione, quae crescente aetate manifestior facta, vomitum induxerit insanabilem, non pertinaciter repugnabo. Certe autem crassitudo tanta in vesiculae tunicis minus obsequentem hanc reddebat ventriculi primorumve intestinorum pressionem, ut fortasse non satis ex ea bilis, quae erat insuper adeo vitiosa, exprimeretur. Pancreas vero exsuccum et ad scirrhi naturam vergens, quanto

minus succi minusque ad suos usus apti excerneret, facile potes existimare simulque colligere quam imperfecta ob utriusque illius humoris defectum ac vitium in duodeno intestino fieret chyli elaboratio quantumque ibi restitaret crassi viscidique et ejus intestini tunicas in diurnis praesertim corporis agitationibus sic irritantis, ut in motum denique inversum ciceret. Quodsi tibi liceat addere structuram illam ventriculi minus idoneam ad alimenta si non conficienda, at satis expedite in id intestinum compellenda: tanto erit proclivius causas intelligere vomitus istius tam diuturni."

Ut in matrona nobili MORGAGNI cum vomitu palpitatio cordis fuit, sic in alio casu medici Lipsiensis honoratissimi HADELBACH, qui memoratur in Diario Hufelandiano, Tom. V. pag. 821 sqq. pariter utrumque observatum est, ita tamen ut palpitationem tolleret vomitus, scil. pleno ventriculo cardiaco diaphragma, cor et vasa majora premente eoque evacuato, his partibus a pressione liberatis.

Lectu dignissima quoque historia mulieris est sexagenariae, quam memoriae protulit Cl. BLEULANDUS Obs. III. pag. 127 sqq. quamque tabulis illustravit notandumque in permultis una cum ventriculi vitio vitium fuisse in corde aut genere arterioso, ac si unum alterum vel provocasset, vel utrique una praefuisset eaque communis caussa: nec tamen in puella monstrosa apud SANDIFORTIUM



*Obs. An. Pathol.* IV. pag. 27. ventriculo duplici vasa aegrotabant. In BLEULANDI casu ventriculum duplicem fecerat premens aneurysma aortae abdominalis (quales a tumoribus ventriculi pressiones crebriores sunt duplicitatis ventriculi causae). Utrumque etiam conjunctumprehenditur in iis, qui scoliosi laborant, in quorum cadaveribus ex observatione ED. SANDIFORT lib. IV. cap. V. pag. 45 sqq. in nota, ventriculi ut et reliquorum viscerum abdominalium situs multum a naturali recedere solet meminitque virginis 67 annorum, in cujus corpore ventriculus tali modo situs conspiciebatur, ut coeco suo sacco superiora spectans, perpendiculariter descenderet ferme usque ad umbilicum, admodum expansus, tum contractus pergeret ad duos transversos infra umbilicum digitos, tectus partim principio coli, partim intestinis tenuibus, inde aliquantum per transversum decurrens, adscendebat et pyloro terminabatur.

Hanc virginem multis diversi generis malis per plures annos vexatam fuisse, scripsit Vir. Cl., nec tamen quibusnam diserte monuit. Vomitus creber fuit in casu situs ventriculi mutati apud HAENIUM *Rat. Med.* VI. cap. 1. §. 5, in quo ventriculus primo instar inversae lagenae ad umbilicum fere descendebat, inde angulo facto adsurgens atque canalem 4 poll. longum formans ad pylorum petebat; cujus miri phaenomeni gemina patuit causa mechanica: altera pancreas durum et tumidum,

altera immensum jecur. In altero consimili casu apud eundem l. l. pag. 17. homo ante ultimum suum ac brevem morbum nunquam vomuit, nec vomuit aurifaber RIVERII (ibid.) ingentem pancreatis ac mesenterii scirrhum gerens, qui pylorum jejunique principium ita angustaret, ut omnis fere praecluderetur transitus.

Habetis vomendi causas sine vomitu: quae tamen rariores sunt regulae generalis exceptiones. Minus rarae, quas prius descripsi in corpore situs ventriculi aberrationes: crebrior contra ejusdem, pylori praesertim scirrhus, id quod numerosae testantur sectionum historiae tum in Sepulchreto, tum alibi traditae, de qua vomitus causa cum a nobis scriptum sit, hoc loco cohortandi estis, ne quod juniorum praecipue medicorum vitium est, continuo scirrhum aliumve morbum organicum cogitetis, ubi vomitus est pertinax. Solent enim juniores medici magna ac grandia semper animo vivere, parva praetervidere et negligere atque ut in proverbio est, ex mure elephantem fingere.

Quam fallax sit diagnosi, pluribus exemplis ostendit CHARDEL, sive respectu naturae morbi, sive sedis, in egregia ejus de Scirrho ventriculi Monographia.

An ubi vomitus chronicus, alvi obstipatio, macies, dolor et tumor epigastrii, ibi ventriculi scirrhus? Negant historiae aegrotantium: viri quadragenarii et viri Carcassonnensis et feminae temperiei gra-

cilis et viri quinquagenarii cholericis. An ventriculi scirrhus ipsiusque pylori sine vomitu, sine dolore, sine dyspepsia, alvo libera? Adfirmant casus mulieris septuagenariae, quae rheumatismo et viri 57 annos nati, qui aneurysmate sive coeliacae, sive aortae aegrotare videbatur. An sedes certo definiri potest, cardiae, quae dysphagia, pancreatis, quae salivatione denotari creditur? Rem dubiam faciunt similis dysphagia ex spasmo, aut absens in ulcere ex scirrho, nec non casus morbi celeberrimi historici DE THOU, a RIOLANO traditus, in quo ex scirrho pancreatis tantummodo ponderis in regione epigastrii sensus, corpore erecto. Denique etiam tumor fallere potest, sive absens in scirrho ventriculi, ex tunicis lata plaga induratis in vitio cardiae, caet; sive praesens ex morbo aliarum partium vicinarum: hepatis, omenti, pancreatis, mesenterii, affectione nervea ventriculi, intestinorum et similibus et vomitus niger ab aliis causis multumque diversis repetendus. Immo quod difficile explicatu est, desiderabatur vomitus pyloro quamvis duro ac summopere contracto. Praeterea ingesta, aut contenta ventriculo interdum scirrhum tam exacte aemulantur, ut medico nisi caveat, fraudem faciant. » Dantur casus, sunt verba BLEULANDI, qui docent ab ingestis heterogeneis pylorum ex toto claudi posse omnemque viam ex ventriculo in duodenum intercipi." Idque filiae 15 annorum, quae inter ludendum nummum argen-

tenum deglutierat, et juvenis et infantum et viri exemplis comprobatur, quorum alii mortui sunt, alii nummis alvo excretis convaluerunt pluresque adducere se similes casus posse monet, qui docent, quam imprudenti consuetudine infantibus plerumque nummi in ludos exhibeantur, quum sic nullius periculi gnari semper dediti sunt ore volvendi, quae manus continent. Sed haec ut infantibus accidunt aut junioribus, in quos scirrhi suspicio vix cadere potest, ita exemplum aliud proferam, quod majorem in diagnosi difficultatem obtulit, ab eodem auctore scripto mandatum, ex ore praeceptoris Cl. VAN DOEVEREN exceptum. Homo per tres menses quaecunque comesta vomitu rejiciebat, unde valde debilis et emaciatus erat, ita ut omnem recuperandae sanitatis spem jam amisissent medicus et aegrotans. Tandem revomit multo muco involutum frustum quoddam durius, a quo maxime levatum se esse aegrotans indicabat, illudque corpus medico suo examinandum mittebat, quo facto et abluto muco, inveniebatur frustum majus Salinonis fumo indurati prorsus immutatum, quod alimentum paullo ante inceptas miscerías sese assumxisse in memoriam revocabat aeger; qui cessantibus symptomatibus, diaeta euechyma et eupepta cito reconvalecebat. Idem ab aliis factum (\*) duris, acribus, ossibus piscium,

---

(\*) Vomitus chronici exemplum ab hernia ventriculi

acubus, caet. exemplorum copia ostendit Celeb. SANDIFORT in *Biblioth. Med.* Tom. II; a vermibus (BLEULANDUS l. l. pag. 28 sqq.) ab insectis, ab aranea, a venenis, ex lactis melliti coagulis, quem casum notavit BLEULANDUS pag. 42 sqq. l. l. perdignum illum, qui a vobis legatur, tum propter symptomata gravia: cardialgiam, vomitum pertinacem signaque incipientis atrophiae, cum pulsus debilitate, tum propter curationem fortunatam; per emeticum, evacuato coagulo tenaci ejusdem formae, quae ventriculi prope pylorum.

Haec igitur, ne vos fallant, caventes et causas et symptomata et aegrotantis aetatem omnemque conditionem rimari oportet (\*). Verum eo, unde digressi sumus, revertamur.

In vomitu chronico ut plurimum subesse ventriculi ac praesertim pylori scirrhum, supra nota-

profert FREDERICUS CHARDEL in praeclara monographia de scirrho ventriculi ed. Paris. 1808. pag. 202 sqq.

(\*) Duo exempla notabilia habet LA MOTTE *de Re Obstetr.* libr. IV. cap. 17. Obs. 375: alterum matris suae, alterum gravidae feminae. His intropressa ensiformis cartilago ventriculorum in continuos egit vomitus. Feminis his, thorace in genua reflexo, cartilaginem digitis suis extrorsum duxit, hinc irritatione perpetua ventriculi ablata, curavit vomitum. Ad-dit casum frequentiore esse, seque plures cujuscunque aetatis et sexus ab indomabili caeterum vomitu sic curavisse. Cf. ANT. DE HAAN *Rat. Med.* VI. pag. 35.

*Lib. II. Pars I.*

vimus. Quantopere autem et hujus diagnosis medicum fallere possit quamque juvet, ne in casu quidem desperato, ut videtur, omnem spem abjicere, notabili exemplo docuit BLEULANDUS (Obs. I. pag. 113 sqq.) » Homo pauper, prope pagum Gouderak dictum, rure vivens, nomine JAN ROMEIN, medio fere mense Augusti a. 1780. ad me deducebatur. Summo cum dolore vix curvus incedebat, sinistra manu infra thoracem eidem lateri admota, querebatur fracta voce de intolerabili dolore, quem jam per quatuor annorum spatium erat passus, de rejectionibus dolorificis quorumvis assumptorum per vomitum; neque erecto corpore stare, neque jacere in lecto poterat absque insigni cruciatuum augmento: emaciata valde trahebat membra, pulsum habebat celerem, debilissimum, respiratio erat brevis et difficilior et post vomitum saepius jam deliquium erat passus; vitae ratio semper fuerat justa, neque potibus inebriantibus erat deditus; infusionem vero Caffee valde dilutam et justo fervidiorem amaverat et solitum cibum semper e farinaceis sumserat. Examinando locum, quem manu tegebat, inveniebam tumorem notabilem pugno majorem in regione hypochondriaca sinistra; hic tumor erat durus ad tactum, quem non tantum ferebat facile, sed et planae manus pressione levamen dolori afferebatur, ablata vero manu dolor augebatur, uti et quoties corpus erigere conaretur, vel lecto se sterneret, si quid cibi sumserat, statim revomebat, summis cum tor-

minibus admixto quandoque sanguine et grisea foetenti materia. Statim hinc de induratione non tantum ventriculi, sed et de carcinomatosa jam ipsius degeneratione suspicio incidit; cumque tales oesophagi degenerationes fatalem exitum saepius habere jam didiceram, nihil fausti de hujus casus eventu misero, cui praeter sanitatem quaevis vitae commoda deficiebant, promittere audebam; immo subitam ipsi instare mortem, augurari debebam. Ne tamen in rebus tam afflictis omni se auxilio aeger destitutum doleret, in desperato hoc casu cicutam praescribebam interne et externe sumendam; videlicet emplastrum septem pollices longum totidemque latum loco morbooso applicabam et succum inspissatum, nullis aliis adjectis remediis, conii maculati  $\frac{3}{4}$  praescribebam, unde pilulae gr. iii. fierent, quarum in initio ter quovis die unam, deinde duas, tres, quatuor ad quintam usque assumendas, atque omnibus assumtis uxorem ad me mitti jubebam, quae de ejus conditione certum me redderet. Post elapsos septem dies nullum nuncium accipiens, jam miserae vitae creptum aegrotum credebam, postridie vero attonitus ipsum deimproviso domum meam intrantem offendo, hilari vultu, lacrimas gratas fundentem atque profitentem, sese meo unius auxilio ab orci faucibus retractum esse, manum quidem ad locum affectum applicatum tenens, erecto vero corpore stabat, modo memorata narrans.

Penitius quaerenti, quemnam effectum medicinae praescriptae expertus esset, respondebat, sese quarto die post applicatum emplastrum, adeo eodem illo, quo duodecim pilulas assumserat, passum fuisse cruciatus intolerabiles, adeo ut propinqui atque vicini emplastrum removendum censerent, atque ulteriorem pilularum assumptionem dissuaderent; constans autem miser hocque consilium flocci pendens, perferre omnia malebat, mortem vitae, qualem per quatuor jam annos egerat, praeferebat: doloris haec vehementia durabat usque ad sequentem diem, quo circa horam nonam ante meridianam prius vomitu, deinde per alvum bene multam eiciebat copiam materiae albae foetentis, in ipsa evacuatione dolor non valde crescebat, imo paulo post quodammodo minuebatur vomitusque cessabat; sed per alvum eadem materies, quamvis minore abundantia, saepius emittebatur; nausea molesta post ingesta potulenta illum vexabat: jam vero vomitus erat nullus et dolor in diem decrescebat, ita ut nunc non tantum jacere, sed et erecto corpore stare posset: post remotum emplastrum inveniebam tumorem etiamnum fere ejusdem molis, nisi quod mollior multo esset, nec tam tumidus; itaque reposui emplastrum, atque easdem pilulas praescripsi, ita ut quotidie octodecim trium granorum ponderis assumeret; postquam iterum decem dies praeterlapsi erant, ad me rediit, acceptum ferens nuntium, quod vitii sui ma-



lignitas minueretur; nimirum liber ferme erat doloribus; fluida absque incommodo assumebat, si vero quaedam solidiora ingerere vellet, dolores quodammodo augebantur et postquam per tres vel duas quartas unius horae partes in ventriculo resederant, rejiciebantur; hinc inde maculis albis ejusdem materiae, cujus antea magnam copiam evomuerat, admixtis, quarum odor haud ita odioso foetens erat; habitus corporis parum erat restauratus; pulsus paulo plenior, lingua purior, respiratio facilior et alvus modice aperta interdum materiam purulentam secum ferebat: remoto emplastro, morbosum locum iterum examinabam atque inveniebam tumorem adeo imminutum, ut nullum vestigium tactu distinguere possem: novum applicari emplastrum atque pilularum usum continuari jubeo, atque ut jusculis carniū tenuibus et lacte aqua diluto, rejectis omnibus solidis cibis, aegrotus aleretur, curabam. Post elapsos iterum decem dies rediens nunciavit, quod sese jam multo melius haberet, omnibus malis symptomatibus, vomitu, dolore, anxietate aliisque penitus cessantibus, atque veniam rogavit cibos assumendi, quibus vires melius instaurari possent, ut sic sensim aptus redderetur ad laborem, quo victum sibi et familiae parare antea consueverat. Quod cum summa restrictione concedebam; sed simul extractum cort. Peruviani cum succo cicutae inspissato aequali dosi praescribebam, forma pilulari, ut sic triginta

sex pilulas gr. iii. quotidie assumēret, quibus postquam per tres menses usus esset, cum insigni habitus et virium emendatione, tandem pristinae sanitati omnino redditus, ad laborem rediit, quo in hunc usque diem alitur.

» Profiteor, ita in hunc casum qui descripsit commentatus est vir clar., me in hoc casu a nullo penitus remedio auxilium expectasse, et mirae hujus curationis modum non facile cum certitudine explicare posse." An materies cruda indigestaque in ventriculo et intestinis una cum strictura spastica, quam solvit cicutae virtus antispasmodica, qualem infaretum veteres appellare solebant, an chronica gastritis, an emphraxis aut abscessus lienis? Nascentem ventriculi morbum organicum dixeris, immo jamjam natum, nisi obstaret celeris ejusdem sanatio. Quid futurum fuisset, ex sequenti discite RUTSCHII nostratis observatione. » Non esse in medico semper relevetur ut aeger, varia nobis quotidie confirmant exempla, inter quae scirrhus ventriculi haud infimum occupat locum: Vir quidam in flore aetatis diu de ventriculi lacione et dolore conquestus est, demum tale mali sui sensit incrementum, ut prae dolore assiduo, diutius aura vesci haud potuerit, praeterea vomitus continui et animi deliquia ipsum non desererent, donec ultimum obiret diem. Cadaver aperiendi copiam mihi suppetebant consanguinei, cupiditate rapti, quidnam illum tam diu vexasset. Hostis

infestissimus in cadaveris apertione non diu sese abscondere potuit, sed statim in conspectum venit; fundus enim ventriculi ingenti erat obsessus tumore scirrroso, pugni fere magnitudine, materia tenaci et atra referto, qualem materiam quoque paucis horis ante mortem vomitionibus rejecerat. FRED. RUYSCH *Obs. Anat. Chirurg. Cent.* Praeter scirrhum ventriculi, pancreatis etiam scirrhus ex crebrioribus est vomitus chronici caussis. Hujus observationem sequentem MORGAGNO narravit HERACLITUS MANFREDIUS." Vir robustus, nulla manifesta caussa praecedente, conatu vomendi assiduoangebatur, sed praeter remedia et alimenta, quorum retinere nullum poterat, pauca et raro et haec aquea ac fere amara evomebat. Ad haec torquebatur magna siti, crebris quibusdam animi defectionibus et dolore praesertim, non secus ac si a canibus discerperetur, ad communes fines thoracis et ventris, quem si tangeres duri, aut renitentis percipere nihil posses. Cum his humilique pulsu, intra undecimum circiter diem est mortuus. Ventre aperto, jecur maximum conspectum est, sed sanum. Sana quoque intestina et ventriculus. Et mesenterium quidem non sine aliqua obstructione. Sed pancreas aequo majus totumque et tuberculis subrotundis neque exiguis inaequale et duritie ad cartilagineam accedente." Mirum videtur in hac observatione aegritudinis notas fuisse demum ab undecim inde diebus in viro ro-

busto, quamquam vitium pancreatis organicum procul dubio longo antea tempore existere debuit. Nec minus mirum sana conspecta esse jecur, ventriculum et intestina, cum rarum sit pancreatis absque horum viscerum vitium: uti in ea, quae sequitur historia monachi fuit, qui et jecur durum habuit et pancreas et duodenum.

Duo maxime characteristicae hujus vitii signa esse feruntur ptyalismus, sive salivatio et dolor in dorso: priorem indicavit plurimique fecit WICHMANNUS, atque glandularum salivalium actione vicaria, antagonistica intelligi posse censuit; posteriorem notavit una cum priore WICHMANNI commentator SACHSIUS. Cavete tamen, credatis, haec symptomata tam constantia esse, ut iis semper et certo morbus denotetur. Dolorem in dorso huic morbo abjudicat HARLESIIUS (in *Monographia de Morbis Pancreatis*) neque etiam in historia apud MORGAGNUM, de qua paullo ante, dorsi dolor commemoratur, verum ad *communes fines thoracis et ventris*. Salivationem non semper indicare pancreas scirrhum, siquidem et in aliis etiam aliorum viscerum morbis fuit et ab ipso pancreatis scirrho absuit, rerum testimoniis probavit SACHSIUS l. l. pag. 508 sqq.: immo ne ipse quidem vomitus constans est pancreatis aegrotantis indicium, quemadmodum testatur aurifaber RIVERII, qui ingentem licet pancreatis ac mesenterii scirrhum gesserit, pylorum jejunique principium ita

angustantem, ut omnis fere praecluderetur exitus; a tribus saltem mensibus, antequam adesset ipsi RIVERIUS et aliquo adhuc postmodum tempore, neque sponte vomuit, neque dato emetico vomere potuit, nisi eodem repetito; quamvis ventriculus materie esculenta et potulenta plenus a morte inveniretur. Neque in ABERCROMBII casibus (l. l. pag. 417 sqq.) haec symptomata fuerunt: in primo (num. CLI) eorum nullum, in altero sequenti dolor tantummodo et quidem hypochondrii sinistri in dorsum usque pertinens, in 3<sup>o</sup> vomitus fuit, qui tamen 8 aut 10 dies ante mortem cessavit, in quarto etiam vomitus ab anno inde sine ullo alio eminente signo; in quinto sola communia dyspepsiae symptomata ingensque cutis pallor et corporis imbecillitas animadversa sunt. Attamen has observationes rariores esse iis, in quibus haec tria symptomata animadversa sunt, is quem modo laudabam, SACHSIUS notavit. Varia autem erunt, quae facient, ut dolor vel minor, vel vix ullus sit; minor partium vicinarum, nervorum dorsalium praecipue a minus tumente eosque premente pancreate laesio, sensus aegri obtusior, lente aucta pressio, vis consuetudinis caet. pariterque salivatio vel major erit, vel minor, prouti majorem minoremve glandulae partem occupaverit morbus ejusque functionem laeserit. Nam nec omnis semper glandula induratur, nec eadem semper ejus pars; nec sola ea aegrotat, verum aliae simul partes: ventriculus, in-

testina, hepar, mesenterium, ex quorum morbo pancreatis morbus natus est, vel cum quorum morbo is conjunctus est.

Atque haec omnia considerare oportet, ut singulas historias legitima interpretatione illustremus. Hujus interpretationis periculum fecit in *Specimine Anat. Pathol. Inaug. de Pancreate* SAMUEL VAN PRAAG HEYMANS; nostrae Academiae alumnus, nunc medicinae doctor Haganus, quod prodiit Lugd. Bat. 1831. unde quaedam ducere lubet (pag. 98 sqq.) Si pars dextra afficitur, eam duodeni partem, quae mesenterium penetrat, comprimet omnemque alimenterum ex hoc intestino in reliqua tenuia transitum impediet, unde vomitus chronicus habitualis fiet, qualem casum HILDANUS profert similemque RAHNII, qui in alio casu observavit pancreas induratum et tumidum ex omni parte, quo tumore ductus choledochus ita comprimebatur, ut ex vesicula fellea bile distenta, ne minima ejus guttula in duodenum effluere possit; cui RAHNII casui respondet alter feminae ictericae dolores in abdomine lancinantes laesamque digestionem accusantis; in cujus cadavere hepar maximum cernebatur viridis coloris, continens tumores scirrhosos diversae magnitudinis et coloris interque hos massam tuberculosam et variis in locis cerebriformem; vesicula fellis multum extra marginem hepatis promi-nens habebat quantitatem insignem bilis inspissatae. Pancreas insigniter volumine auctum et fere to-

tum in substantiam lardaceam mutatum tumorem formabat, quo ductus biliferi toti quanti comprimebantur. Omnem hanc hepatis degenerationem adscribit auctor compressioni ductus choledochi tumore pancreatis, qua bilis in hepate stagnans hoc viscus irritando affluxum sanguinis majorem provocaverit, unde praesente inflammatione chronica hepatis substantia magis et magis fuit degenerata. Hanc ingeniosam viri doctiss. BRIERRE DE BOISMONT theoriam (huic enim et observationem et explicationem hanc debemus) confirmare videtur similis a nobis in Nosocomio notatus casus feminae ictericae, in cujus corpore et hepar tuberculosum sive scirrhosum et fellis vesicula extra ejus margines prominens et scirrhosum pancreas, quod parietem posteriorem ventriculi perforaverat ita ut margines hujus plagae partem pancreatis in ventriculo prominentem plane circumdarent. Ductus choledochi stricturae causam praebuerat induratio scirrhosa duodeni adeo, ut apertura hujus ductus paene clausa prorsus esset. In hoc tamen casu ex duodeno natus videtur morbus atque et ad pancreas et ad hepar porrectus propter impeditum humoris utriusque visceris ad duodenum transitum. Posset autem quaeri, utrum in casu priori a duodeno etiam profectus non sit morbus, quod saepenumero fieri, observationes monstrare videntur ipsaque, quam prius exposuimus ostendit historia dyspepsiae, duce maxime atque auctore

viro Doctiss. WILSON PHILIP. Alia eaque haud dissimilis dyspepsiae caussa posita est in suppari vitio intestinorum, quam pariter exposuit WICHMANNUS cujusque symptomata tradidit haecce: vomitus ab angustia cavi intestinorum oriundus non nisi diu post pastum (saepe duodecima demum hora) concitatur ac saepius per plures dies nullus est. Neque cibus expellitur, verum mucus (aut quae aliorum et mea observatio est, bilis viridis). Pressio in scrobiculo cordis non perpetua est, sed pluribus demum a pastu horis. Induratio faecilius tactu percipitur; post exonerationem artis beneficio tantum aegritudinis levamen, ut morbum periodicum aemuletur. Borborygmi fiunt in infimo ventre. Alvi major et pertinacior adstrictio est. Vomituritio ac vomitus incidunt, quo tempore manifestus excitatur in scrobiculo cordis dolor: aeger melancholicus esse animique habitu tristi solet. In haec symptomata notat SACHSIUS, duodenum aut ilei principium magis, quam colon spectare, quae tradidit WICHMANNUS ideoque addendum his signis esse sensum ponderis in ventre, ubi aegrotantes in latus decumbunt, tumorem esse in latere sinistro praecipue inque illud latus inclinare, in quod aeger decumbit, idemque addit, eadem facere posse symptomata faeces induratas, alvi infarctus, venena saturnina. Interim notandum est, longe crebriores esse scirrhus intestini crassi, quam tenuis. Cf. VOIGTEL l. l. II. pag. 553.



Exstat casus apud ABERCROMBIUM stricturae coli, in qua sola symptomata, quae animadvertebantur, erant ventris aegritudo cum alvi adstrictione, incremente semper virium imbecillitate neque vomitus perquam urgebat: quocirca FRANKIUS: » mirum est, inquit, quod haec vitia saepius per annos sine turbis praemagnis, si flatus, oppressionem ventriculi deletumque per tempus ciborum desiderium excipias delitescant, donec, accedente inprimis moerore, aut ira, aut emetico, aut drastico remedio, ingesta per vomitum reddantur, qui post inducias redit semper crebrius, accedunt tandem leipothymiae, abdominis dolores, singultus ac tandem sub vomitu enormi, vel sub maximo ad istum conatu tantorum pertaesa malorum efflatur anima."

Alia huic opposita est vomitus chronici species, quam ventriculi atonia paralytica provocat. Iste morbus ventriculi senili demum aetate nascitur ab ann. 69 — 70. ex abusu cerevisiae, vini, alimenti, in helluonibus igitur, propter ingentem ab ingestis ventriculi distensionem. Praecedunt symptomata dyspepsiae, faciei pallor, moestitia: magna-que esse solet horum hominum voracitas. Sequitur vomitus creber, etiam tum repetens, ubi nihil adsumpserint, magnamque rejiciens liquidorum copiam. Haec autem nulla contentione excernuntur, sed sponte tanquam exsiliunt nullusque est sive ponderis, seu topici doloris in epigastrio sen-

sus. Vomitus antecedit ructus foetidissimus; simul percipitur sensus plenitudinis, repletionisque nimiae, tumet molliter sub umbilico abdomen, si- que ventrem inter umbilicum et pubem premas, male se habet aeger, ructus emittit, aut tanquam ex utre compresso liquoris aliquid ex ventriculo in os exprimitur, quod quidem pathognomonicum huius vomitus horrendi signum habet WICHMANNUS. Lingua ut plurimum sana et munda est.

Moriuntur absque febre, aut graviori molestia atque ultimo vitae tempore sine adpetitu, somnulosi, nulloque usi alimento obdormiscentes in aeternum labuntur soporem. Post mortem ventriculus visus est in saccum mutatus inertem, ad pelvim usque dilatatus, alterum quasi abdomen referens. Eum tantopere extensum in cadavere vidit WICHMANNUS ut uterum gravidum aemularetur, nono graviditatis mense. Parietes erant tenues, interna facies pigmento mucoso nigrescente oblinita, ei materiae similis, quam evomere solebant. Cacterum nullus ventriculi scirrhus aut angustia, quae plerumque ventriculo contentis exitum praecludentes dilatationis causa existunt. An ea cum pylori angustia hibacum, altera sine eadem helluonum sit, quae WICHMANNI opinio, adfirmare non ausim vereorque, an legitimo observationum numero probari possit.

Dilatationis cum angustia pylorica exemplum citat sequens ANTON. DE HAEN *Rat. Med. Pars IV.*

pag. 13 sqq. » Perillustris ac longe doctissimus expertissimusque Vir G. MACNEVEN O. KELLY AB AGRIM Fac. Med. Prag. Director sapientissimus, consummatus pathologiae ibidem professor, verum nostrae artis ornamentum, edidit 1760. Dissertationem de *raro ventriculi casu*, in quo vomitus ingestorum vix mutatorum in provento admodum morbo, impedimentum circa pylorum haerere indicabat. Probabilis sane haec dicta de caussa sententia erat; haud tamen ita, ut una constaret, utrum in ipsa pylori substantia, an in circumjacentibus partibus haereret id, quidquid esset demum obstaculi. Cadaveris autem sectione patuit, scirrhum adesse eumque ita totum ambitum occupare pylori, ut transitus per illum vix setae mediocri concederetur. Eo obstaculo effectum id, ut eam sensim in molem creverit ventriculus, quae sacci instar, universum expleret abdomen, suoque fundo inter rectum et vesicam insinuans sese, simul caussa tenesmi extitisset frequentisque stranguriae."

Perscrutati sumus praecipuas vomitus chronici causas organicas, quatenus ventriculum aut vicinas ei cognatasque partes spectant. Nolite tamen existimare, semper subesse ejusmodi organicas causas semperque a ventriculo primaeque officina vomitum fieri. Hoc memorabile refutat exemplum a MORGAGNO prolatum, quod citatum a me Part. I pag. 212 sqq. legistis, nunc relegisse non pigebit, et alterum

principis Giustianini apud PORTALLIUM *Mémoires sur plusieurs Maladies* Tom. I. pag. 24 sqq. In primo ex renum calculo, in altero ex lienis emphraxi vomitus motus est. PORTALLII exemplum vobis legendum perpendumque commendo (est enim nimis longae narrationis, quam quod hic inseri possit) idque facio tum propter graphicam describendi artem, tum propter perfectam curandi methodum. Nec semper organica vitia accusate, verum prius ea mente recolite, quae cum alii, tum SACHSIUS *Adnot.* 150. in hunc WICHMANNI locum animadvertit ostenditque tum exemplo viri, in cuius ventre muscoli abdominis contrectatione contracti mentiebantur tumorem, tum alius hypochondriaci, magist. bismuthi et rad. valerian. curati, tum tertii, PORTALLII aeger erat, per pulverem Jamesii ex antimonio et mercurio sanati, post sordes vomitu et alvo vacuatas, tum quartae aegrotantis, feminae scil. 38 ann., cuius historiam narravit MARCET (in *Memoirs of the Med. Soc. of London* Vol. VI.) cuius dolores a cibo, nauseam et vomitum, alvo simul stricta, sustulere pulveres e magist. bism. cum pulv. tragac. comp. intra 8 dies.

Intelligitis, variam fore prognosin et curationem horum vomituum, ut variae sunt caussae. Fausta prognosis, si caussa dinamica; infausta, si vitium organicum. In hoc juscula carniū, avenacea, hordeata, lac, cocciolata, ova sorbilia si-

miliaque alimenta, liquida, eupepta, clysmata nutri-  
trientia, saepius de die, sed parcissime praebenda.  
Ubi cuncta evomunt aegri, alimentis glacie paratis  
vitam aliquamdiu sustentari posse usu didici. Cae-  
terum praeter extr. leniora gramin. tarax. potissi-  
mum cum fructu adhibiti sunt saponēs medicati,  
cicuta, mercurius dulcis. Coarctato intestinorum  
cavo: oleum amygdal. rec. pressum, ol. oliv. ol.  
lini, ol. ricini et enemata oleosa laudat FRANKIUS.  
Ex iis auxiliis, quae vitio organico adversa dicun-  
tur, reliquis praestantiora longe mercurius et extr.  
cicutae, tam forma scuti stomachici ex empl. hy-  
drargyr. et de conio maculat. s. cicut aequal. part.  
quam ore ingesta form. pilular. mihi habentur: quod-  
si acutior sensus aut metus carcinomatis acriori  
obstet mercurialium stimulo, solius cicutae virtu-  
tem saluberrimam expertus sum: quod tamen non-  
nimis meticolose praescribendum esse, discite ab  
excellenti medico nostrate BLEULANDO I. I. Quodsi  
alvus non respondeat, eam laxare poterunt clys-  
mata et eclegmata oleosa; qualia a FRANKIO lau-  
dari diximus.

Si ex ventriculi atonia paralytica natus sit mor-  
bus, vix spei quid superest. In ipso tamen prin-  
cipio, si ab ingenti ista voracitate desistant tantam-  
que potulenti vim ventriculo infundere desue-  
scant, curari poterit feliciter, ita ut sensim sen-  
simque tonum legitimum recuperet ventriculi tuni-  
ca muscularis ac pedetentim contrahatur. Immo

*Lib. II. Pars I.*

7



legitur observatio in *Memoirs of the Society of London* Vol. III. feliciter sanati morbi eo tempore, quo sanari posse negaretis. Ea virum spectat, qui intra 6 dies libras 379 alimenti devorabat, i. e. circiter libr. 63. quotidie et tamen diaetetica mendendi ratione prorsus convaluit.

Vomitum chronicum in hac nostra regione saepenumero movet rheumatismus chronicus ventriculi; quam morbi naturam vobis cognitam facient artuum dolores rheumatici, exacerbatio ab aëris tempestate humida frigida ac reliquae morborum rheumaticorum notae postmodum indicandae. Huic medebuntur vesicantia epigastrio admota, vitae regimen et medicina leniter diaphoretica, medicamenta mucilaginea et pulvis praesertim Doverianus. Non multum dispari medicina parique fortuna usus est FRED. CHARDEL in curando vomitu spasmodico similis forsitan originis. Cf. pag. 177 sqq. *Monogr. laud.*

Reliquarum vomitionum: a mechanica pressione cartilaginis ensiformis, costae fractae, loricae mulierum, siquidem curari possint, curatio sit mechanica oportet. Praeter memorata obstacula, tumores etiam externi, interni ventriculum, intestina premendo vomitum provocasse leguntur. Qui ab alvi per faeces acriores obstructione cietur ac subinde vitium mentitur organicum, oleosis potissimum enematibus tollite. Qui a nervorum intemperie est, in feminis hystericis virisque hypo-

chondriacis, atque ab ingrata rei cogitatione animique perturbatione facile renovatur, ei nervina opponite remedia, praesertim sedantia, diacodiata, opiata, quibus mucilaginea plerumque utiliter adduntur. Quodsi tantus sit ventriculi sensus, ut neque interna medicamina, neque externa: fomenta, cataplasmata, emplastra antispasmodica, sedantia ferat, ninium illum sensum obtundent actu frigida potusque gelidi. Vomitus a genere nervorum dignoscite horum aegrotantium indiciis, praecipue aliarum partium motibus spasmodicis, vertigine, pulsu parvo, mutabili, urina limpida, ratione periodica, origine ab animi affectibus, aut caussa leviori, temperie aegrotantis nervea.

Vomitus sympathicus, qui multiplex a morbis capitis, uteri, renum, bilis calculo, hernia, alio alioque curabitur bene genere medicinae, adcommodate ad eam, ex qua nascitur caussam. Sibi enim quaecvis affectio peculiarem poscit medelam, diluentem, demulcentem, corrigentem, evacuantem, antiphlogisticam, revellentem, derivantem. Quod eo magis teneatis oportet, quoniam interdum summa cernitur irritabilitas, quam non opiata sedabunt, sed epispastica, rubefaciencia, in arthritide v. c. aut podagra anomala, aut ulcere, aut exanthemate male suppresso, ad sedes relictas morbum revocando: in aliis contra, feminis v. c. gravidis, robustis, aut puellis plethoricis virisque haemorrhoidariis irritabilitas a sanguine est, depletionem,

revulsione, derivatione compescenda. Quandoquidem vero hernia e crebrioribus est vomituum causis, in hanc inquirere nunquam praetermittite.

Superest infirmi ventriculi medicina, circa quam audite WICHMANNUM praecipientem, hanc ventriculi debilitatem solam raro esse vomitus chronici fontem eamque amaris, cardiacis, roborantibus nunquam paene auscultare: quae si bene praecepta sint a medico hocce prudenti atque perito, quantus sit eorum medicorum error perspicitis, qui a tincturis, essentiis, elixiriis stomachicis curationem auspicari amant. Etenim optima si quae requirantur, stomachica erunt prudens exactumque vitae institutum, caussarum correctio, frigoris admotio. Hujus frigidaeque potionis quanta sit ad ventriculum roborandum efficacitas vel, quod bene vidit CULLENUS, appetitus docet tempestate frigida auctus.

Denique in omni vomitu alvum semper liberam servate ex sapientissimo STOLLII monito, quocum consentiunt omnes medicorum principes: quocirca praedicari satis vix potest clysmatum eccopropticorum, emollientium, oleosorum utilitas: quod si negligatur, ex vomitu ileus fieri aut volvulus poterit; motu videlicet antiperistaltico ventriculi ad intestina etiam translato. Praeterea hac ratione simul subducuntur faeces, quae retentae novo irritamento, propter coli et ventriculi viciniam, morbum augerent.



Ubi opium ad compescendum vomitum dari debet (ejusdem sagacis medici monitum est) placet illud stratagema practicum, quo opium ingeritur eoque sedato ventriculo, alia interim adhibentur, expugnando morbo principi apta.

Vomitus diuturni sequelas BOERHAAVIUS numeravit hasce: atrophiam, ileum, convulsiones; quique ex vomitu chronico pereunt, ii summo opere emaciati, inaniti, aut hydropici perire solent.

Huic sat longo sermoni finem faciant haec HÆNII verba, quae a vobis memoriae mandentur fidei: » exacte locum determinare indurati tumoris, sive ipso in ventriculo haerentis, sive ejus, qui in vicinia natus venticulum premit, facile nonnumquam datur, aliquando difficulter, saepe vero neutiquam. Tot hinc in consultationibus litigia. Versati utcunque in anatomicis medici, qui semel iterumque pancreas scirrhosum invenere, idem posthac perpetuo accusant, legerunt alii videruntque ex ipso mesenterio enatum tumorem, qui sursum vergens ventriculo in functionibus suis impedimento fuerit; nihil in posterum, nisi mesenterium clamant. Sic iterum alii aliud. At vero ingenue fateamur, certa signa rarissime dari, quae ex innumeris caussis veram determinant, quae locum, quo tumor haereat, quae viscus, quod occupet, quae modum impedimenti naturamque examussim explicent. Cadavera passim nos erroneae convincunt sententiæ (*Rat. Med.* Tom. VI. cap. 1. pag. 12 sq. atque

paullo infra pag. 30 sq.) unde demum patet, scirrhos aliosque tumores mesenterii, pancreatis, pylori, omenti, renis, varios ventriculi morbos ingestorumque vix mutatorum vomitum generare posse, nec tamen signa pathognomonica adesse, quaeclare arguant, quaenam potissimum pars hic peccet adeoque saepe nos ignorare, utrum protopathicus sit, an deuteropathicus ventriculi morbus."

---

#### DE DIARRHOEA.

Vomitum, de quo verba fecimus, ordine sequitur diarrhoea, de qua nunc sermo erit.

Diarrhoea, alvi profluvium nobis dicitur: frequens et copiosa materiae liquidae per alvum excretio (*Init. Discipl. Pathol.* §. 591.) estque potius symptoma, quam morbus vocandum, siquidem a pluribus tum intestinorum tum aliarum partium morbis provenit. Itaque posset hoc symptoma revocari ad singulos, unde oritur morbos, ibique explicari, nisi in hoc libro *de Arte* praestaret, artem facientibus consulere, quam *scientiae* severitatem ac gravitatem unam, aut praecipuam curare ac sequi. Quapropter nos hoc loco vestris potissimum commodis atque utilitatibus inserviando peculiari tractatu de hoc sive symptomate, sive morbo disputabimus.

Ne distinctionum scholasticarum argutiis inretiamur, eas distinguemus diarrhoeae species, quas utile est cognoscere et practicam sectabimur utilitatem, exponentes species practicas tantum, ex quibus continuo commemoranda est diarrhoea idiopathica et sympathica, quarum prior potissimum huc spectat. Diarrhoea idiopathica ab ipsa intestinorum valetudine oritur, sympathica aliorum morborum symptoma est, ad illos morbos, unde nascitur, referendum, quemadmodum recte scripserunt CULLENUS et FRANKIUS.

Aetiologiam quod attinet, tum ad caussas occasionales, tum ad caussas praedisponentes attendendum est. Illarum ex numero sunt quaecunque intestina vellicant irritamenta: ingesta quaevis acria, dyspepta, alimenta, venena, medicamenta, colluvies gastrica, verminosa, catarrhus, rheuma, exanthemata, ulcera, nervosi generis affectus. Ad eam disponunt intestinorum debilitas, acutior sensus, irritabilitas, nervorum generis mobilitas, praesertim nervorum splanchnicorum magnique sympathici, quem nervum vitae plasticae nuper nuncupaverunt.

Simplicissima diarrhoeae species est, quae ex colluvie gastrica nascitur, quamque symptomata saburrae indicant. Sponte enim solvi, aut facili opera sanari solet: vomitorio, diluentibus, eccoproticis. Anorexia, capitis dolor, os pravam, borborygmi, flatus, lumborum gravitas, alvi dejectio

stercoralis morbum levans, errores in vietu prius admissi morbi naturam satis declarant. Hanc tuto sibi permittimus, nisi justo gravior. Nam hic morbus ipse remedium est ac crebro intra 24 horas, evacuatis sordibus, sistitur. Quodsi signa materiae supra turgentis fuerint, emeticum ex ipecacuanh. rad. cum pulv. gummoso eam excutiet, simulque nimium cohibebit fluxum, invertendo motum peristalticum. Scilicet hic prosunt emetica tum evacuando, tum motum provocando anti-peristalticum. Ipecacuanha propter virtutem alvum stringentem danda est, cujus nota est hincque ducta antidysenterica virtus. Sin vero tardius indicetur, tutius erit primo clysteribus mucilagineis, opiativis alvum cohibere, suadente RICHTERO, ne scilicet ejus ad intestina vertatur actio et in catharticum mutetur. Longos alvi fluxus repetitis matutino tempore emeticis feliciter sustulit SWIETENIUS; quo in casu juvabit interdum vespere theriacam dare (*Comment. II. pag. 90.*)

Nititur autem haec per emetica curatio ipsa naturae observatione: diarrhoeam solvi vomitu spontaneo, quam scriptis consignavit HIPPOCRATES Aphor. 15. Sect. VI. Sin contra in ipsis intestinis haereat saburra, proderunt diluentia aut leniora eccoprotica: decoct. hordei. aut gramin. aut quo ipse uti soleo, decoct. althaeae mannatum. Deinde et hoc observandum esse, praecipit vir CL. OOSTERDYK SCHACHT (*Inst. Med. Pract. Sect.*

VII. cap. 13. §. 14.) quod quae diarrhoea sedem habeat in tenuibus intestinis, felicius sanetur per remedia ore adsumpta, quae vero in crassis per eadem, enematum ope infusa.

Diarrhoea biliosa, quae tempore aestivo calido vulgaris quandoque, antibiliosam postulat medicinam; initio interdum vomitorio praecavetur. Postea acidula danda: decoct. tamarind., fructus horaei, cremor tartari, parca dosi, aut si tormina urgeant, decocta, enemata demulcentia. (Vid. Sup. cap. de *Febre biliosa*). Quam periculosum sit hunc biliosum alvi fluxum vi adstringentium sistere, ipse junior tunc medicus expertus sum in viro gravem ejusmodi fluxum patiente, quem inanitionis timore sistendam credidi adstringentibus. Stetit quidem alvus, verum secutus est singultus perpetuus, nonnisi revocato per eccoprotica et enemata alvi fluxu sedandus. Ubi acor est primarum viarum, absorbentia: aq. calc. cum lacte, pulv. lap. cancr. cum mucilagineis, p. g. arab. interdum ubi magis evacuandum est, cum rheo; quod medicamen propter virtutem adstringentem hic tutius reliquis praeberi poterit: praecipue in diarrhoea verminosa, nisi vetent ventris tormina et acutior intestinorum sensus. In pituitosa diarrhoea cum torpore (blennorrhoea intestinali) et rheum et sal ammoniacum et parcae ipecacuanh. doses interdum utiliter adhibentur. Interea tamen ut plurimum initio cunctari praestat, atque majorem reperietis uni-

verse a diluentibus, atque mucilagineis involventibusque, quam a stimulantibus praestari usum. Quare CULLENUS jure merito cum evacuantibus caute mercandum esse monet multusque est in praedicandis diluentium atque demulcentium laudibus. Quod ipse multiplici observatione didici. Dato nempe, propter tormina medicamine ex decocto althaeae, solut. saleb. emuls. amygdal. similibusque post tormina sedata quam facillime educebam colluviem, ab evacuantibus vero statim adhibitis non sordes evacuatas, sed inutilem suscitata vi-di et debilitantem maxime intestinorum salivationem, qua ejectis liquidis ipsae remanebant sordes.

Haec animadvertens adstipulari videbor novae doctrinae asseclis, omnem diarrhoeam ab irritatione ipsaque inflammatione repetentibus. Cui placito, quid veri insit vel falsi, jam exploremus.

Quem autem primo loco compellabimus, nisi ipsum placiti auctorem BROUSSAISIUM, cujus multae observationes rem probant.

Is alio loco (*Hist. Phlegm.* III. pag. 51 sqq.) diarrhoeas chronicas sub communi nomine enteritidis chronicae comprehendit (dysenteriam ab acuta enteritide repetit) easque acutis similes dixit, quae si in longum tempus trahantur, ex acutis chronicae fiunt: praesertim si moderata magis irritatio fuerit et imbecillior aeger; alio loco nonnullas diarrhoeae chronicae historias profert. Prior (*Obs.*

18. Tom. II. l. l.) viri juvenis, est diarrhoeae chronicae sine febre, quae primo propter pravam diaetam, deinde propter pravam medicationem protracta tandem transiit in hydropem ac mortem, die morbi quinquagesimo nono; in cadavere mucosa coli, parte praesertim altera ruberrima, nigrescens, sphacelata, ulcerata; in altera eadem fere symptomata eademque morbi vestigia et in tertia et quarta; in qua non fuit hydrops animadversus, propter aegri temperiem, ex auctoris sententia. Sequuntur historiae diarrhoeae chronicae febrilis, in quibus omnibus manifesta fuere inflammatae mucosae coli vestigia, nec defuere in plerisque errores in victu ac mala medendi ratio: unde quid hisce caussis, quid contra ipsi morbo esset adscribendum, perquam difficile dictu sit.

Si post BROUSSAISSUM consulamus senem doctum MORGAGNUM, hunc etiam narrantem audiemus historias diarrhoeae ex intestinorum phlogosi, qualis prima adolescentis est et viri dysenterici (art. 14. Epist. 31.) et dysentericae mulieris (art. 25.) nec tacentem tamen, nihil ejusmodi repertum esse in sacerdote, qui alvi profluvio laborans variosque cum acerrimis intestinorum doloribus humores egerens decimo tertio obiit morbi die cujusque intestina omnia diligenter nec semel intus perlustrata nusquam erosionem ullam nedum exulcerationem ostenderunt. Imo quod mirabilius visum est, illo quo obliniuntur muco, uti vocant, non

carebant. Verum in re tam gravi ne uni MORGAGNO credere oporteat, licet testi fido, veraci peritioque, neve objiciatur magis accuratam hodie esse mucosae intestinalis anatomen, ecce testem peritum pariter fidumque, hujus anatomes mirifice gnarum, ANDRALLIUM, qui alteram observationem profert pleuritici senis ejusque empyematici, ex febre hectica cum ingenti diarrhoea mortui, cujus canalıs cibarius reclusus ac perquam accurate lustratus integer erat, pallidus admodum et sine ullo inflammationis signo; alteram hortulani icterici, quem summe macrum praecipitavit alvi fluxus serosus idemque copiosus. Sectio detexit hepatis hypertrophiam, intestinorum etiam crassorum integritatem, mucosam pallentem, et crassitie et cohaesione, qualis bene valentium est. Eorum, qui hic quoque irritationem quamvis latentem accusent, hypothesin oppugnans, exemplum objicit sudoris frigidi morientium, aut animo linquntium, quem sanus nemo ab irritatione esse credet.

Atque vos iterum audite MORGAGNUM, quem in hac quaestione jam prius disserentem audivistis. Suam ipse narrat morbi historiam. » A. 1733. dum permotus, ut par erat, litteris amplissimi Annibalis Albani, consilii cujusdam medici caussa, Forolovio Pisaurum et Pisauro Forolovium, mutatis ad celeritatem equis, eo et redeo, alvi fluxu aqueo corripior tanto, ut intra horas duodecim egresserim libras minimum sexdecim aquae prope-



modum limpidae. Leves erant dolores, non creberrimae, sed magnae egestionēs, quae nescio quem habiturae fuissent finem, nisi me quaedam moleste nauseola admonuisset, ut tepido jure haurito experirer vomitionis auxilium. Quae etsi ad eam minime natura proclivis sum, prompte adeo feliciterque successit, ut subviridi rejecto corpusculo, quod parvum coctae herbae folium videbatur, simul nausea, simul alvi fluxus omnino conquieverint. Sed verumne folium esset, et si erat, quando et ubi comedissem, invenire non poteram, nisi forte in via, cum quidpiam, dum equi mutabantur cito, ut fit, in diversorio caperem, illud quidquid erat, non animadversum devoravi. Quanto autem in periculo fuerim, tunc magis intellexi, ubi postridie mihi corpus vidi et faciem praesertim ac manus haud secus subsedissee, quam ab diuturno gravissimoque morbo, tantam vero oris et faucium ariditatem sensi, ut quamvis identidem colluerem, nihil proficerem, aquam autem, qua ejus rei gratia usus essem, cum ex ore in pelvim ejicerem, subnigram in ipso ore factam spectarem. Haec autem et lassitudo duos tresve dies ita durarunt, ut sensim minuerentur. Sed dejectus ciborum cujusquemodi et quod in tanta ariditate magis mireris, etiam potionum appetitus perstiterunt aliquanto diutius, donec assus piscis et vini quoddam genus suapte natura subamarum ab stomacho appeti et bene ferri coepta sunt."

Explicandi gratia addidit MORGAGNUS mensem id accedisse Octobris ineunte, tempore igitur autumnali atque magnos fuisse et adsiduos imbres: autumno autem, quo refrigerari aër incipit, humorem aqueum, qui per aestivos calores e corporibus ubertim manabat, retineri. Diarrhoea serosa fuit, quam suppari modo, probabiliter admodum interpretatur FRANKIUS (Epit V. II. pag. 454 sq.) his quidem verbis: » Plurimi autumno ubi corpus et aestate et subinde meridianis caloribus agitata subito frigore corripitur, in *sudores intestinorum* aut *inversam transpirationem* incidunt, quâ humor multus aquae similis exit. Tormina plerumque sat acuta flatuumque fallax sensatio praecedunt. Sequitur et citior et magis abundans per alvum excretio, quo tempore et cutis augetur siccitas et urinae parcius fluunt et sitis increscit et vultus citius collabitur. Coryzae persimilis hic morbus, seu verus intestinorum catarrhus est." Serosa pariter, nec dispar alvi fluxus est, quo hydrops anasarca subinde feliciter solvitur.

Haec ut phlogisticae naturae utrum sit dubitabilis, ita mucosam eandemque cruentam majori jure huc trahi, nec sine causa, censebitis, quo cum dysenteria attineat, hanc etiam necum perquirite.

Quum prius natura dysenteriae minus videbatur cognita, eam praesertim cognitam fecit STOLLIUS, in eximia commentatione de *natura et in-*

*dole dysenteriae.* Hoc nomine adpellatur: alvus parca, cruenta, frequens, cum dolore et tenesmo (*Initia Discipl. Pathol.* §. 592.) nobisque habetur inflammatio pura, impura intestini crassi, illius praesertim membranae mucosae, quam exulceratio, excoriatio, aut etiam gangraena sequi solent. Rem jam suspicatus est STOLLIUS, ventris coryzam, intestinorum catarrhum aut eorundem rheuma vocans, de quorum morborum natura inflammatoria hodie inter medicos fere convenit. Ante STOLIUM MORGAGNUS dysentericorum intestina tum inflammata tum ulcerata esse observaverat tum sphacelata saepiusque carnosa membranea deijcere, quae MORGAGNI observatio, ut ipse exemplis probat, ita numerosis postea probata est exemplis aliorum: quae exempla lustrantes phlogisticam morbi naturam faciles lubentesque admittamus. At inquietis, haec si sic se habeant, undenam illa medicorum de hoc morbo controversia. Rem explicant variae variorum annorum constitutiones dysentericae, quibus dysenteriam alia aliaque febris comitabatur: gastrica, catarrhalis, putrida, nervosa, ut nunc evacuans, nunc diaphoretica, nunc antiseptica, nunc nervina methodus profuisse legatur. Quam morborum copulam ita spectare decet, ut investigent medici, utrum febris, an dysenteria sit protopathicus morbus. Pleraque dysenteriae epidemicae fuerunt febres dysentericae, quibus postea demum ocysus serius accessit intesti-

norum morbus deuteropathicus, tanquam inflammatio impura, ipsa natura sua proclivis in gangraenam et sphacelum. Quapropter, cur neque antiphlogistica methodus, neque cardiaca sufficiant, cur saepius evacuans, diaphoretica, sedans, demulcens juvaverit, cur alius auctor alii generi medicinae successus suos tribuerit, cur quae in alia epidemia proficua fuit medendi ratio, in alia inutilis fuerit, aut nocuerit, intelligetis. Quae cogitantes et discernentes, demum auctores de dysenteria cum fructu legere poteritis simulque cavebitis a medicorum priscorum contemptu, quo medici juniores excellunt. Caeterum Cff. quae scripsi de hoc morbo in *Diss. Inaug. de Const. Epid. Doctr.* cap. III. pag. 145 sqq.

Aliae diarrhoeae species sunt: lenteria, intestinorum levitas, qua continere nihil possunt et quicquid assumptum est, inconfectum protinus reddunt; haec musculi intestinalis convulsio aut nimium praeceps motus; fluxus coeliacus, quae species blennorrhoeae; fluxus colliquativus, qui aliorum morborum, praesertim phthiseos, exitus idemque ut plurimum ex ulceribus est, denique diarrhoea chronica habitualis, quae variae ac multiplicis originis est, a rheumate, scrofula, syphilide, arthritide, exanthemate aut ulcere male sanato: quae morbi origines investigandae sunt, ut curatio legitima fieri possit. Hae ubi lateant, ad therapeutice universalem morbi curationem compo-

nendam esse monent discernendumque, utrum cum irritabilitate sit, an cum torpore intestinorum imbecillitas conjuncta.

Prognosis ducitur a morbi caussis, natura, indole, symptomatibus. Bene sperare licet, si caussa talis, ut tolli possit, nullumque subsit vitium organicum. Optima est salutaris, levans, pejor symptomatica, difficillima ac gravissima habitualis, chronica, purulenta. Alvus quo sanae similior, eo melior: stercoralis melior aquosa, haec purulenta, aut cruenta. Mala signa sunt: anorexia, meteorismus, singultus, vomitus; atrophia, hydrops, collapsa, pallida facies. Bona: appetitus sanus, abdomen molle, faeculentae materiae ejectio, flatus sonori, interdum vomitus, nisi cum torminibus, febre, alvi duritie. Respiratio difficilis, dolor lateris tabem praesagiunt: interdum morborum remedium magis, quam morbum, aut morbi symptoma se esse declaravit.

In quacunque diarrhoea igitur ante omnia inquirendum est, num tolli debeat, nec ne. » Initio, ita ALEXANDER ille TRALLIANUS de *Arte Medica* lib. VIII. cap. 7. ea quae commode atque utiliter excernuntur, reprimere minime convenit, ubi vero diuturnior alvi fluxus fuerit, non tantum superflua evacuans, sed etiam habitum colliquans et vires consumens; tunc sane et medicamentis resistere convenit." Nec tamen simul et semel tollenda est praesertim habitualis diarrhoea, tum quia ei sem-

per aliquantum adsuevit corpus, tum quia remedia plena dosi adhibita ventriculum intestinaque sensiliora et debiliora offendunt.

Adstringentia remedia magno pondere porrecta haud raro alvum non tam sistere, quam potius augere, FRANKIUS animadvertit. Nocent manifesto adstringentia, quamdiu adsunt tormina, dolores, tenesmi tuncque sola mucilaginea demulcentia juvant. Etiam stimulantia et purgantia nocere, irritationem et fluxum augendo eaque igitur reprobanda esse docet CULLENUS; qui propterea opiatum praecipue favere videtur.

Quaecunque adhibeantur, teste FRANKIO l. l. pag. 488 sq, nisi ventrem simul pedesque a frigore foveamus, raro illa proficient. Nec minus vel optima remedia non ob aliam rationem toties incassum adhibentur, quam quod aegri in morbo tam taedioso ac tam facile redituro, regiminis strictioris impatientes, monitis medicorum repugnent ac vel in victu, vel in potu, vel aliis in rebus delinquant. Hinc summa in delectu ciborum ac sobrietatis in legibus observandis cura diu et morbo jam devicto ponenda est. Fructus horaei, olera, potus fermentantes, cibi pingues, stomacho graves vitandi; panis biscocustus, carnes tenerae, assatae, farinacea, ova recentia, parca manu ac legitimo temporis spatio interjecto obferantur, oportet. Potus copiosus cibos per intestina praecipitat: hinc parvus hic esto praesertim ex aq. destillata cum pane tosto et

cort. cinnam aut aq. oryzae, vinum generosum, similia.

Nullum vero remedium antidiarrhoeicum universale, aut proprium specificum, sed tot specifica, quot diarrhoeae caussae. Quae ab indigestione est emetico, diluente, eccoprotico abluenda, quae a catarrho et rheumate mucilagineis, solutione saleb praesertim, deinde diacodiatis, papaverinis pulv. Doveriano, emplastris rubefacientibus moderanda est; quae habitualis chronica jam facta est, idoneo victu potissimum curanda ac tum demum ad tonica cardiaca veniendum est cum omnis abfuerit erethismus; ex quibus tonicis praecipua sunt catechu, columbo, cascarilla, simaruba quaeque primo loco nominanda Lopezianae radix, a GAUBIO nostro jure merito commendata, deinceps immerito spreta et oblivioni tradita, quod quia raro germana habetur et caro admodum pretio venditur, factum esse censeo. Cf. H. D. GAUBII *Advers. varii Argumenti* cap. VI. pag. 78 sqq. Miratur GAUBIUS vim remedii amaritiae aliis minime parvis eamque huic soli virtuti adscribere dubitat.

Mirabimini forsitan cum tot celebrentur ad diarrhoeam sistendam a medicis remedia, tam pauca a nobis citari. Mirantibus FRANKII medici summi verbis respondeo. » Fateri oportet ob causas hujus profluyii saepe vel nimis absconditas, vel cum exiguo successu oppugnandas, incertitudinis ac difficultatis quam plurimum nos premere. Nullibi nem-

pe major est in morbis gravioribus remediorum; quam in quibus insignis istorum copia venditari solet, penuria. Divitias extollit vel rerum exercitio destituta juvenus, vel auri magis, quam scientiae ac sinceritatis amica plebs medica, senectus fronte cicatricibus non minus ac lauri foliis cincta, ne imperfectae obsit incremento scientiae, veritatem, in qua sola gloriari fas est, cur reticeat, non habet."

---

## DE ICTERO.

Icterus, aurigo, morbus arquatus, morbus regius CELSO dicitur aequè notus ac morbus comitialis. Color, inquit, cum morbum detegit, maxime oculorum, in quibus quod album esse debet, fit luteum. Morbus comitialis, eodem sensu, hoc auctore, notus habetur atque icterus; utrumque autem, si aequè ignotum dicam, ne existimetis quaeso, me CELSO velle obloqui, verum sic habetote, me alia prorsus uti vocis significatione. CELSUS morbi cogitavit formam atque symptomata, ego contra morbi naturam volo et causas. Scilicet aliud quid est, res sensu dignoscere, aliud quid est, res mente complecti. Diagnosic icteri vel vulgo facilis est, icteri pathogenesis vel medicos fugit. Quapropter, ut nimium a vero aberremus,



ab ea parte, quae nota est, incipiamus.

Solebat PARADISIUS, cujus ingenii acumen suspiciebant aequales, monere, difficile esse admodum, recte icterum definire eoque nomine carpere Nosologiae methodicae auctores, quod male defini-verunt. Qui a solo colore flavo duxerunt ejusdem definitionem, SAUVAGESIUS et SAGARIUS et ad cachexias retulerunt, in duplicem lapsi sunt errorem. Primo enim non satis distinxerunt hanc valetudinem ab aliis, in quibus flavedine etiam cutis commaculatur, qualis in scorbuto, chlorosi et exanthematibus quibusdam cernitur; praeterea voce cachexiae perperam usi sunt numero plurali, siquidem eo non adhibetur, verum euexiae opponitur.

Icterus a CULLENO definitur his verbis: *flavedo cutis et oculorum; faeces albidae; urina obscure rubra, inmissa colore luteo tingens*. A SAUVAGESIO auriginis nomine dicitur: *oculorum et cutis flavedo ad auream, vel aurantiam vergens*. Cernitis Cullenianam definitionem ampliorem esse Sauvagesiana. An autem melior sit, erunt fortasse, qui rogabunt. Quamobrem videamus, utrum characteres ictero adsignati a CULLENO, quemvis icterum designent. Flavus ille color, qui ab utrisque Nosologis commemoratur, universe in oculis et primo et ultimo conspicitur. Subinde tamen omnis ab oculis abest flavedo, uti in ictero neonatorum et critico abesse solet. In reliquis tamen praecipue oculos adspicere juvabit indeque icteri orientis et occidentis

petere praesagia. Aliquando facies sola flava est, aliquando reliqua cutis; interdum alterum latus tantummodo, ita ut rem notante BEHRENSIO icterus tam exacte corpus diviserit, ut dextra pars nasi esset icterica, minime vero sinistra. Subinde quoque alius in alia corporis parte cernitur color. LANZONIUS ictericum vidit, facie viridi, dextra corporis parte nigra, sinistra flava. Nascitur autem haec flavedo propter organorum bilem parantium, secernentium, excernentium affectiones. Nam est, ubi in sanguine portarum venae et systemate abdominali haeret malum, est ubi hepar et systema hepaticum laeditur, est denique, ubi morbi sedes quaerenda est in bilis ductibus. Aliquando subito invadit, saepius tamen lente subrepat, cum languore, artuum gravitate, pigritia, animi aegitudine, anorexia, dyspepsia, nec non doloris cujusdam ac tensionis sensu in cordis scrobiculo, interdum etiam vaga horripilatione caloreque fugaci alternantibus. Accedunt hisce color flavus ictericus oculorum, faciei, reliqui corporis, pruritus, cutis ariditas siccitasque, urinae croceae, saturatae, saepe crassae, turbidae, sedimento crasso, flavo, alvus pigra, stercora alba, argillacea, acor primarum viarum, anxietas, respiratio difficilis, pulsus tardus, somnolentia et ultimo temulentia, sopor, subinde delirium tandemque marasmus, febris hectica, hydrops, isque lethalis.

Ecce universalia morbi symptomata maxime-

que pathognomonica illius videlicet speciei, quae tarde oboritur. Post praevia enim morbi futuri signa, primo ut plurimum in oculis, quod album esse debebat, fit luteum, ut CELSUS praecipit; quocum conferre non pigebit CONCINNAM LOMMII nostri descriptionem, quae legitur in hujus *Observ. Medicin* lib. II. pag. 193 sq., qui liber recte opusculum aureum adpellatur.

Ab hac specie differt quem calidum icterum nonnulli nuncupaverunt quemque denotant: sitis cum aliqua linguae siccitate, ardore, calore hypochondriorum, quadam in pulsu mutatione, diarrhoea cum febre et liquidis flavisque dejectionibus. Hanc icteri speciem post GEORG. BAGLIVUM, cujus descriptionem secutus sum, etiam designavit RICH. MEAD. » At non tantum ab impedito bilis transitu, propter visciditatem, sed etiam a raritate ejus provenit hic morbus. In prior casu adstrictior est alvus faecesque crassae, argillae, vel luto similes, aegre dejiciuntur; in posteriori diarrhoea cum febre et liquidis flavisque dejectionibus assidue sollicitat. Illi morbo obnoxios reddit vita desidiosa, hinc debitis corporis exercitationibus acta; hoc plurimum ii laborant, quibus facultates suae inutiles sunt et qui genio indulgentes vino meraciori corporis humores accendunt.”

De icteri caussis tum remotis, tum proxima multiplex superest dubium, praesertim, ubi visa ac

reperita in cadaveribus cum aegrotantium historiis conferamus. Quapropter, ne ad inanes disputationes delabamur, praeteriti temporis memoriam recolentes aequalium simul citabimus testimonia.

MORGAGNUS, nam ab hoc demum viro anatome practica quo pacto colenda sit, ut morborum interpret habeatur, medici didicerunt, MORGAGNUS igitur ad hanc etiam morbi formam rectius cognoscendam, ea qua pollet, criticam artem adhibuit. Idcirco aequum est, ut hunc primum doctorem adeamus. Ex iis, quas scripsit epistolis, trigesima septima integra, perlonga ictero interpretando consecrata est.

Incipit ab iis notandis exemplis, quae icterum spectant a spasmo, a causa scilicet dinamica oriundum. Quae causas organicas tangunt, postea proferuntur; ultimo et uberrime de calculis biliaris disputat.

Ad icterum ex genere nervorum natum spectat haec VALSALVAE observatio. Epist. XXXVII. art. 2.  
» Sacerdos juvenis, paulo post quandam animi perturbationem, regio correptus morbo decubuit, cum dolore ad regionem stomachi et vomitu, quo cibum saepe et medicamenta rejecit. Interim alvo dejecta albescebant. Uno aut altero exacto die, inquietus aeger et quodammodo hebes animadvertitur, ut narratorum oblivisceretur. Medici febrem, nisi tertio exeunte die, non annotarunt:

quo tempore se prodidit magno impetu cum delirio et convulsionibus ejusmodi, ut aeger dentibus omnia rodere cogeretur et ingenti nisu prope modum superaret adstantium vires: cum his vomitus urgebat subobscurae materiae. Mane vena secatur, unde sanguis cum impetu exsilit, cujus serum, ubi a concreta secessit parte, immersum linteolum flavo inficiebat colore. Cessat convulsio; sed aeger quasi soporosus jacet, vix se movet ad motasque cucurbitulas sentire, vix ostendit. Respiratione, nisi quod interdum suspiriosa, quasi naturali utebatur. Quarto transacto die obiit. Ventre aperto jecur inventum est flaccidum et ad sup pallidum vergens: in ejus vesicula bilis subobscura. In ventriculo materia ejusdemmodi ac novissimis diebus, ut dictum est, evomuerat; in tunica ejus interiore circa orificium sinistrum disjecta quasi puncta rubentia. Multae autem hic illic per ventrem minimae glandulae a stagnante sanguine inflammatae. Thorace recluso pulmones aëre tumentes, a pleura soluti, si quosdam per sejunctas membranulas nexus excipias, quae sinistrum ad pleuram alligabant. In pericardio parum aquae. In cordis ventriculis sanguis concretus. Cranio circumsecto incisaque dura meninge, seri nonnihil prodiit: in vasorum sanguiferorum, quae per tenuem meningem repunt, interstitiis, gelatinosa quaedam, sed levis concretio annotata est: cerebrum autem valde laxum, neque omnino natu-

rali colore, quem fortasse bilis tinctura vitiaverat. Dum ad cerebrum eximendum, intra summum vertebrarum tubum spinalis medulla secabatur, ab externo hujus medullae pariete, quasi ex dissecto lymphae ductu, serosa materia, nec brevissimum ad tempus emanavit."

Ex hac observatione evidenter ostendi MORGAGNUS scribit, quid possint animi perturbationes in morbo regio inferendo. Etenim ab iis nervos affici, ab his vasa sanguifera, et quod consequitur; humorum secretiones excretionesque vitiari; in quibusdam magis consentire nervos hepaticos, et in his cur oriatur icterus ab animi affectibus, facile intelligi. Sic apud HOFFMANNUM de femina legi; cui quoties ob praegressam animi commotionem novi accedebant insultus febriles, protinus icterus cum omnibus revertebatur symptomatibus. Haec similiaque probabiliter disputans et rem ipsam et sacerdotis casum interpretari conatur. At, sic vestrum aliquos objicientes audio, nonne in hac VALSALVAE observatione tum in abdomine, tum in capite fuere indubia inflammationis indicia. Illud quanquam non negem, minus convictus sum, ab hac morbi origines esse repetendas, magis contra nervos habeo primos morbi auctores: ut ex neurosi phlogosin natam esse suspicer. Verum ne aliquis vobis scrupulus restet, en novum rei testimonium, qui eo vos scrupulo liberabit (l. l. art. 4.).

» Juveni peringenioso, sacris et litteris addicto,

truculentus et minax vir sclopeto nec opinanti adpectus intentat. Magno ille terrore perculsus, postridie ictericus fit, mox delirus, ut notorum agnosceret neminem, sed identidem clamaret, oh facinus indignum! Tum convulsivis agitationibus tantis correptus, vix ut retineri posset multorum manibus, intra horas a delirii initio viginti quatuor extinctus est. Cadaveris sectio nihil ostendit, quod videretur magnopere adnotatione dignum, si vasa excipias sanguifera, per tenuem meningem repentina, quae nigro sanguine plurimum distenta reperta sunt" (\*).

Hoc exemplo docemur, posse ex animi pathemate quosque illud proxime laedit nervis icterum nasci absque ulla inflammationis suspitione, quod antea negasset nemo; nunc negare velle videntur ii, qui cunctis sive morbis sive morborum symptomatibus irritationem ipsamque phlogosin adfingunt.

An igitur semper a nervis et spasmo icterus, quae VOGLERI et RICHTERI opinio? Immo saepe a vasis ipsaque hepatis acuta, chronica inflammatione, a duodenitide etiam et ductuum bilis phlegmasia. Lubet et hujus icteri citare exempla. Possem hepatitidis antea traditae vobis renovare memoriam, possem SWIETENII BOERHAAVIQUE nostri

---

(\*) Huic suppar STOLLII Obs. II, Sect. V. Pars III. *Rat. Med.* pag. 358 sqq.

adferre scripta, qui simul de hepatitide, simul de ictero exposuerunt, sed malo laudare aequales, qui hoc utriusque morbi connubium fecerunt plurimi. Verum quem primum laudem BROUSSAISSIUM, ANDRALLIUM, GENDRINUM, alium? Incipiam a BROUSSAISSIO. Is igitur (l. l. III. pag. 269.) postquam contenderat, quae vulgo dicuntur hepatitides, esse villosae phlogoses idemque ostendere febrem flavam; symptomata icterica ex inflammatione ventriculi pylorici ipsiusque duodeni proficisci medicos adhortatur ipsamque hepatis aegritudinem esse deuteropathicam ex gastro-enteritide. GENDRINUS pariter ex duodeni inflammatione symptomata biliosa nasci animadvertit. Plenius autem rem explicuit ANDRALLIUS. Est in officina bilis, sic ille, una duntaxat laesio, quae perpetuo cum ictero jungitur, nempe ductus hepatici aut choledochi obstructio. Alias hi ductus liberi sunt et tamen icterus est, ad quem interpretandum varia reperiuntur hepatis vitia organica. Verum hic theorema universale nullum condi potest. Nam ictero stipari possunt hepatis congestio, hypertrophia, atrophia, emollitio, induratio, scirrhus, carcinomata, tubercula; quae tamen omnia existere possunt sine ictero.

Alias jecur ejusque adpendices ab omni sunt vitio immunes; verum alias reperiunt aliarum partium cum hepate sive cohaerentium sive consentientium laesiones: inflammationem duodeni, pleu-



rae diaphragmaticae dextrae (\*), cerebri ejusve membranarum: quarum haec multo rarior illis. Alias denique neque hepar appendicesque hepaticae, neque organa ei quocunque modo cognata in ictero mutata inveniuntur. Ex conditionibus igitur, sub quibus icterus nascitur quaeque ipsum procreare videntur, numerantur: complures hepatis aut acutae, aut chronicae valetudines, gastroenteritis acuta, aut chronica; nullus morbus praegressus, verum animi perturbatio gravis: terror, ira, cuncta et cum secuta affectio nervorum, tandem colica hepatica, quae sive a calculis biliariis moveatur, sive sine iisdem existat, neuralgia plexus hepatici periodica ANDRALLIO habetur; denique causam icteri proximam ex ea praecipue hypothesi omnium facillime intelligi opinatur, quae tum icterum fieri statuit, quum hepar in contextu aut functionibus alteratum desinit ex sanguine secernere bilis principia, quae ipsi inesse creduntur.

---

(\*) Observatio STOLLII III. l. l. spectat peripneumoniam, cui deinceps successit hepatitis et icterus calidus. Casus ille, quo VALSALVA deceptus est, fuit pleuroperipneumoniae etiam dextrae. Vid. supra cap. de *Hepatitis* lib. I. P. I. pag. 182 sq. Nec semper tamen in dextro, immo in sinistro latere pleuroperipneumonia cum hepatitis fuit, v. c. in murario STOLLII Obs. IV. pag. 367. An ex vinolentia cum pulmonum morbo morbus hepatis? In V. Obs. scrinarii utriusque pulmonis inflammatio fuit cum hepatitis, forsitan etiam cystitide et plethora biliosa.

Magis quidem naturae consentaneum videretur, bilis resorptionem ponere tunc, ubi ductus obstruuntur. Verum tunc etiam alio modo res explicari potest: quod bilis scilicet separari ex sanguine desinit, quia haec separatio inutilis foret. In ictero denique neonatorum inque febre flava cutis color non a bile esse, sed ab ecchymosi generali in corii reticulo ponitur. Mecum proculdubio sensistis, conjecturam ANDRALLII caeterum satis probabilem, ultima praesertim parte vitiosi quid habere. Nam ea est vis veritatis, ut suo ipsa vultu ac habitu se commendet animo ac tanquam innato instinctu praesensioneque agnoscatur. RICHTERUS contra veterum secutus hypothesin a bile reflua in vias circulationis propter systema hepaticum stimulo irritatum rem repetit eandemque sententiam nuper defendit AUG. BONNETUS, nec tamen accurate satis icteri utramque speciem discernens. Cf. *Monogr. de morbis hepatis*. Sed conjecturas mittentes, ad observationes revertamur.

Memoria recolite, quae de dyspepsia prius secundum WILSONI theoriam a nobis animadversa sunt atque, quo possit pacto ex dyspepsia, sive potius ex ventriculi aegritudine icterus nasci, facile intelligetis. Sed in medicina, quae pars historiae naturalis est, non tam quid fieri possit, quam quid factum sit, quaerimus. Neque haec sive WILSONI de dyspepsia, sive altera de ictero theoria ex mente aut ratione ducta est, sed ex

observatione nata. Primus, quod novi, BROUSSAIS-  
SIUS fuit, qui ex duodenitide icterum fieri nota-  
vit, eo duntaxat nomine culpandus, quod quae  
bis, vel saepius observaverit, semper fieri credi-  
derit. Condonandus hic error est, qui hominum  
esse solet ingeniosorum, quorum in judicando te-  
meritas doctrina et eruditione non satis reprimi-  
tur.

*Felices, quos reddunt aliena pericula cautos.*

De hac, quam ultimo loco commemoravimus,  
icteri caussa plura scire cupientes, ea relegite,  
quae prius de inflammatione mucosae hepatico-cys-  
ticae a nobis scripto sunt tradita. Jam ad alias  
icteri caussas explicandas transibimus. Icterus fe-  
brilem observari sine hepatis laesione, interdum  
cum abscessu hepatis, interdum pure in venas re-  
sorpto sanguinemque alterante cutim flavedine co-  
lorari, interdum nihil in corpore detegi, quod rem  
explicet idque factum esse, ubi cum largis hae-  
morrhagiis, epistaxi, haematemesi, ecchymosi (id  
est in febre adynamica, putrida ac febre flava) ex  
sanguinis dyscrasia erat icterus repetendus, ani-  
madvertit ANDRALLIUS (I. pag. 616 sq.). Alio loco  
in phthisicis ex tuberculis bilis ductus prementibus  
bis a se observatum esse icterum refert IV.  
335. Denique icterum sympathicum ex pleuritide  
diaphragmatica dextra provenisse in sartore narrat  
IV. pag. 476. Habetis icteri caussas perquam di-  
versas, quas qui detegat semper, OEDIPUS sit opor-

tet. Interim tamen non desperandum, verum strenue navanda opera est. Alias causas commemorat CRUVEILHIERIUS l. l. plura adumbrans hepatis vitia: calculos biliares tum hepaticos, tum cysticos, de quibus deinceps: cyrrhosin sive hepar granulosum, aliis tubercula hepatis, carcinoma durum et molle sive scirrhum et fungum, utrumque subinde in eodem hepate visum, abscessus hepatis, hydatides; quorum vitiorum alia cum ictero vidit, alia sine ictero (\*). Inter symptomata scirrhi hepatis minus constantia icterum numerat, quod non ita obscurum est, si cogitetis, ex ejusdem auctoris observatione, hoc vitium gravissimum esse in superficie hancque copiosissimos tumores scirrhosos monstrare: hinc etiam cur cyrrhosis non semper icterum creet, perspicitur: quamdiu scil. bilis viae liberae sunt. Cyrrhosin tamen cum ictero vidi in puero, ex morbo gentilitio eoque lethali. Cyrrhosis illud vitium est, quod antiquitus tuberculorum nomine insigneiebatur quodque cum hydrope abdominis utplurimum conjunctum cernitur.

Itaque, monente jam WEPFERO, obturato collo vesiculae biliariae non sequitur icterus, nisi ductus communis quoque obstruatur; quod WEPFERI monitum perperam postea neglectum a medicis

---

(\*) Scirrhum hepatis spectat *Obs.* 16. STOLLII, in qua ulcus in duodenum patulum erat ex vesicula fellea et ductibus suppuratis, utero simul scirrhoso.

scribit MORGAGNUS. Is duos maxime icteri fontes indicat: alterum materiae bilis in sanguine copiam tantam, quantaecernendae jecur par esse non possit; alterum hujus materiae a sanguine deficientem separationem, sive ob aliquod ipsius sanguinis aut intimi secernentis organi vitium, sive ob complurium hepatici ductus ramorum, aut ejus ipsius trunci, aut communis impeditam viam. Hac enim impedita, etiamsi bilis in sanguinem non redeat, novam inmitti in plenos distentosque ductus non posse ideoque cum quantum jugiter ab alimentis materia bilis in sanguine augetur, tantum ex ea non dematur, crescat ipsa indies abundetque necesse esse. Ea autem via, sic pergit illo, impediri potest a rarioribus, aut frequentioribus caussis. Ex rarioribus sunt, quae in Sepulchreto leguntur, communis ductus ad capillarem angustiam redactus, aut instar chordae solidae in se contractus induratusque, aut plane ac solide osseus, aut a circumjectis aliquot glandulis compressus. Ad frequentiores autem caussas primum convulsiones attinent et hinc ortae *crispaturae*, ad initia usque ramusculorum ductus hepatici propagatae. Quorum hic effectus a nobis facile ad icteros illos explicandos ponitur, qui aut a vehementibus animi affectibus, aut a doloribus originem habeant. Sunt quoque, qui sic eum explicant icterum, quem viperac venenum fecerit. Porro in-

*Lib. II. Pars I.*

9

ter causas frequentiores sunt obstructiones recensendae cum in aliis, tum in biliariis praesertim vasis accedentes."

Videtur haec MORGAGNI originis icterique causae proximae explicatio, qua ex bilis materia in sanguine haerente, neque sufficienter ex sanguine separata proveniret, satis rerum testimoniis consentire simulque duas icteri species complecti, tum eam, quam calidam vocant, in qua bilis materies in sanguine praeter modum exuberat, tum alteram frigidam, in qua etsi non abundat, tamen non rite a sanguine secernitur, verum eo retinetur, nec in primam officinam defluens faeces tingit. Verum, quomodo exinde interpretemur historias icteri unum tantum corporis latus colorantis, fateor me ignorare.

Remotis icteri causis alii adnumerant, praeter seminia: temperiem cholericam, melancholicam, aetatem senescentem morbosque viscerum abdominalium, systematis praesertim venae portarum, tum dynamicas potentias genus nervorum hepatisque vitam laedentes, quorsum animi pathemata referte et calorem aëris et vini vinique spiritus abusum et refrigerium, de quarum prima scripsimus, de secunda scribentem legite SWIETENIUM nostrum *Commentar.* Tom. II. pag. 98 et 118; de tertia in vitam bibacum intuemini et ebriosorum perpetuo inter pocula litigantium et dimicantium; ad quartam denique adscribite SYDENHAMI obser-

vationem: febricitantes, si diutius, quam par erat, pro una vice a lecto abfuerint, declinante praesertim morbo, in dolores rheumaticos incidere, nonnunquam etiam superficiem corporis ictero deturpari, quae sicui contingant, lecto addicendum esse *Opp. Sect. V. cap. 11. (pag. 225.)* tum organicas ab inflammatione ejusque vario exitu, scirrho, carcinomate, steatomate, fungo, tuberculis, calculis, de quibus partim egimus vidimusque tum demum icterum creari, cum viam bili effluxuræ praecludant, partim agemus; ultimam volo, quae a calculis est, quamque praeclare MORGAGNUS explicuit. Hi sive hepatici, quod rarius, sive cystici, quod multo frequentius, bilis in duodenum obturantes viam, aut hepar et systema hepaticum diversimode irritantes, laedentes, moventes, icterum provocant eumque periodicum, auctoribus BOERHAAVIO, SWIETENIO, aliis, quamquam immerito exinde effecerunt BAGLIVIVS et BIANCHUS, omnem icterum periodicum a calculis esse, hortante peritissimo certe harum rerum iudice, MORGAGNO *Epist. 37.* quinimmo calculos istos esse posse numerosissimos sine ictero, exemplorum copia docuit. Praecipue tunc temporis molestare, irritare doloresque provocare colicos, atrocissimos videntur, ubi calculi ex fellis vesicula in ductum il lapsi cysticum, vias istas stimulo inflammaverint suo. Quem morbi casum graphice sic exponentem audite SWIETENIUM nostrum *l. l. pag. 131.* » Cum

fréquentes habuerim occasiones hunc morbum videndi, non inutile erit, illum hic paulo accuratius describere. In juniore aetate rarius occurrit, sed adultos et in senium jam vergentes frequentius corripit et praecipue quidem illos, qui diuturno moerore jam afflicti vel et memores iras diu noctuque sub pectore versant: omnium maxime sedentariam vitam agentes (hinc literatis viris frequens morbus) uti et laute viventes, dum post pastum pleno admodum ventriculo, mensis assident, pleno corpore, sicque omnia abdominalia viscera comprimunt. Incipiunt conqueri de quadam tensione molesta circa praecordia et ponderis quasi gravantis sensu: quibusdam aliquot a pastu horis acris satis cardiae dolor fit, quem vidi per plures menses praecessisse icterum talem periodicum. Observatur tunc levis quandoque flavedo in cantho oculorum, urinae parum plus coloratae sunt et per alvum biliosa excrementa deponuntur. Postea subito nulla saepe causa procatartica accedente, oritur inexplicabilis anxietas, dolor intolerabilis circa cardiam, imo etiam per totum abdomen, quem tunc colicum vel iliacum dolorem credunt; accedit febris, vomitus enormis, et dum per aliquot horas haec symptomata duraverunt, totum corpus icterico colore perfunditur et urina tingitur saturatissimo colore flavo. Post 24 horas, quandoque citius, quandoque serius, tales aegri commode se habent et cum pondus il-



lud gravans praecordia non amplius sentiant, integram sanitatem brevi futuram confidunt. Urinae sensim fiunt minus coloratae, flavus cutis color evanescit successive et post paucos dies nihil omnino de morbo superesse videtur. In quibusdam etiam vidi intolerabilem pruritum adfuisse toto tempore, dum corporis cutis bile perfusa flavescebat. Verum post aliquot septimanas, quandoque etiam post aliquot menses, tota haec malorum series eodem ordine redit et ubi plures tales insultus passi sunt aegri, manet perpetuus icterus, subinde quidem ingravescens, sed non tam validis symptomatibus insultus stipatur: color icteritius tunc saturatissimus per universum corpus diffunditur, ipsa saliva amarescit (quod rarius tamen observatur) tandem procedente tempore nigrescunt fere toto corpore, pedes incipiunt tumere, sensim magis magisque denique et abdomen et hydropici pereunt." Hactenus SWIETENIUS. Hisce signis HOFFMANNUS adjunxit doloris aut ponderis sensum ad cartilagineum ensiformem. MORGAGNUS ab affinitate hujus morbi cum calculo urinario etiam signa peti posse scribit; quae tamen cuncta et singula quam sint fallacia, ipse compluribus comprobavit exemplis. Quae a nobis eo sunt accuratius notanda, quo ardentius cupimus vobis tradere rem non ornatam, aut fictam, ut solet, sed veram, nudam suam ipsam vitia prodentem, ne vana rerum specie mente concepta decipiamini. Itaque MORGAGNUS praeter alias aliq

loco narratas, tres subjecit historias, hanc fallaciam signorum declarantes. Prima anus pauperculae est, quae cadendo graviter percusserat caput; in qua licet nullum icteri vestigium, cystis fellea decem calculos recondebat, dispari quidem magnitudine, sed nullum parva. Secunda mulieris superiore paullo minoris natu, colore non modo non icterico, sed optimo praeditae, bibosae et septies nuptae, cujus fellis vesicula cum bile pauca et flava continebat calculos saltem trecentos triginta, multo maxima ex parte exiguos. Tertia sutoris persenis ac propemodum edentuli, catarrho sine ictero, ut ex cute candida manifestum erat, confecti, cujus in fellea cysti cum pauca et viscida bile calculi inerant sex vel septem non exigui, quorum maximus mediocris uvae acino haud minor fuit. Quid igitur quaeritis est, quod plurimi vicissim testes producuntur, qui cum cysticis lapillis conjunctum icterum viderunt. Hanc vobis quaestionem sic solvit MORGAGNUS, ut ostendat, in aliis observationibus una cum his hepar fuisse vitiatum, in aliis pariter in poris hepatis repletos proponi, in aliis utrumque fuisse; ita ut non sufficiat, calculorum in cystide praesentia, sed vel organi secernentis ad secretionem, vel ductus excernentis aut hepatici aut choledochi ad excretionem impedimentum ad icterum faciendum requiratur. Vos autem hac explicatione non contenti, qua estis rerum causas cognoscendi cupi-

ditate, pergetis interrogare, quo tandem modo ex calculis oriatur icterus. Ad alteram hanc quaestionem ab aliis aliter responsum est. Antiquiores mechanicum obstaculum solum accusare consueverunt, MORGAGNUS in spasmodicam constrictionem inclinat, CRUVEILHIERIUS phlogosin solam profert: quarum quidem sententiarum nullam excludo nulloque prorsus adhaereo; immo unam ex altera proficisci causam conjicio, ut ex obstaculo mechanico spasmus, ex spasmo inflammationem fieri existimem.

Quodsi meam interponere sententiam liceret, saepius a duodeni vel ductus aegritudine, sive neurosi illa, sive irritatione inflammationeque succrescere morbum, opinarer sicque ad hepar traduci ejusque et interdum pancreatis quoque mutari secretionem, nutritionem et vitia creari organica, quorum prima in ductibus, aut si mavelitis horum in nervis origo. Talis morbi genesis forsitan fuit in ea, quam continuo subjiciam historia: » Vidua sexaginta duos annos nata in Nosocomium Academicum suscipitur, die VII. post calend Decembres, quum a m. Junio ictero laboraverat, brevi post urticariam orto. Optima caeteroquin valetudine gaudens nonnunquam febres biliosas passa erat; neque licet non pepererat, quid mali a catameniiis anno 50°. subsistentibus perceperat. Omnibus tum a medico, qui prius ejus curam gesserat, tum a nobis incassum adhibitis, accedentibus ultimo

pedum oedemate, summa corporis macie et febre confecta est, die mens. Martii xxiii, hora matutina sexta. Venter tumidus; paries posterior ventriculi a pancreate duriore perforatus, ut margines hujus plagae partem pancreatis in ventriculo prominentem plane circumdarent. Hepar durum scirrhosum. Fellis vesicula valde ampla, lata, latiores quoque ductus, hepaticus, choledochus omnesque ductus felliferi, qui omnes humore seroso, subflavo tuebant. Ductus choledochi stricturam fecerat induratio scirrhusa duodeni orificium ductus plane occludens. Splen parvus, lividus; nulla neque in reliquis intestinis, neque in organis uropoieticis, neque in pectoris cavea laesae structurae nota. Uti caetera mittam, fellis cystidem extra jejunum prominentem ibique tumorem facientem mollem, mobilem, cujus etiam exemplum profert MOR-GAGNUS (\*) hepatis a colore sano naturali mutationem, caet., nonne veri perquam similis conjectura est, a duodeno morbum initium fecisse, exinde ad ductum choledochum ductusque reliquos tractum, ipsum tandem hepar et pancreas propter impeditam utriusque functionem invasisse atque ipsorum depravasse nutritionem?

Verum ad calculos eorumque notas redeamus. Horum nec unus est color, nec forma eadem, nec suppar

---

(\*) Epist. XXXVII. art. 13.

magnitudo: vel flavi, vel nigri, vel albi, vel variegati, ovales, sphaerici, angulosi, asperi, aliquando magnitudine ovi columbini, aliquando minimi, granulosi, hique subinde numerosissimi ad 3000 inventi; aliorum structura ad nucleum composita, concentrica, lamellaris, aliorum stratosata, radiata, crystallina, longeque plurimi de cholesterina, quam vocant, facti. Qui si signa aut nulla, aut obscura adeo praebeant, ut vix dignosci a medico possint, perbeatus ille erit, cum signum habeat; longe omnibus anteferendum, ab naturali ipso lumine praemonstratum, quale MORGAGNO, nec immerito, habetur, cum eorum aliquis aut fragmentum saltem quodpiam ejicitur. Quod qua ratione haberi possit, hoc duce et auspice, videamus. » Praecedentibus igitur indiciis calculorum, qui in biliarios ductus intrusi, exitum sibi in duodenum intestinum moliantur, si inter alvi recrementa, quae tum diligenter sunt a ministris eluenda et per cribrum aliquod, sicut Vallisnerius monebat, trajicienda, biliarius aliquis calculus inveniatur, non est dubium, quin hoc signum eam lucem afferat, quae non nisi incerta et subobscura a tot aliis notis sperari potest."

Has MORGAGNI de calculis animadversiones partim firmant, partim emendant, quae a CRUVEILHIERIO scripto mandata sunt: quorum haec summa est. Calculi hepatici creari possunt in omni viarum bilis latitudine, in radiculis hepaticis, ductu

cystico, vesicula fellis, ductu choledochi. Possunt nasci ex obice bili circulanti objecto tumque de muco sunt et bile inspissatis. Verum ut plurimum ex bilis mutata compositione proprioque principio cholesterina sunt, qui tamen vulgo nucleum habent ex bile inspissata. Creberrimi sunt calculi in fellis vesicula, in qua tamen nulla provocant symptomata, nisi facta sit mucosae cysticae inflammatio. A ductu cystico aut collo vesiculae fellis clausis sive calculis, sive inflammatione adhaesiva nil mali. Tunc scilicet ipsa vesicula a bilis circulatione remota, hepar glandulis simile fit sine receptaculo ipsaque bilis cystica resorbetur eamque mucus supplet. In hac rerum conditione inflammari potest cystis et gravissima subsequi symptomata. Haec inflammatio crebro concretione vesiculae finitur, quae in ligamenti speciem mutatur, ut vitium mentiatur congenitum (casum vid. ap. RICHTERUM) finitur nonnunquam perforatione, unde peritonitis et mors: subinde accreta intestinis vesicula calculus delabitur in duodenum, aut colon; quod semper fit, ubi major calculus, qualis superare non potest, quam vesiculae collum describit, curvilineam. Hoc facto exturbantur calculi ano, vel dum increverunt, supra ani sphincterem sistuntur faciuntque pertinacem alvi duritiem, omniaque symptomata volvuli. Impedita via bilis, propter obstructum ductum hepaticum et choledochum, gravissima mala eveniunt: sac-

pius etiam ubi haerent in ductibus calculi, hi ipsi dilatantur juxtaque ipsorum parietes ipsosque calculos bilis defluit: quod memorabili exemplo ostenditur. Denique inflammationis historiam ductuum bilis tum acutae, tum chronicae indeque nati icteri medicina practica comparata interpretatur ac tubercula hepatis infantum neonatorum plerumque esse ex inflammatione radicularum hepaticarum nati tumores cystici concrementa bilis includentes dicuntur.

Abscessus hepatis, qui crebri a phlebitide, aliquando minimeque semper icterum creant, cujus unicum exemplum in medium ab eo, quem citabamus, auctore profertur. Denique icteri et hydropis historia narratur ex hydatidibus oriunda, quos hepatis commotio creaverat.

Perjucundum est nostrorum temporum inventis praeteritorum temporum observata explicare. Cujus si explicationis periculum facere cupiatis in SWIETENIO BOERHAAVII commentatore deque ictero ab hepatis aegritudinibus auctore locupletissimo experiundi non desiderabitis opportunitatem, ut v. gr. in historia mulieris pauperulae ictericae ad Aph. 935. Comm. III. pag. 107 sq. cui hepar scirrhum, cystitide forsitan interemptae et abscessus hepatici ad Aph. 937. pag. 110 sq. ex celeb. Chirurgo LA MOTTE et in altera historia relata ab eruditissimo medico nostrate CORN. HENR. VELSE, de qua utrum cyrrhosis fuerit, an

scirrhus quaeritur; nec non in observationibus RICHTERI, caet.

Atque haec de icteri caussis in bilis officina: Praeter hunc idiopathicum alius est sympathicus et metastaticus icterus a cerebro, intestinis, cute. Ad priorem attinent capitis laesiones, vulnera infelicis admodum praesagii, quo referunt phlebitides abdominales exque iis natos abscessus hepatis: ad alteram, quam plethora, colluvies, saburra, vermes, dolores colici, hernia incarcerata provocant; cujus generis est icterus plethoricus, saburralis gravidarum, et tenellorum infantum: ad metastaticam, qui exanthemati repulso, ulceri male sanato succedit.

In febribus notatur icterus, qui ex HIPPOCRATIS *Aphorismo* 64. Sect. IV. oboritur 7°, 9°, 15° die. Ab exanthemate, praecipue herpete, aut erysipellate retropulso, a fonticulo incaute suppresso quique reliqui commemorantur icteri metastatici, plerique ad acuta morborum genera pertinent. Cf. Doct. S. GRAEUWEN in *Act. Societ. Serv. Civib.* Tom. XII. Pars I. pag. 98 sq., qui notabilem casum narrat icteri calculosi cum podagrae paroxysmo alternantis.

Est icterus gravidarum, ut plurimum plethoricus, simul et saburralis, de quo supra, cap. de *Hepatitis* Part. I. pag. 189. verba fecimus, quem ex sympathia uteri et canalis cibarii hujusque irrita-



tione ad hepar traducta AUG. BONNET l. l. pag. 196: repetit (\*).

Est icterus neonatorum, quem hoc loco breviter explicabimus. Ab antiquioribus ille a meconio repeti atque purgante syr. praesertim de cichoreo c. rheo curari solebat, nostra vero aetate, a Germaniae medicis ex metamorphosi impedita sanguinisque in jecur congestione ac nuper a medicis Francicis ex solo coloris cutis a rubore ad pallorem transitu nasci creditur: quae ultima opinio non satis explicat, cur icterus neonatorum, nonnullorum duntaxat, nec omnium, quotquot nascantur, infantum sit. Nobis igitur medicorum Germanorum magis, quam Francicorum theoria rei naturae adaequata habetur.

Praesagia icteri petuntur a morbi symptomatibus, caussis, indole, decursu atque eventu probabili cognitis.

Color, quo fuscus magis, aut nigricans, eo universe pejor; universe, inquam, nam hydropica accedente diathesi, flavedinem excipit pallor; quod innuisse videtur CELSUS lib. III. cap. 24: » ubi diutius manet morbus, cum albore quodam palle-

---

(\*) Obs. 14 et 15. STOLLII l. l. hunc icterum spectant suntuque perquam notabiles: in altera bilis ductus ampli, hepatis substantia mollis reperta est; in altera cum enteritide hepatitis fuit et vesiculae felleae duos calculos continentis perforatio visa, ductibus liberis.

scit. Quodsi jam sano similis sit cutis color, si ex urinis dispareant bilis praesentis indicia, si faeces deponantur flavae, bile coloratae et crassae, bene augurari licet. Mala est corporis obesitas et senectus. A febre quae oritur, febre saepe sanatur ('s GRAEUWEN). Icterus saepe recurrens, tandem fit perpetuus. Adpetitus cum macie malus. Pessima signa sunt: stupor, deliria, sopor. A spasmo qui proficiscitur icterus levior est, quam qui a vitiis organicis; calidus facilius, quam frigidus. Qui lente subrepat, causam ponit fixam in corpore haerentem. Morbus vetustior, symptomatibus gravibus, et animali et plastica vita aegrotante, inmedicabilis. In curando hoc morbo natura plurimum, ars parum valet (STOLL) Solvitur urina turbida, crassa, copiosa, quam viam potissimum legit natura: quamobrem urinae tantam habent in icteri praesensione auctoritatem: porro fluxu haemorrhoidum, mensium, alvi, sudoribus, efflorescentiis, materia calculosa in cutem deposita, qualem casum a Cl. VOLTELENO observatum vid. in *Diss. Inaug. Doct. GROEN VAN PRINSTERER* a. 1788. in hac Academia publice defensa; de quo casu tamen ita dubitat Doct. ONTYD, ut ex calculo natum icterum neget, quod utrum recte, an secus, quis in tanta causarum ignorance affirmare audeat. Cf. hujus *Diss.: de Morte et Varia Moriendi Ratione* §. 288. pag. 309 sqq. Nisi vero natura aut arte tollatur icterus, ex marasmo, atrophia, febre hectica, aut

hydrope pereunt. Probe vero tenendum est, evacuationes illas, quas diximus, tum demum esse profuturas, ubi viribus integris et cum levamine fiant. Etenim profluvia colliquativa, sudores hecticos, quis prudens salutaes pronuntiet.

Medendi methodus ad icteri causas, naturam, symptomata componi debet: quod praeceptum practicum universale in hujus morbi therapeutice praesertim sequimini. Nam nullus morbus est, in quo tot tamque diversa sibi repugnantia remedia laudantur; indicio et causas habere naturasque in aliis alias sibi dispares et vero morbi genus esse pertinacissimum. Quo plura videlicet morbi cujusdam celebrantur remedia, eo semper haec esse incertiora minusque reperietis fida; quo pauciora vero, eo certa magis et validiora. Comparatis quaeso farraginem medicaminum ad quartanas debellandas ante repertum febrifugum celebratorum, cum uno cort. Peruviano. Itaque primo, si fieri possit, cognitae tollendae sunt causae. Saepenumero a saburra morbi origo repetenda, in gravidis, infantibus; sub constitutione morborum gastrica; quae lenioribus praesertim purgantibus e corpore subducenda: quo facto, nec raro, morbus sponte cedit. Prudens talis alvi subductio in omni fere ictero juvat; nam rarus sine saburra icterus. Etiam emeticum juvit, causa in ventriculo haerente, quo RICHTERUS haud semel usus est feliciter: quod contra reprobat valde Vog-

LERUS rerumque testimonia profert, nocuisse, imo icterum provocasse ac certe in ictero calculoso, de quo potissimum VOGLERUS, aut ab infarctibus, vitioque organico nocebunt vomitoria, quibus qui uti nesciat, tutius abstinebit. Quodsi post evacuationes sanguineas suppressas, sive menstruum feminarum, sive haemorrhoidalem, ortus fuerit morbus, universali, aut topica per hirudines opus erit sanguinis depletione. Ubi refrigerium accusandum, diaphoretica: pulv. Dover. sp. Minder. et calidum regimen proderunt; quibus etiam remediis quaeque BANGIUS laudabat vesicantibus, exanthemata retropulsa revocanda sunt. Ulcera antiqua, male clausa, vesicantibus, fonticulis, setaceis restituenda. Utriusque curationis eventum probatae exemplum habet Doct. 's GRAEUVEN l. l. pag. 98 sq.

Icterum, qui herpetem secutus erat, RICHTERUS balneo sulphuris sustulit. Si ab animi pathemate inductus sit, animo etiam medicina facienda est et quia tristiores esse solent icterici, lecto etiam et conclavi cultiore, usu, loco, ludis, lascivia, aliis mens exhilaranda, ob quae, CELSO auctore, *regius* morbus dictus videtur. Sin vero spasmus fuerit morbi causa, proderit antispasmodica, opitata, interni, externi medicaminis forma adhibuisse: potissimum infus. fl. cham. aeth. nitr. sulphur. alcohol. aeth. acet. addito interdum vino opii; in hystericis, hypochondriacis castoreum, asa foe-

tida inordinatos component motus spasticos sique magna fuerit dolores omneque genus nerveorum symptomatum sedandi necessitas, utendum est sedante opii virtute. Post sedata symptomata, si ab animi pathemate praesertim, praecipiente RICHTERO, adhibentur utiliter eccoprotica. Is omni ictero subesse stimulum et spasmum cum VOGLERO existimat utque hic oleosa cum laudano regionem hepaticae imponere suadet, sic RICHTERUS ipecacuanham refracta dosi sumendam praecipit.

Secundum morbi naturam, in ictero calido requiruntur diluentia, refrigerantia, acidula, antibiliosa, evacuantia leniora, eccoprotica; in ictero frigido stimulantia, quae resolventia prius dici solebant, sive mitiora, seu validiora.

In ictero calido bilis acrior temperanda omneque corpus refrigerandum est: quare potus diluens, subacidus, ex aqua cum succo citri et sacch., fructus horaci similiaque conveniunt, sique in ventriculum, aut intestina bilis fuerit ejecta, emetico excutienda, aut eccoproticis et tamarind. cass. crem. tart. subducenda est.

Difficilior est et complicata magis icteri frigidi curatio, qui si ab obstructionibus atque infarctibus abdominalibus fuerit productus, resolventia postulat, sive mitiora: tart. tartaris. liq. terr. fol. tart. extr. gram. tarax. fumar. sive validiora: salia alcalina, amara, extr. centaur. min. marrub. alb. absynth.; sive subacria: extr. chelidon. maj., seu

virulenta extr. cicut. bellad.; porro mercurialia, antimonialia: form. Plumm. ung. Neapolit. frictionibus adhibitum; aut tonica, cardiaca: myrrham, martialia, inprimis vero cort. Peruvianum ac thermas praeterea Wisbadenses, auctore maxime LENTINO.

In his auxiliis seligendis, admovendis, saepenumero peccatur. Nam quum non raro subest vel hepatis, vel aliorum viscerum scirrhus, qui quam primum exasperetur, in carcinoma posset converti, aut internae subsunt congestiones venosae, phlogoses, abscessus, fungi, videtis, quam prudenti hic opus sit consilio, quamque male illi agant, qui omnem icterum frigidum a sola debilitate esse cum opinentur, acrioribus semper, aut validioribus armis in eum invehunt.

Quod autem mitioribus etiam remediis, diu adhibitis, tanta res peragi possit, exemplo monstravit SWIETENIUS. » Curavi sexagenariam mulierem, inquit (*Comment. III. pag. 130. l. l.*) quae per duodecim annos laboraverat ictero, in initio per periodos recurrente; sed ultimo anno manebat continuus et nigro ferme colore totum corpus tingebat, solis oculis profundissima flavedine perfusis, ita ut horrorem omnibus illam videntibus incuteret misera aegra. Pertinaci usu succi graminis, seri lactis et similium verno tempore; aestivis mensibus aquis Spadanis, hyeme magna copia saponis veneti cum melle tandem incepit solvi impacta hepatis materies et secutus fuit alvi fluxus per in-

tegros sex menses durans et cum levamine omnium symptomatum. Evacuabatur autem materies argillacea, olidissima, granulis asperis, parvis, calculosis undique respersa. Dum autem vires bono victu sustinebantur et in lauta re constitutae nihil deesset, a tam pertinaci morbo evasit et supervixit sana satis per plures adhuc annos. Integro bienio hanc medelam adhibuit constantissime, quod raro in difficillimis chronicis morbis impetrare ab aegris possunt medici: tanto autem magis mirabar aegrotae longanimitatem, quod primis octodecim mensibus vix quid proficerent omnia haec artis molimina omnesque ejus consanguinei et amici suaderent, ut missis omnibus remediis pacata mente expectaret mortem, quam certam et unicam maiorum medelam praevidebant."

Pertinacissimum icterum pluribus medicamentis frustra oppugnatum diuturno fructuum aestivorum recentium usu sese levasse, testatur QUARINUS. Ubi infarctus viscerum subsunt, clysmata Kaempferiana, visceralia utilissima habentur, quae parantur ex succis expressis, aut extractis herbarum amarificantium: taraxaci, cichorei, caet. Torpido, laxo, pallido c. habitu amara acria, stimulantia: succ. extr. chelidon. gummi-ferulacea cum felle taur. insp. adhibenda: hisque duntaxat corporibus aloetica, extr. helleb. martialia conducunt: qualis SYDENHAMI formula est, ex amaris, acris, cardiacis, chalybeatis.

Circa curationem resolvablem quae dicitur ejusque usum et abusum medicos hortatur RICHTERUS, ne nimis diu protrahatur remque comparatione febrium intermittentium illustrat atque exemplo probat, morbi primo resolvablebus feliciter tractati, deinde iisdem exacerbati sanatique tandem rheo, amaris, martialibus. Hepatis viscerumque scirrhus cujus therapeiam stricto sensu idque jure suo incognitam vocat CRUVEILHIER, nonnulli mercurialia opponunt: merc. dulc. ung. Neapolit. in regionem hepaticam inungendum, cum quibus tamen caute mercandum est, ne ex scirrhus fiat carcinoma. Quapropter et mercurialia ista et antimonialia et cicuta tum maxime profutura crediderim, ubi scrofulosa fuerint in hepate aliisque partibus tubercula: scirrhum vero lenissimis tantum mitissimisque tractandum esse.

Tonica cardiaca indicantur a virium debilitate; obstructionibusque atonicis; quam viscerum atoniam emendabunt optime amara pura et adstringentia: gentiana, absinthium, ferrum, aquae minerales martiales, equitatio, cort. Peruvianus. Cui quidem ultimo remedio cum et cardiaca insit et antiseptica virtus, ante alia auxilia illi adcommodatum est morbi stadio, in quo diathesis suboritur corporis icterica sanguinisque dyscrasia, quo nomine corticem inprimis laudavit 's GRAEUVEN l. l. pag. 184 sq.

Icterus calculosus aliam sub paroxysmo curatio-



nem postulat, aliam extra eundem. Sub paroxysmo emollientia, sedantia, extra paroxysmum calculis, si quae fuerint, adversa.

Sive colica ista atrocissima icterica, quam supra SWIETENII verbis descripsimus ab inflammatione sit, quae recentiorum (\*) opinio, sive quae antiquiorum, a spasmo, propter calculum in ductibus haerentem, conveniet quidquid laxet, demulceat, sedet: ol. amygd. ol. ricin. decoct. alth. mannatum, clysmata demulcentia, emollientia, oleosa, potiones tepidae hordeatae cum melle, balnea, semicupia, fomenta abdominis relaxantia sique spasmi, dolores, tormina urgeant, diacodiata, papaverina, opiata, emuls. amygd. semin. pap. alb. semin. cannab. sativ., cui peculiaris quaedam in ictero virtus inesse videtur. Cf. DE LE BOE SYLVII *Prax. Med.* lib. I. cap. 46. §. 10 et 74. Aegro plethorico juvenili, imminente aut incipiente harum partium inflammatione, necesse erit venam aperire. Emetica a quibusdam ad calculum expediendum laudata et vehementiores corporis motus prudentiores quique merito reprobant. Quid quaeso ad spasmus et dolorem colicum solvendum ab

---

(\*) Rem dubiam ponit ac praesertim mucosam intestinalem accusat A. BONNET in ejus *Monographie complète sur les Maladies du Foie*, Paris 1835. negligit tamen argumenta proferre, quibus haec hypothesis nitatur, aut addere analysin rerum factarum, ex qua haec conclusio ducta sit.

his sperare boni liceret? Porro, sic sapientem audimus MORGAGNUM hac de re praeipientem, ut quae laxant, commendo omnia, ita quae irritant, vehementer suspecta habeo. Detrimentum quod inferunt, ductus ad coarctationem adigendo, certum est; utilitas autem, quam ab impulsione et extrusione calculi plures expectant, incerta. At enim exempla, inquis, calculorum circumferuntur, quos valida pellentia, aut fortiora emetica et purgantia eduxerunt. Fateor, sed felicitis casus temeritatem quis consulto imitari audeat, qui non sciat, (quis autem pro certo sciat) vias satis jam esse laxatas, ut nil nisi ultima impulsio et agitatio desideretur; non vero adhuc rem contra se habere, et in eas angustias conjectum praepropere iri calculum, unde nihil possit expedire, quo magis et cruciatus crescant et pericula augeantur." Extra paroxysmum indicantur, siquae sint, calculum solvantia lithontriptica, qualia esse feruntur radices et herbae aperientes, saponacea, alcalina, aër fixus s. gas acid. carbon., aether nitricus, sulphuricus, sp. terebinth.

In ea, quae primo loco recensui, aperientia inque rad. gramin. multa extant celeberrimorum artis magistrorum encomia. Huc referte casum sequentem SWIETENII, perquam notabilem." Videntur Glissonii verba evincere, quod hyemali tempore in bobus natae incrustationes calculosae vasorum solvantur denuo, dum verno tempore re-

cens gramen pascuntur armenta. Ante multos annos hominem curavi ab hoc morbo, qui quotidiano labore sibi et suis victum parare coactus expensis remediorum impar erat; simul tamen constantis animi et recuperandae salutis avidissimus; hinc promittens curationem, facile persuasi illi. Decoquebat magnam quantitatem graminis in aqua pura et decocto melle edulcorato utebatur pro potu communi; tenerum gramen verno tempore pullulans, vel et post primam sectionem renascens incoquebat carniū juscūlo illoque solo fere utebatur cibo. Primo tempore curae libere fatebatur, talem victum sibi minus placere, sed sensim assuetus absque ullo postea fastidio sumsit et per integrum fere biennium, solis hyemalibus mensibus saltem pro parte exceptis. Narrabat mihi, se solo sapore optima jam posse distinguere pascua et clam debere sibi victum in pratis colligere, dum rustici experti, quam magnam copiam graminis quotidie absumeret, illum vi abigerent. Sanatus autem fuit a pertinacissimo ictero sola hac methodo, licet jam saliva ipsi amaresceret et vidi illum pluribus annis postea incolumi sanitate frui." Adjungit multis profuisse, si quotidie potarent 6 vel 8 libras seri lactis recentis per menses; sed non omnium ventriculū tantam potus copiam pati. Ideo meracissima decocta dedisse ex gramin. taraxac. fumar. cum sero lactis parata, addito sale polychrest. et syrup. 5 radd. aperientium, aestivis

mensibus aquis Spadanis; autumnali vero et hyberno tempore, sapone veneto cum decocto rad. aperientium; et pertinaci usu talium remediorum sanatos fuisse tales ictericos, semperque in faccibus invenisse calculos, vel grumos saltem calculosos magna copia. Jure tamen dubitari posset, utrum fuerint illi grumi calculorum comminutorum partes potius, quam exigua calculorum novorum inchoamenta, qualia in cystide non semel reperta sunt.

Celebre fuit praecedenti seculo ad calculos solvendos remedium Durandi, ex aequalibus partibus aeth. vitrioli et ol. terebinth (\*), cui eo majorem fidem tribuendam esse crediderunt nonnulli, quod utrumque solvisse calculos extra corpus reperiretur. Verum ne moneam, ipsos calculos esse varios et experimenta talia extra corpus facta parvam habere vim ad declarandas medicaminum in corpus vita praeditum virtutes, haec celebrata remedii Durandei virtus maxime antispasmodica mihi esse videtur. Utrum vero, quemadmodum viro

---

(\*) Negat AUG. BONNET l. l. pag. 171. esse auxilia therapeutica, quibus solvi possint bilis calculi eoque nomine pleraque eorum esse rejicienda monet, quod stimulantia sint efficacissima ideoque saepenumero nocitura: quod monitum, etsi nimis proculdubio generale, atque ex ea cui adhaeret auctor doctrina facile explicandum, tamen ad hujus remedii usum praecipue traducendum in eoque adhibendo cautiores vos reddere oportet.

eruditiss. ONTYD placuit, haec virtus ejusmodi sit, ut characterem ictericum corpori impressum deleat, propter parvum curationum felicium numerum, adfirmare non ausim. Nonnulli etiam lithotomiam, sive cystotomiam rectius commendaverunt, quam CRUVEILHIERIUS reprobatur, tunc tantummodo chirurgia opus esse praecipiens, quum abscessus extus promineat: quo loco eorum, quae antea cap. de *Hepatitis* dicta sunt, meminisse juvabit.

Ab aëre fixo, si quod sit in hoc valetudinis genere beneficium, illud a spasmodorum internorum solutione inprimis repeterem; neque ullum novi peculiare ac specificum calculos solvens remedium; quaeque hoc nomine feruntur, ea praesertim sedando spasmos sicque reserando infarctus crederem profutura. Plura autem his viribus praedita novorum calculorum genesin praevertere potius, quam antiquos jamque creatos solvere conjicio; quorsum et superius relata et aquas chalybeatas viscerum abdominalium tonum restituentes refero, maximumque prophylacticum habeo rectum vitae institutum: c. motus, equitationem, rusticationem, cibum leviores, eupeptum, mentem hilarem, curarum oblivionem.

Palliativa icteri curatio jubet imminentem febrem hecticam avertere, natam moderari: quo faciunt quaecunque bilem temperare, subducere, sanguinis crasin corrigere, corporis nutritioni pro-

spicere valeant. Bilem et stimulum a bile mitigant decoct. tamarind. crem. tart. potio Meadii, potio Riverii, serum lactis, acid. vegetabilia, quibus simul alvus strictior solvitur. Prosunt praeterea diuretica leniora, involventibus juncta, stimulum a bile partim per renum vias eliminantia, partim cicurantia; aq. Selterana, Fachingensis cum lacte asinino similiaque leviter nutrientia.

Diaetae et convalescentiae cura in unaquaque icteri specie alia: in calido temperans, refrigerans; in torpido incitans magis et roborans sit oportet. Itaque post icterum calidum, ut praecaveatur relapsus, victus sit vegetabilis: ex oleribus, fructibus horaeis, potu refrigerante, subacido; post frigidum vero animalis magis; ex carne recenti, aut jusculis carniū, vino, aquis chalybeatis, martialibus, simul tinctura rhei vinosa, ad viscerum restituendum tonum adhibita; sicque, ut in aliis etiam morbis, convalescentiae a morbo curatio respondeat necesse est curationi ipsius morbi.

---

## DE SCORBUTO.

Scorbuti nomen alii aliter interpretati sunt. Vocis enim quaerentes etymologiam, alii duxerunt a vocabulo Sclavonico *Scor*, quod morbus significat; alii a Danorum *Schorbeck*, aut Germanorum anti-

quiorum *Scorbeck*, quod ad os depravatam referri debet. Neque nomen nos morabitur. Illud duntaxat tenendum, vocem esse neque Graecae, neque Latinae originis, verum a linguis Septentrionalibus derivandam. Ipsum autem morbum Septentrionalis maris accolis frequentissimum, parum veteribus cognitum, defectu longarum navigationum, medio fere Seculo XVI<sup>o</sup>. inprimis innotuisse atque accurate admodum descriptum esse. Postquam enim a Lusitanis et Hispanis primo et deinde ab aliis populis magna facta sunt itinera maritima, accurate demum cognosci describique coepit, praesertim ab ECHTHIO (1541.) RONSSSEO (1564.) WIERO (1567.) medicis Batavis, qui tanquam classici de hoc morbo auctores haberi possunt.

Fuere illi medici doctrina et arte clari, qui de hoc morbi genere quas fecerant observationes, secum invicem communicasse videntur. Eos secutus est EUGALENUS (1604.) vir magnae adrogantiae et parvis ignorantiae, qui quum ubivis scorbutum sub aliis morborum formis delitescentem detexisse eique larvam detraxisse sibi visus sit, ipsius diagnosin magnopere obscuravit, 49 repertis tum symptomatibus, tum valetudinum generibus, sub quibus lateret. Jam, qui mos est hominum, ubivis scorbutum et nil nisi scorbutum videre coeperunt medici atque EUGALENI tanquam Apollinis cujusdam oracula transcribere, ita ut scorbuti notitiam non a naturae observatione, sed ab EUGALENI libro

petierint. Perquam igitur obscurata fuit ab EUGALENO ejusque imitatoribus et compilatoribus scorbuti diagnosis omnisque hujus morbi cognitio, donec praecedenti seculo medio, ejus naturam observans illustris medicus classiarius JACOBUS LIND monographiam ipsius edidit, quam in epistola ad eum missa *seculare foetum* vocavit magnus LINNAEUS. Et profecto tam perfecta est omnibusque numeris absoluta, ut cum hoc libro paucos admodum comparaverim eumque tanquam monographiae medicae perfectam quandam speciem omnibus de re medica auctoribus proposuerim. Inscribitur autem: *a Treatise on the Scurvy, in three parts, containing an Inquiry into the Nature, causes, and cure of that disease, together with a critical and chronological view of what has been published on the subject, by JAMES LIND M. D. fellow of the Royal College of Physicians in Edinburgh, the second Edition corrected, with additions and improvements.* London 1757. Quaerentibus concinnam atque elegantem morbi descriptionem, dabit HADRIANUS JUNIUS, clarus Litterarum cultor et medicus Hornanus in *Batavia* sua ad finem Seculi XVI. edita:" in scorbuto dentes labuntur, genuum compages solvitur, artus invalidi fiunt, gingivae putrescunt, color genuinus et lividus in facie disparet, livescunt crura ac in tumorem laxum abeunt." Hunc eo lubentius secutus sum, quoniam, quae in Nosologia Methodica



SAUVAGESII et CULLENI reperiuntur hujus morbi definitiones, mancae sunt atque imperfectae. Gingivarum illam adfectionem et crurum imbecillitatem *stomacacen* et *scelotyrben* dixerunt veteres, quibus si adjungantur maculae cutis lividae, flavae, purpureo-violaceae, maxime characteristicae habebuntur scorbuti signa. Sunt ea, ut brevi repetam: gingivarum fungosa intumescencia et cruentatio, mutatus in facie color, cutis et tibiaram potissimum maculae lividae, violaceae et virtutis muscularis in artubus torpor et imbecillitas; praecipue vero lassitudo matutina, quae decubitu in lecto augetur, evigilanti minuitur.

Morbi tria distinguuntur: principii, incrementi summaeque saevitiae stadia; quae non ita a se invicem separata, ut ubi primum desinat, alterumque incipiat, semper exacte definiri possit. Etenim haec temporum definitio in chronicis eo est difficilior, quo lentior esse eorundem decursus solet. Ac praeterea interdum accidit, ut mox brevique post morbum natum graviora symptomata erumpant. Verum in morbis describendis praestat perfectam primo adumbrare morbi speciem, qua intellecta ejusdem intelligi poterunt anomaliae; quam a monstribus incipere, aut varietatibus describendis.

Itaque nascentis morbi signa sunt: corporis totius gravitas, spontanea lassitudo, qualiscunque praeordiorum angustia, crurum imbecillitas levis-

que rigor, cum dolore exiguo; gingivarum pruriginosa rubedo ac dolor; faciei color pallido-fuscus. Increscentis gingivarum laxus sanguifluus tumor et putredo cum oris foetore, quarum aliquando etiam caro ad dentium radices consumitur; utrobique dentes vacillant, crurum adhaec maculae plumbeae, lividae, purpureae, violaceae. Saevientis: ambulandi impotentia, crurum retractio, anhelitus difficultas, maxime ubi aeger movetur, aut erigitur et si aliquando erectus sedet, animo linquitur; decumbens autem respirat liberius reficiturque. Viget interim appetitus; urina est rubra, oleosa, sedimento rubro. Desinit tandem in hydropem, aut haemorrhagiis colliquativis terminatur.

In hac descriptione primos illos auctores Batavos: ECHTHIUM, RONSSEUM, WIERUM secuti sumus; ab hisce enim tanquam puris maxime fontibus perfecta ducenda est morbi forma ac species, quam recentiores rei medicae scriptores, EUGALENUM imitati atque ubivis larvas scorbuti venantes, valde pere contaminarunt.

Agite haec breviter commentemur cujusque stadii signa.

In principio magnus est motuum torpor, pigritia, sedendi et decumbendi amor; quapropter, ubi nautas vident otiosos, pallentes facie, eos brevi scorbuticos fore, praesentiunt medici classarii.

Haec morbi initia. Nec ita diu post alia cernuntur signa morbi nati. Caro fungosa gingiva-

rum excrescit, coloris profunde rubri aut rubro-lividi, ac leviter tacta sanguinem plorat; ad dentium radices retrahuntur gingivae; unde dentium denudatio, vacillatio, caries; hanc tamen a causa scorbutica vix umquam accidere, in practicis lectionibus, post LINDIUM, adnotavit Cl. PARADISIUS.

Maculae comparent potissimum in artubus inferioribus et a sanguinis ecchymosi fiunt, sive extravasatione, quales etiam ecchymoses in partibus fiunt internis, praecipue inter fibrarum muscularium interstitia: a qua causa dolores pleuriticos natos interdum viderunt. Hae autem ecchymoses resolutae per varios colores transeunt, quales in contusionibus visuntur et ubi partem aliquam durius contractes, ejusmodi maculae cernuntur.

Ingravescente morbo ligneam interdum habent crura duritiem; flexores ad poplitem retrahuntur; tument genua. Sub levissimo motu animo linquntur; quare in morbo provento cavendum est, ne aegrum movendo, aut derepente in aërem plenum apertum transferendo syncope fiat lethalis, ut saepe observatum est. In his mortis repentinae causam manifestarunt cordis auriculae plenissimae sanguinis hisque impeditam circulationem, quod se reperisse testatur POUPARTIUS.

Perquam raro laeditur appetitus in hoc morbo; vulgo contra ad finem usque vigere solet. Urina scorbuticorum intense rubra est, turbida saepe.

oleosa, pellicula scilicet oleosa ad vasis haerente superficiem simulque cernitur hypostasis rubra, qualis observatur in intermittentibus autumnalibus quartanariis. Haemorrhagiae istae colliquativae, quibus tragoediae finis imponi solet, ex naribus, fiunt, ore, pulmonibus, ventriculo, intestinis. Illas ex cute unquam factas esse temere negavit RICHARD, *Nosogr. Chirurg.* Tom. I. pag. 148, cui unam opponere liceat, at gravissimam HUXHAM auctoritatem, qui in epistola ad LINDIUM data hujusque Operis cap. II. inserta, casum refert viri juvenis perquam scorbutici, cui tenuis sanguinis rivulus, vix crassior largiori seta equina e sana brachii et manus cute prorupit, bis ex ipsa manus palma, ita ut sanguis ad duorum triumve ad minimum pedum distantiam prosiliens a Chirurgo perito vix ac ne vix quidem sisti compescique potuerit. Hic aeger, juvenis adhuc, post magnos victus vitaeque errores vitamque sedentariam incidit in habitum corporis summe scorbuticum. Erant ei spongiosae, cruentae gingivae, nauseosus oris foetor, magnus numerus pustularum et macularum lividarum ac nigricantium toto corpore, maxime in brachiis, femoribus, cruribus. Tuebant crura, in uno erat ulcus sordidum, saniosum. Saepe alvi tormina patiebatur, subinde cruenta rejiciebat; tumidum et durum fiebat abdomen. Ad minimum motum anhelitus, subinde syncope, frequens largaque narium haemorrhagia. Multis ante

mortem diebus ichor cruentus foetidus continuo ex ore, et gingivis stillabat: ante obitum foetor erat intolerabilis etiam in amplo admodum cubiculo.

Ad ulcerum scorbuticorum diagnosin quod attinet, ea non pus verum plorant, sed saniem tenuem, cruentam; strato teguntur cruoris coagulati, difficulter separando, cui caro subjacet spongiosa, mollis, fungosa. Interim crustae brevi succrescunt denuo eademque adparet sanguineo-putrida ulceris facies. Ulcerum margines coloris plerumque sunt lividi et subferti carnibus fungosis, sub cute crescentibus. Quodsi ulterius crescat morbus, tandem e fundo nascitur fungus mollis, cruentus, qui nonnunquam una nocte ad stupendam magnitudinem augetur atque notante LINDIO, quamvis ferro, aut cauteriis, non sine magno haemorrhagiae periculo, tollatur, mox aequae grandis repullulat.

Quae ulcera atque dolores scorbuticorum a venereis et ulceribus et doloribus quomodo dignoscantur, deinceps cum de lue venerea dictum erit, melius comprehendere a vobis poterit. Interim hoc monuisse sufficiat: dolores in scorbuto acutos aestuosos, transitorios esse et remittentes, in lue rodentes, terebrantes, statarios; in scorbuto motu corporis augeri, decubitu mitescere; in lue noctu exasperari; ulcera scorbutica gingivas, crura; venerea contra tonsillas, nares, ossa palati adficere.

*Lib. II. Pars I.*

21

Atque haec de diagnosi dicta sunt. Nunc de causis verba fiant. De quibus eo plenius dicendum erit, quo acrior est de plurimis contentio, quoque major opinionum discrepantia: ut in tanta disputantium dissensione verum invenire difficillimum sit.

Vulgo creditur scorbutum inferre victus durus, crassus, nauticus, cui etiamsi non omnis deneganda sit scorbutum creandi potestas, minime tamen praecipuae tribuendae sunt partes, quia nautas in summa vegetabilium recentium abundantia scorbutu correptos, aliosque victu nautico solo usos, ab hoc morbo in longo etiam itinere immunes fuisse legimus. Qua de re conferendi sunt LINDIUS, *libr. laud.* atque HAENIUS noster *Problem. de Scorb.* Ansonianae classi ex Mexico reduci, recenti victu omnibusque rebus abundanti morbus natus est, Caesariae legiones, notante KRAMERO, cum carnum recentium abundantia, exercitus Russorum, auctore NITSCHIO, salitis quibusvis carens alimentis in turpem inciderunt scorbutum. A°. 1556 et 1562. sub coelo pluvio epidemicum fuisse scorbutum et humida praecedente coeli constitutione passim in patria nostra grassari, testis est BALD. RONSSEUS, medicus Goudanus quique inter primos illos et classicos fuit de hoc morbo scriptores. Tempestate pluvia, imbrosa, procellosa, praesertim inter nautas saeviisse scorbutum testantur itineratorum diaria; sub qua tempestate

ANSONI classem haec calamitas afflixit. In Groenlandia, ubi maxime endemius est, vapores crassi e mare surgunt tanquam fumus e camino, ita ut frigoris potestati noxiae noxia jungatur potestas humoris. Par est Hollandiae omniumque regionum ratio, quibus hic morbus peculiaris est. Itaque vere dici potest, quemadmodum recte animadvertit LINDIUS, primariam morbi causam esse *humidum frigidum*. Is neque a peculiari aëris marini conditione, neque a diaeta aut regimine, verum ab hac ipsa humida frigida tempestate ejusque in corpora nautarum vi morbum in duobus itineribus maritimis natum vidit (LIND. l. l. pag. 65 sq.) cui causae si jungantur aliae, quae haematosin vitiant, magnus est metus, ne morbus exoritur. Ex his victus crassus est, carnes salitae, fumo induratae, lardum, caseus vetustus, pisces siccati aut salsamentarii, aquae impurae, quae morbum quidem natum exasperare possunt, solae tamen inferre non possunt. Etenim crassus ille victus nauticus duris exercitatis nautarum corporibus adcommodatus est ipsaque itinera maritima docuerunt, hunc minime, ut scriptoribus antiquioribus visum est, principem esse morbi causam. Nam acrimonia muriatica nulla est rerum testimoniis probata et qui vegetabilium recentium victu degerunt, non semper a morbo fuerunt immunes. Praeterea sal marinum innocuum esse, eorum demonstrarunt exempla, qui aqua marina

pro potu usi sunt (LIND. l. l. pag. 50.) immo ne scorbuticis quidem obfuit, quibus experiundi causa fuit data. Recte tamen LINDIUS distinguit inter aquam marinam et victum salitum atque hunc nequaquam innocuum esse fatetur. Verum hunc quoque non necessario scorbutum inferre, cum aliis, tum hoc etiam exemplo probavit, se in itinere trium mensium, omni deficiente victu vegetabili recenti, deficiente aqua dulci recenti, carnibus salitis, tum bovilla, tum suilla, in aqua marina coctis cum vescerentur, rediisse in portum, nullo nautarum vel leviter scorbutico facto.

Praeter victum et aërem humidum frigidum, inediam etiam, immunditiem, vitam sedentariam, animi affectus tristes caussarum occasionalium numero comprehendunt: quae universae in obsidione Bredana conspirabant, quum plurimi milites hoc fuere morbo interempti. Morbi historiam descripsit medicus inter nostrates Hippocraticus FRED. VAN DER MYE in *Tractatu de Morbis et Symptomatibus popularibus Bredanis tempore obsidionis*, Antverpiae 1627. » Cum tristitia (inquit) maloque cibo referti (canes namque et equos passim comedebant) loco humido decumberent, transgressa hyeme scorbutus incepit." Illud quidem cunctis commune est, ut laedatur cutis functio et haematosi. Nempe immunditiae laeditur cutis perspiratio: siquidem nautae, aut milites saepe coacti vestibis humidis induti lectum petere et stragulis



uti humidis immundis, aequae ac pauperes inopescue ex pertinaci scorbuto decumbunt, quo vix affliguntur naviarchae, aut divites: et circa vitam sedentariam: » semper observatum est, inquit LUDOV. ROUPPE, in libro de *Morbis Navigantium* pag. 103. milites ab hoc morbo plus affligi, quam nautas atque etiam plures ab eo interire; qua de re in itinere Ducis ANSONI notabile legitur exemplum; scorbutum nempe tantam inter nautas non produxisse mortalitatem, quantam inter milites; nam ex quinquaginta senibus invalidisque militibus tantum quatuor, ex septuaginta novem classariis militibus remanserunt undecim in vita, caeteri scorbuto obierunt. Nostris in navibus semper observavi si septem fuerint qui scorbuto laborarunt, horum ad minimum quatuor fuisse milites, quamvis numerus militum multo sit minor quam nautarum; et hoc fatum nulli alii causae potui adscribere quam soli defectui motus. Profecto mirum est quantam contra laborem, vel motum ex propria natura foveant aversionem, neque ullo delectantur lusu, sed grave et virile nescio quid prae se ferunt, quasi saltare aut ludere dedeceret militem. Denique hunc morbum plus quoque inter pedites, quam inter equites catapultarios in castris Caesaris apud Temesvarinum saeviusse scripsit KRAMERUS. Forte causa maxima latuit in vitam minus exercitata. Nam qui novit, quomodo vivunt pedites in castris, facile videbit, me tantum

non aberrare a veritate: etenim nisi in armis stent, totam fere consumunt diem dormiendo; sed equitibus, siquidem continuo circa equos debeant versari, occasio ad pigritiam deest. — Vix afficerentur navigantes scorbuto, si suum bene exercerent corpus. Optime norunt hoc boni nautae, qui scorbuto correptos pigros vocant, quia observarunt hos plerumque ab eo in navibus corripi." Et alio loco (pag. 129.) huic morbo ante alios expositos esse, qui ex officio labore vacant (*de pay in 't Kabelgat, de botteliersmaat, de ruimsgasten, de provoost, de pluimgraaf, de veegjongens, doliarios, fabros lignarios, verbi divini ministros*) animadvertit.

Animi affectuum potestatis in hunc morbum memorabile exemplum protulit Chirurgus Anglus YVES (Cf. LIND. l. l. pag. 94.) Scilicet navis DRACO cum in portu jam scorbuticos habuerat nautas, eorum numerus ad 80 accrevit et inter hos multi rigidis contractis cruribus, gingivis cruentis, putrescentibus, ore foetidissimo, anhelosi. Cum vero ad Insulas Olbinenses venissent audivissentque, se cum hostibus praelium commissuros, laetus hic nuntius talem in animis classiariorum induxit mutationem, ut brevi omnes, quatuor tantum aut quinque exceptis, a morbo liberati fuerint. Inde tamen ob infeliciter commissum praelium in pristinum morbum reciderunt.

Huic simile exemplum laudatus antea citat VAN

**DER MYE.** Pessimus inter milites populabatur scorbutus. Hi sine spe recusant excubias, arma ante ducem deponunt, de tradenda civitate inter se conspirant. Rumorem Princeps Auriacus audierat, nec suis credi posse videt civitatem: litteras militibus mittit, liberationem spondet; magni pretii majoris effectus dat medicamenta, plura pollicetur. Laudandus astus, miranda industria. Unicuique medico tres dantur exiguae phialae, quae non duobus aegrotis suffecissent. Persuadetur tribus quatuorve guttulis mensuram integram medicamento reddi. Balsama ostendimus mira: nec capitanei milites deceptos norunt; magna turba unusquisque sibi quid reservari optat, ergo alacres et remediis fidentes. Ex herbis jam erumpentibus fiunt decocta; absinthii multum immiscemus, indimus caphoram, ut virium quid sapiat. Oleum raparum lini et quodvis obvium cera liquatur; finguntur purgantia nova; miscemus quadrata rotundis. Nec eventus nos fefellit, plures statim sanati; quique integro mense se non moverant, erecti obambulabant: illo principis medicamento se sanatos jactant; simplici oleo redit motus: venter sponte dejicit vel parum sollicitatus. Vidimus qui se a medicamentis datis laesos referebant, mox eodem sumpto medicamento vel admoto, a principe id missum nobis affirmantibus, post dies paucos se sanos lacti proclamabant."

Scorbuto sanguinis officina et ipse sanguis potis.

simum laedi videtur, quemadmodum indicant ecchymoses, vibices, maculae, haemorrhagiae, lei-  
pothymiae, sanguinisque habitus dissolutus. Quam  
aetiologiam firman sectiones cadaverum, de qui-  
bus cf. LIND pag. 255, qui varias ex variis colle-  
git auctoribus. Sanguinis et color mutatur et co-  
haesio: ille tristior magisque nigrescens, haec so-  
luta erat. Cor pallidum sanguinis corrupti, plenum.  
Pulmones subnigri: in thorace serum subrubel-  
lum. In abdomine splen justo mollior (\*); serum  
varii coloris, acre, manum inmissum irritans, in-  
flammans. Qui derepente absque caussa mani-  
festa moriebantur auriculas cordis habebant tur-  
gidas, sanguinis coagulati plenas. Musculi cer-  
nebantur gangraenosi, sanguine nigro corrupto  
referti et tanquam colliquati; sanguis ubivis in  
cute inter musculos. Epiphyses ab ossibus se-  
junctae; in articulis humor viridis causticus ef-  
fusus, glandulae mesenterii tumentes: cerebrum  
sanum et integrum. Celeb. POURART brevem rela-  
tionem sectionum cadaverum scorbuticorum in-  
serendam curavit *Actis Acad. Regiae Scientiar.*  
Parisiis 1699. cujus haec summa est. Epiphy-

---

(\*) Magni lienes male ab antiquioribus de hoc morbo au-  
ctoribus cum scorbuto confundi solebant. Illud exinde pro-  
venit, quod, qui intermittentibus pertinacioribus tentati sint,  
ad scorbutum proclives reperiantur. Nec negligenda lienis  
ad haematosin perficiendam summa efficacia dignitasque.

sium in junioribus praesertim aegrotantibus ab ossibus secessus, ossa cariosa, in articulis humor viridis causticus, ossa tumidula; in pectore pericardium, pulmones pleurae et diaphragmati accreti omnesque partes tanquam coalitae, abscessus in hepate, lien justo major et emollitus, subinde renes et pectus pleni abscessuum, sanguis sub cutem extravasatus et in ipsum corpus musculorum effusus, auriculae cordis sanguine coagulato turgentes, ipsum cor ulceratum (idque in uno casu) corporis cava sero acri repleta: cerebrum integerrimum et sanum.

Scorbutus habitualis et chronicus maxime eapropter difficulter et tarde curatur, quia in ipsa corporis constitutione radices egit eique quasi familiaris factus est. Caeterum hic morbus, si rite curetur, raro lethalis. Metuendae sunt haemorrhagiae, dysenteria, quarum illae denotant sanguinis vasorumque paralyisin, haec futuram praenotat gangraenam. Affectio pectoris et pulmonum saepenumero in haemoptoën transit et phthisin scorbuticam. Alii in hydropem incidunt, aut in rheumatismum, articulorum immobilitatem; aut cutis vitia, oedemata, ulcera crurum patiuntur.

Vitae summam brevem praevidebitis, ubi pectus oppressum, alvus pertinaciter clausa, dolores lateris punctorii, crebra animi deliquia ac praesertim, ubi magna spirandi difficultas.

Spem vero longiorem salutemque promittunt alvus fluidior, humidior, mollior cutis, urinarum fluxus liberior, maculae atque ecchymoses ex cute disparentes: musculorum vigor, motuum alacritas, animique hilaritas.

Hanc vitae salutisque spem adferunt aëris, victus vitaeque regiminis mutationes: qua in re omnes conveniunt auctores, principem curationis partem in vitae regimine et diaeta mutata ponentes, quam docuit eos rerum usus et observatio.

Nautas maxime scorbuticos, si ad terras adpulissent salubres, siccas, calidas, omne genus fructuum et herbarum ferentes, brevissimo tempore convalescere, rem mirati testantur itineratores. Hoc modo pessimus saepe scorbuti gradus emendatur. Hoc modo: diaetae institutis et auxiliis scorbutum a navibus suis arcebat immortalis Cook. Aëre sicco, puro, calido curatur optime hic morbus, qui ab aëre humido, frigido, impuro solet nasci. Quamobrem rusticatio et peregrinatio scorbuticis adeo prosunt; praeter haec fructus maturi, olera recentia, succulenta quosque praecipue laudat LINDIUS, fructus aurantium. Victus sit blandus, eupeptus et hyberno tempore, quo fructus recentes desunt, utendum est fructibus saccharo conditis, succis eorum inspissatis, conditis, oleribus succulentioribus, portulaca, endivia, acetosa, inprimis vero brassica fermentata, quod effi-

cacissimum est antiscorbuticum. Cerevisiae recentis potissimum bonae notae, infusi aut decocti malthae seu *byne* in aqua maceratae usus copiosus, ubi vegetabilia deficiunt et ad prophylaxin et ad curationem scorbuti maximopere commendavit MACBRIDE. Vina interque ea Rhenarium scorbuto adversa: quibus si corpora torpida, phlegmatica, addantur aromata, cardiaca. Summopere prosunt etiam crebrae corporis lotiones ex aqua vel sola, vel cum aceto, aut vini spiritu mixta et crebra vestium corpus probe tegentium, munientium stragulorumque commutatio. Praecavetur cum his, tum motu viribus adcommodato. Quantum hic et corporis labor ad scorbutum sive praevertendum, sive sanandum etiam faciant, in itineribus maritimis adparuit. Observavit vir experientissimus ROUPPE (l. l. pag. 101 sqq.) nostris in navibus remiges ab hoc morbo immunes degere, etsi eodem plane victu utantur, quo alii nautae; quia caeteris multo plus laborare, gravioresque labores, praesertim si navis in ancoris stet, tolerare debent. Motus autem sit oportet corporis viribus adcommodatus. Nam provecto morbo anhelant et a leviori motu syncopen patiuntur et ne corporis quidem gestationem, levissimum illud motus passivi genus, absque vitae discrimine ferunt: quo circa in hac quoque re cautos esse medicos jubemus. Animus denique sit hilaris, securus: quapropter medico artifice semper lacta sanationis spes

fovenda est, ut non tantum bono animo mala sua perferant scorbutici, verum ne destituantur efficacissimo horum malorum auxilio. Itaque vere dixit celeb. archiater MEAD: optimum medicamentum est aër salubris opportune inspiratus cum apta diaeta (*Mon. et Praec.* pag. 139.). Hisce autem legibus diaeteticis qui obtemperare aut nolunt, aut nequeunt, parum profecto ab antiscorbuticis remediis experientur emolumenti; quibus si diaetetica illa adhibeamus auxilia, tuto saepe carebimus. Quamobrem qui hyberno tempore in locis degunt depressis, humidis, hunc morbum patiuntur maxime rebellem et pertinacem, quippe qui humidis exhalationibus fovetur. Cff. SWIETENIUS l. l. pag. 596. et OLAVS MAGNUS *Hist. de Gent. Septent.* libr. XVI. cap. 51. pag. 570.

Quae ad praevertendum, eadem ad curandum hunc morbum remedia apta sunt ac saepe diaeteticis auxiliis res tota peragitur. Antiscorbutica, quae vocantur, id est morbi propria remedia, duplicis census sunt, tum succi herbarum viridum, refrigerantium, fructuumque aciduli, endiviae, portulacae, acetosae, fruct. limoniorum, aurantium; tum succi herbarum cruciferarum, alcalescentium acres, ceparum, allii, raphani rusticani, hortensis, nasturtii aquatici, cochleariae hortensis, quorum refrigerantes aciduli, dulces sensilioribus mobilioribusque, alcalescentes, acres torpidis, phlegmaticis magis sunt idonei. Ubi tem-



perata magis temperies, utiliter, LINDIO auctore, utrumque genus copulatur. In longis navigationibus constitit, tam copioso fructuum horaeorum, quam herbarum alcalescentium usu scorbuticos fuisse sanatos, unde LINDIUS concludit, quam vana sit chemicorum de alcalino principio in hac valetudinis specie praevalente theoria, optatque, ut medici semper memores sint Boerhaaviani illius: *chymia egregia ancilla medicinae, non alia peior domina.*

Ab eo inde tempore, quo primum morbus accurate descriptus est, herbae alcalescentes et praesertim nasturtium tum hortense tum aquaticum, cochlearia hortensis, beccabunga reperiuntur adhibitae, tum raphanus rusticanus, allium, caepae, sinapi, usu diaetetico.

Ex hisce cerevisiam medicatam parabat SWIETENIUS, quam hunc in modum descripsit: » Dum cerevisiae dolo aliquot brassicas rubras capitatas minutim conscissas infundebant cum duodecim manipulis nasturtii aquatici vel cochleariae et libra recentis raphani rustici, integras familias curatas vidi, quae tali cerevisia pro potu communi utebantur diu." Similem cerevisiam ex raphano rusticano, cochlearia hortensi et aurantiorum fructibus parandam jussit SYDENHAMUS (pag. 631.). Alia id generis vina medicata ab auctoribus medicis praescripta sunt.

Atque haec de antiscorbuticis hactenus; quibus

siquis specificam quandam virtutem antiscorbuticam inesse existimaret, erraret graviter, siquidem in eodem homine nunc acres illae plantae, nunc fructus scorbutum sustulisse legantur.

Succi isti vegetabiles recentes cuncti proficui, sive in jusculis carniū coquantur, sive cerevisiae aut vino infundantur. Hisce tamen si utamini siccis, quales in pharmacopoliis prostant, aut ex iis siccatis tincturas si paretis, parum hercle proficietis; quia ipsi illi succi herbarum recentes, cujuscunque generis sint, sive acidularum, seu alcalescentium, juvasse deprehenduntur, non tam specificis quibusdam viribus, quam eapropter, quod recentes fuerint.

Hujus autem medicinae antiscorbuticae si quandam jure sperare licet utilitatem, non guttulae quaedam tincturae alicujus, aut spirit. cochleariae, non parva frustula conservae praescribenda sunt, sed omnis victus antiscorbuticus sit oportet. Nam qui his remediis sanati sunt nautae, nullo alio vescebantur alimento. Ubi ventriculus simul et intestina infirma sint (est casus ille perquam rarus) aut amaris puris absynthio v. c. utendum est, aut amaris aromaticis: qualis rad. calam. aromat. est. Caeterum fractus partium tonus optime restituitur alimento, cui ad vires suscitandas aromata; vinum addere proderit; quodsi praeter haec alia requirantur adstringentia, adhibenda capparis, tamariscus, lapathi acuti radix; aut adstrin-

gentia amaris aromaticis copulanda, quo nomine praestans est cort. Peruv. cum acidis fossilibus conubium. Vina austera, chalybeata, ab aliis praedicata, in scorbuto simplici minus proficua. Caeterum notate, opportunum maxime scorbuti sanandi tempus ver esse, propter calidiorem coeli temperiem atque hyberno tempore foci calore frigus esse temperandum vinique analeptica virtute refoecillandos aegros.

Acrida evacuantia semper hunc morbum exasperant ac saepe reddunt incurabilem. Grave enim ferunt haec acrida evacuantia scorbuticorum debilia corpora, iisque obest evacuatio quaecunque gravior sive sanguinis per venae sectionem, sive ventriculi aut intestinorum per emesin, aut catharsin; quodsi alvus strictior solvenda, neque ipsam solvant vegetabilia adhibita, leni ex tamariudis, cassia, cremore tartari similibusque eccoprotico aut lactis sero denique illud perfici debet.

Ulcera scorbutica et internam et externam postulant curationem et illam quidem et primam et praecipuam, quoniam interna eorum caussa est atque emendato corporis habitu et ipsa coalescere solent.

Ad gingivas laxas commendantur medicamina adstringentia ex alumine, decocto c. Peruv., cum spiritu cochleariae, tinctura myrrhae caet. Ad ulcera oris putrescentia, gangraenosa collutoria e melle rosaceo, spiritu salis marini, elixirio vitrio-

li. Similia remedia adstringentia ulceribus erurum scorbuticis apta: alumen, dec. c. Peruv. c. salicis alb., quibus nuper chlorureta addita. Ad horum ulcerum fungosas marginum excrescentias reprimendas adhibenda est compressio neque nimis laxa, neque nimis arcta: ab illa nullum emolumentum expectare licet, ab hac gangraenam metuere oportet.

---

#### DE MORBO MACULOSO HAEMORRHAGICO WERLHOFII.

Species aut varietas scorbuti est morbus ille maculosus haemorrhagicus a WERLHOFIO primum adcurate descriptus, antea sive ad petechias relatus, sive a scorbuto non sejunctus. Eum ut cognoscatis, adponam sequentem morbi historiam a WERLHOFIO narratam. » Puella adulta, robusta, sine caussa manifesta incidebat nuper, versus mensium tempus, in subitam narium haemorrhagiam ingentem, elabente sanguine limpido, sed foetido, una cum vomitu cruento sanguinis spissi nigerrimi. Accedebant statim circa collum et in brachiis maculae partim nigrae, partim violaceae, quales in malignis variolis saepe visuntur. Prostratio virium subita et nota mihi satis indoles morbi hujus maculosi haemorrhagici singularis, de quo quidem non nisi pauca apud scriptores medi-

eos est tractatio, venaesectionem prohibebant.

Dabam primo die remedia acida et largiter nitrosa, quae quum nihil proficerent, sed perdurante assidue utraque haemorrhagia, per nares nempe et vomitum, deliquia et extremorum perfrigeratio cum pulsu parvo et frequentissimo efficacius auxilium urgerent; aucto etiam macularum numero et toto utriusque oculi ambitu et nasi dorso et cute circa os et mentum, livido nigricante colore, velut a sugillatione perfusis, dedi in mistura quovis bithorio corticis Peruviani drachmam dimidiam, addito alternis praebeis laudano liquido Sydenhami ad guttas quatuor. Substitit sensim eo die narium sanguis, vomitus minutus est et altero die cessavit; deliquia nulla redierunt; maculae in die una cum livore faciei primo rubicundum magis, dein pallidum colorem induerunt evanueruntque die septimo; quo etiam pulsus jam naturalem motionis suae modum receperat, viribus ferme cum sanitate penitus restitutis, licet menses justo tempore non advenerint, quod ab haemorrhagiis haud insolens est." *Opp.* pag. 748. Vidisse sese alio loco (pag. 540.) docet, morbum in puella decenni, facta haemorrhagia larga sanguinis foetidi, sinceri partim, partim nigri, partim serosi per nares, gingivas, arteriam asperam, vomitum, secessum, urinam a primo inde initio ad finem usque alternis *ἀνωμαλῶς* vicibus, cum animi deliquiis et extremorum perfrigeratione et maculis toto sensim corpo-

re erumpentibus, copiosis, nigerrimis. Vidisse etiam sed rarius, sine haemorrhagiis solitarias maculas, ut sine his pariles observantur haemorrhagiae.

Notandum autem morbum perfectum haec duo insignire: maculas, sive petechias et haemorrhagias.

Aliquando non tantum maculas verum vesiculas sanguinis plenas una cum maculis easque variae magnitudinis observarunt (Cf. SACHSE in WICHMANN *Id. z. Diagn.* I. pag. 240.) Haemorrhagias factas viderunt ex ore, naribus, ano, vagina, cute variis locis ipsisque maculis et vesiculis, ulceribus, urinae viis, faucibus, ventriculo, aspera arteria, pulmonibus, oculis, umbilico, auribus, mammis: ut plurimum ex pluribus simul locis fiebant; quodque in corpore externo atque mucosis, idem in corpore interno, partibus remotis, fieri sectiones cadaverum monstrarunt, unde mors apoplectica, aliorum synoptica, aut asphyctica explicanda videtur.

Quippe maculae visae sunt in membranis mucosis, serosis, fibrosis inque parenchymate organorum ex sanguine extravasato serumque cruentum effusum. Rem explicat sudor sanguineus ab HOKSTIO relatus (*Obs. Medicin* II, pag. 35. a. 1626.)

» Femina juvenula in septimum mensem praegnans m. Majo a. 1624. incidit in haemorrhagiam subitanam gingivarum, sanguine confertim effluente die noctuque, per septimanas tres continuas, tanta copia, ut aliquot mensuras implere potuisset. Tandem a capite ad calcem usque maculae suc-

cedunt sanguineae, quas cum sudorifero balneo discutere conaretur, sudor supervenit sanguineus, potissimum circa superiorem corporis partem, iis in locis, ubi ante maculae sanguineae sese manifestaverant, quem sudorem postea tanta virium omnium dejectio fuit subsecuta, ut paucis diebus post, vitam cum morte commutaret."

Febris cum per accidens ei jungatur, sunt qui inter febrilem et non febrilem distinguunt: illam fuisse erebro febrim petechialem putaverim.

Morbus est maxime puerorum et juniorum ab iisque ferme caussis et sub iisdem rerum conditionibus ac scorbutus oritur; eadem habens praesagia eademque fere remedia. Perquam ominosum ejus est cum variolis connubium. Aetate puerili saepius cum morbo verminoso gastrico jungitur. Qui a DUNCANO narratur casus, cum febris ab ingluvie praecesserat. Vid. *Casus Medicin* 7. p. 63.

Curatio ubi subest gastrica colluvies, leni fit subacida refrigerante alvi purgatione; cortice Peruviano atque acidis mineralibus absolvitur.

Remedia acida et similia inquit Erud. WERLHOF omne saepe ferunt punctum, cum anodynis, pro re nata, virium robore sic satis constante sociata, ut metuenda humorum exsolutio compescatur et fibrarum moderetur irritatio motusque inaequabilis idem declinante morbo, postremis diebus, exhausto nimium corpore corticem adhibuit. Acida et roborantia pariter DUNCANUS, HUFELANDUS, HAA-

sus commendarunt, hac in re consentientes, in reliqua curationis parte dissentientes: opiata, nitrosa, gummosa, demulcentia, adstringentia, analectica, mercurialia, terebinthinacea, drastica laudantes, quorum plurima inutilia, nonnulla perniciosa habeo. Tam proclive est, cum a regia via, quam bene cognita morbi natura sola monstrare poterit, discesseris, per avia et devia oberrare.

Optima tamen antiseptica illa: acida mineralia et cortex Peruvianus inefficacia aut incerta erunt, praecipiente ROB. WILLAN, sine aëre puro, motu corporis animique hilaritate.

Hujus curationis efficacitatem testatur casus senis pauperis ann. 78. nati eaque feliciter sanati, cujus mentio facta est a viro doct. WALOP in Diario cui titulus: *Ἱπποκράτης Magazijn, toegewijd aan den geheelen omvang van de Geneeskunde, beschouwd als Wetenschap en Kunst* I. Deel I. Stuk pag. 32 sq.

#### ULCUS NOMA, SIVE STOMACACE PUERORUM.

Est quaedam scorbuti puerilis species, quae pueros neglectos, sordidos, male nutritos, cachecticos potissimum adficit, quamque graphice his verbis descripsit SWIETENIUS, ad Aph. Boerh. 423. Comm. I. pag. 749.



» Incipiunt calere, dolere vel et prurire gingivae, ad levem attactum sanguinem fundunt. Hinc inde dein maculae albae oriuntur, in ambitu suo rubrae et inflammatae; quae saepe, si negligentur, proserpunt et depascuntur omnia, cum horrendo foetore et copiosissimo salivae tenuis et olidissimae simul ex ore fluxu. Nostrates malum hoc cancrum aquaticum solent vocare. Nisi initio compescatur hoc malum (quod sp. salis marini omnium certissime fit) non tantum gingivas sed et genas, labia, linguam imo et dentes ipsamque osseam maxillam omnino corrumpit et excidere facit."

In monographia de hoc morbo puerili ab AD. LEOP. RICHTER a. 1828. Berolini edita monet auctor, primam de eo relationem ex Hollandia nostram venisse citatque nostrates BATTUM, VAN DER VOORDE, STALPAERT VAN DER WIEL, MUYS, BIDLOO caet. RICHTERUS tres illius varietates discernit: scorbuticam, gastricam, metastaticam: quae distinctio mihi supervacanea videtur: gastrica enim morbus complicatus, metastatica morbus secundarius est; ut haud unico fundamento haec divisio nitatur, sed duplici: tum a morbi indole, tum a morbi origine ducto. Si prius probetur, discernendum est vitium protopathicum et deuteropathicum, sin laudetur alterum, vel simplex erit, vel compositum, atque duas varietates in uno alteroque casu proferet.

Ad morbum proclivis est aetas puerilis, habitus

corporis laxus debilis, eumque suscitant praeter ea quae scorbuticam in corpore diathesin creare animadvertimus: aërem humidum frigidum, victum durum salitum, abusum mercurii, exanthemata febrilia, praecipue scarlatina et morbilli.

Malum cito proserpere ac saepe lethalem fuisse adsentimur RICHTERO. Hanc vero lethalitatem minus huic ipsi, quam curandi methodo tribuimus: nec desunt exempla hujus mali cum jam per longas moras invaluerat ipsaque ossa carie destruxerat, feliciter, celeriter ac praeter spem sanati. Nam partes non minus cito regenerantur, quam cito perierant. Illud autem ut contingat, oportet medicum esse peritum propositique tenacem, aegrum docilem, parentes denique sanae mentis: quae tria quam raro concurrant, quem fugit rerum humanarum haud ignarum? Rem novis argumentis probatum videbitis, ubi tres morbi historias huic monographiae Richterianae additas legeritis. Nam in priori mater paupercula, vidua, labore duro victum sibi quaerens, nonnisi provectioni morbo medicum arcessivit, neque ab ipso initio huic paria remedia sunt adhibita. In altera malum nec rite cognovit medicus, nec rite curavit. In tertia sero nimis medicina parata est, ipsum vero puellae aegrotantis corpus jam prius inedia fractum offende-  
rat morbus.

Quamobrem auctor vobis sum, ut de hoc morbo adeatis medicos nostrates inque iis praesertim SWIE-

TENIUM, qui non tantum morbum crebro videndi, verum etiam crebro curandi opportunitatem nactus est cujusque de hoc morbo praecepta semper expertus sum saluberrima, quemque si sequerentur exteri, procul dubio in curando essent fortunatiores. Is non levia acida hic juvare, sed fortissima eorumque in hac valetudine efficacissimum muriaticum; sp. sal. marin. aqua diluto omnium certissime compesci posse malum inque eo gravissimo magisque provento salis marini spiritu non diluto, sed mero loca haec tangenda partibusque gangraenosis separatis, partes crudas, dolentes fovendas esse perpetuo sempervivi majoris succo cum aequali copia mellis rosacei monuit.

Profecto hunc si auctorem cognoverant, neque viuo, nec myrrha, nec herb. aromat. infusione, nec camphorae spiritu, nec acidis aliis debilioribus praescribendo, tempus nunquam rediturum trivissent, neque artis suae impotentiam toties luxissent. Vos igitur si fortunati esse in hoc malo debellando cupitis, uti de aliis morbis patriis, ita de hoc medicos nostrates consulite, qui de morbis nostris optime scripserunt, consulite praesertim SWIETENIUM ejusque in medendo prudentiam, constantiam, audaciam sequimini. Equidem nullum auctorem in praxi magis fidum ducem, nullum testem magis veracem, nullum monitorem magis prudentem sapientemque cognovi.

## DE CHLOROSI.

Nullus est morbus (sunt verba medici sagacissimi BRANDIS in libro suo eximio de actione martialium universe et thermarum Driburgensium speciatim, Hannov. 1803. pag. 113.) nullus morbus est, in quo symptomata haematoseos imperfectae magis manifesta sint, quam in prototypo constitutionis cachecticae — chlorosi. Illius symptomata, hoc auctore, sunt: peculiaris cutis pallor, interdum similis ei, qui mortuorum est. Pulsus minimus creberrimus; unde antiquiorum auctorum febris albae nomen, qui autem febris non est, verum communis anaimiae sequela; cordis palpitatio et dyspnoea, quibus addite arteriarum sonum peculiarem (*bruit de diable*) ex anaimia sive hydraimia: unde perperam nonnulli cordis morbum accusant. Sub quovis majori corporis motu atque ex hoc ipso musculorum ingens debilitas, in quam tamen magnum est imperium voluntatis: quod juvenulae chloroticae exemplo probat BRANDIS, quae inter ambulandum cito delassata per horas integras citra defatigationem saltabat.

Minus perpetua symptomata sunt: acor primarum viarum, symptomata generis nervorum, amenorrhoea, alvi durities. Amant quietem, solitudinem, animoque ut plurimum tristes sunt, saepe nihil magnopere curant.

Chlorosis virginum est debiliū, earum prae-  
cipue, quarum corpora brevi tempore magnum in-  
crementum ceperant, quo sanguinis praesertim offi-  
cina et haematosi turbatur. Eodem tempore, quo  
puellae, juvenes subinde hypochondriasin quan-  
dam patiuntur, puellarum morbo haud prorsus dis-  
similem, quam BRANDISIO hoc loco notatam ipse  
cachexiam puberum adpellavit inque adolescente  
abscessu prostatae, naturae beneficio, solutam vi-  
dit.

Quidquid corpus ab una parte debilitare et ab  
altera parte generationis organa excitare earum-  
que evolutionem maturare possit, morbum pote-  
rit facere, qui ex turbato inter corporis horum-  
que incrementum organorum aequilibrio nascitur  
estque igitur metamorphoseos impeditae affectio:  
unde observatio BRANDISII, qui verminosos et alio-  
rum, qui scrofulosos atque rachiticos ex chlorosi  
aegrotasse notarunt, satis commodam habet intel-  
ligentiam; licet minime perpetua sit, aut necessa-  
ria haec aegritudinum copula (\*). Chlorosis in

---

(\*) Hoc nomine culpandus videtur auctor anonymus in  
diario Hufelandiano Tom. XX. pag. 9 sqq. (Berol. 1804.)  
qui varias adumbravit morbi varietates quemque secuti sunt  
ADOLPH HENKE et ELIAS VON SIEBOLDT, quod una cum  
simplici etiam complicatas formas descripsit. Conf. etiam  
F. B. OSIANDER *über die Entwicklungskrankheiten in den  
Blütenjahren des Weiblichen Geschlechts*, 2. Ausg. II. Th.  
IV. Kap. pag. 317 sqq.

tempore cognita nec perverse curata magis ad-  
spectu, quam vero discrimine terret. Duas tan-  
tum puellas chloroticas interemptas vidit BRANDI-  
SIUS, alteram hydropicam, diureticis male vexatam,  
alteram ex cordis vitio cum chlorosi juncto: neu-  
tra ex morbo igitur periit; verum alteram ars pra-  
va occidit, alteram vitium organicum in parte no-  
bili, quamvis ne in hac quidem ars fuerit insona.  
Siquidem postquam aegrae conditio martialibus plu-  
rimum fuerat emendata, quia catamenia non re-  
dierant eorumque retentio malorum causa habe-  
batur praecipua, sex hirudines ad pudenda admo-  
tae magnam fecerunt sanguinis jacturam, unde  
prompta exacerbatio atque sub atroci dyspnoea ac  
palpitatione perpetuo incrementibus, mors die ab-  
hinc duodecimo.

Sanari chlorosin interdum matrimonio; saepius  
vero chloroticas feminas aut infocundas esse (\*),  
aut abortire, aut infirmam prolem procreare, RICH-  
TERI animadversio est.

Idcirco tanti facienda est prophylaxis, quam ab  
institutione ac *παιδεία* prudenti tam corporis, quam  
animi, a rite moderanda utriusque evolutione ac  
regunda caute pubertatis metamorphosi expecta-  
bitis.

---

(\*) Hujus loci sunt vitia genitalium in corporibus chlo-  
roticarum saepius reperta, de quibus vid. CAEUS *Gynaekolo-*  
*gie* I. Th. §. 218. pag. 163.

Nato jam morbo vincendo unice paria esse *martialia*, nec satis mature ab iis initium fieri posse, contendit celeb. BRANDIS, ac omnes ita dictas praeparationes, per res solventia, quae vocantur, saponacea, salina, purgantia nocere, subjungit. RICHTEUS contra in hoc praecepto eum nimium fuisse, monet: nunc congestiones esse moderandas, nunc pituitam tenacem intestinorum solvendam. En iterum non de theoria, sed praxi inter viros artis peritos gravem controversiam! Quod si meum interponere iudicium liceat, cum BRANDISIO facio animadvertente unicum fidum in chlorosi remedium in *ferro* esse positum ac plerumque diu nimis ejus usum differri tempusque inutiliter teri corpus resolvendo, purgando, praeparando; esse tamen casus fateor, in quibus propter congestiones interponi utiliter temperantia, aut propter obstructiones evacuantia debent, quibus tamen interpositis, ad ferrum debita cum cautione erit recurrendum. Habent *martialia*, ipso fatente BRANDISIO, illud incommodi, ut alvum stringant, tam limatura ferri, quam indiscriminatim laudat SYDENHAMUS; quam pleraque chemicalia ex marte parata. Quocirca cum amaricantibus, cum amaris, cum sulphure *martialia* copulavit, aut cum vino chalybeato amara extracta miscuit; sibi tamen plures obvenisse casus, in quibus non ita felici esse contigit, remedium aegro idoneum reperire eoque nomine *thermas Driburgenses* reliquis cum praepa-

ratis tum thermis antecellere testatur remque duabus aegrotantium historiis probat. Opulentioribus hae thermae martiales, sive resolventes simul Driburgenses, sive magis excitantes Pyrmontanae, sive debiliores pectorique magis amicae Kissingenses, tum aquae Fachingenses usu domestico quotidiano; pauperioribus vero vitriol. martis cum amaris, tinct. ferri tartarisat., fl. sal. amm. mart. cum gum. ammoniaco et efficacia maxime et alvum minus stringentia medicamina habeantur.

Mihi semper in more est, ex peculiari medicamentorum genere ea seligere, quae aegro cuivis ejusve conditioni respondeant, mentem semper defixam tenens in genus morbi illiusque medendi methodum genericam. De ferro igitur *chloroticarum* remedia componens, incipio plerumque a lenioribus: fl. sal. ammoniaci martialibus, tinct. martis tartarisata, sim. ab hisce transeo ad vitriolum martis, limaturam ferri, tinct. martis cydoniat, vina chalybeata caet.

Chlorosis cum statu mucoso exigit flores sal. ammoniac. martiales cum g. ammon., cum statu gastrico alvoque duriori vel hos ipsos, vel tinct. mart. aper., cum statu nervoso corporeque infirmo tinct. nerv. Bestucheffii. Ex validioribus martialibus alvum minime stringit vitriol. martis, amaricantibus, amaris, tonicis copulatum: cum generis vasorum orgasmo martialia nequaquam consonant ideoque hic prius fossilibus acidis sedandus est. Chlorosis



cum intermittente febre conjuncta, aut ex ea superstes oppugnanda alterno cort. Peruv. et martialium usu, et si thermis uti licet, a Kissingensibus, quae SIEBOLDTIO multis laudibus extolluntur, incipiendum, in Pymontanas et Driburgenses desinendum, atque ita curatio morbi pertinacioris etiam a vobis perfici posse quam feliciter spondeo.

---

#### DE CYANOSI, SIVE MORBO CAERULEO.

Est morbus sanguinis, *cyanosin* vocant, in quo sanguis venarum arterias ingreditur propter patulas vias sive inter cor dextrum et sinistrum, sive inter principes truncos vasorum atque cutim et membranas mucosas livore colorat. Coloris ista mutatio est e praecipuis morbi signis: laesiones cordis organicae aut vasorum majorum conditiones sunt ad eum generandum requisitae et mixtio sanguinis rubri et nigri ejusque per corpus universum distributio ejus character est peculiaris: ita de hoc morbo praestantissimae monographiae auctor GINTRAC vir cl. Mechanismo circulationis graviter laeso: haec ipsa foetus aut reptilium circulationem aemulatur, quo facto proprius creatur habitus, sibi adeo similis, ut aegri ab observatoribus medicis descripti tanquam unius esse ejusdemque familiae adpareant.

Cavete tamen, credatis, ipsas has vias patulae cyanosin facere. Numerosa sunt exempla foraminis ovalis non clausi, quin tamen morbus caeruleus natus sit. Is ut nascatur, debet rhythmus motuum cordis et ipse sanguis a via legitima abduci. Itaque haec deviatio, non autem vitium organicum caussa proxima est morbi caerulei, cujus nomen ab ea coloris mutatione ductum est, quam facit.

Inter primos, qui morbum anatome illustrarunt, fuere Jo. BAPT. MORGAGNUS et Ed. SANDIFORT.

Prima observatio MORGAGNI haec est (Ep. XVII. art. 12.). » Virgo quae ab nativitate usque semper aegrotans jacuerat, ob suminum praesertim virium languorem anhelans respirabat et tota cute colore quasi livido infecta erat. Tandem cum ad annum circiter decimum sextum pervenisset, mortua est. Cor habuit exiguum et mucronem versus quasi subrotundum. Ventriculus sinister forma erat, quae solet dexter et dexter vicissim, quae sinister: et quanquam hoc latior, parietibus tamen crassioribus. Dexter pariter auricula tota duplo erat grandior, quam tota sinistra duploque carnosior. Inter utramque etiam tum patebat foramen ovale, ut minimum digitum posset admittere. De tribus valvulis triangularibus justam una magnitudinem, duae reliquae minorem habebant. Sigmoides autem, quae pulmonaris arteriae ostio praeficiuntur, ad basin quidem erant secundum naturam, sed parte superiore cartilagineae videbantur;

quin exiguum ossis frustulum jam habebant, erantque ea parte sic inter se colligatae, ut vix foramen relinquerent lente non majus, per quod sanguis exiret. Erant autem ad illud foramen quaedam exiguae productiones carneo-membranosae ea ratione collocatae, ut valvularum vices supplere possent egredienti sanguini cedendo, regressuro autem obstando."

Itaque in hac virgine patebat foramen ovale, arcta vero erat sanguinis a corde ad pulmones via et auctum lacertorum et columnarum dextri ventriculi robur; quia crebriores et validiores motus, ut in artubus videmus, major musculorum crassitudo sequitur, rem bene interpretante MORGAGNO.

Altera historia ab eruditiss. ac clariss. viro ED. SANDIFORT *Obs. Anat. Pathol.* I. cap. 1. tradita, etsi satis longa, tamen quae a vobis legatur, dignissima est." Sanis parentibus procreatus, sanus in lucem emissus infans d. 17. Nov. 1764. non matris, sed nutricis ubera traxit, nutricis, quae convulsivis symptomatibus obnoxia, ultra 6 septimanas lactare eundem non valuit, alius dein, quae sanissima, hilaris, optimo lacte abundans per integrum annum mammas praebuit, sic ut optime incresceret et primum aetatis annum ferme impleverit sanissimus, nulloque quantum aut externus adspectus, aut fallere nescius infantis habitus docuit, vitio correptus.

Sed primo aetatis anno vix ac ne vix quidem

elapso, sese terribilium symptomatum, quae postea adeo gravarunt miserum, monstrarunt initia. Digitorum quippe, unguiumque livor, non continuus, sed nunc magis nunc minus visibilis, parentum attentionem in se traxit, praesertim quum nulli compressioni vestimentorum, quae incusando videbatur, adscribi posset; tantus tamen hic non erat, ut medici consilium aut et auxilium imploratum sit, quum caeterum sanus videbatur infans et sensim pedibus inniti non tantum, sed et incidere incipiebat, sic ut secundo aetatis anno nondum elapso, solus obambulare. Tum vero de lassitudine conquerebatur insigni, mox atque corpus moveret, etiamsi vix tantum, quantum solent illius aetatis infantes. Accessit catarrhus, gravi, anxia tussi stipatus et dum praescriptum a medico remedium pertinaciter recusavit, subsequente die in facie detegebantur maculae plurimae, primum rubrae, deinde lividae. Tussis de tempore in tempus vexabat, motus sensim erat molestior, et ubi sese defatigaverat, facies, manus, pedes livescabant insigniter, imo tunc labiorum et linguae color ad nigrum saepe vergebat, quiete rursus in naturalem mutandus et hae vicissitudines ferme quotidie observabantur. Interea longitudo corporis augebatur multum, appetitus satis vigeat et nonnisi de lassitudine, dolore pressorio in superiore parte capitis, de anxietate, praesertim tempore hyemali, de frigore tanto, interno etiam, ut so-

cus hyeme vix calidum corpus redderet, aut aestate ardentissimi solis radii naturalem non praestarent effectum, multo minus sudores elicere possent, conquerebatur.

Initio Martii 1767. venaesectio eo effectu instituta, ut et anxietas et pressorius capitis dolor pro tempore imminuerentur. Sanguis tunc crassus, ater fuit, et frigefactus postquam fuerat, crassamentum sese a sero non separavit. Eodem anno ad finem vergente variolas superavit facile, anxietate tunc temporis non adaucta; paucis mensibus elapsis, morbillis, deinde variolis spuriiis laboravit iisque princeps malum neque adauctum neque imminutum fuit. Ab hisce autem restitutum morbis symptomata dicta vexarunt, mox atque corpus moveret, praesertim anxietas, quam tunc et saepe postea vehementes adeo cordis palpitationes comitabantur, ut oculis perspici imo audiri enormes cordis ictus potuerint. Equitatio tum proposita, ut absque defatigatione corpus moveretur, neque utilitatem adtulit, neque diu perferri valuit.

CL. GAUBIUS a. 1769. in consilium vocatus, motum qui absque defatigatione fieri posset, omnino necessarium duxit balneumque frigidum bis de die esse adhibendum suasit, sic ut aqua primo die ad genua, secundo ad abdomen pertingeret, sequentibus altiora loca peteret, donec ad collum pervenisset; eoque per quadrantem horae adhibito, instituendum motum, hoc vero impossibili, infau-

tem lecto imponendum, corpusque sedulo fricandum, abstinendum autem esse ab hoc remedio, si forte morosus infans reluctaretur, monuit. Tale vero balneum non saepe fuit adhibitum, quum enim thorax aquae semel fuerat immersus, tantis anxietatibus fuit correptus, ut aquam cum tranquillitate intrare recusaverit penitus. Leni itaque motu, repetita de tempore in tempus venaesectione malum superare, aut tolerabilius reddere conati sunt, sed absque fructu. Permansit in eodem statu. Anxietatem, ubi haec ad summum gradum devenerat, concomitabantur tussis sicca, tolerabilior quando anxietas imminuebatur. Oris halitus tunc temporis fuit insolitus, comparandus cum eo, qui ex ovo recenti cocto et statim aperto exire solet.

Tristis haec malorum series nunc magis nunc minus infantem vexavit ad ann. 1774, tunc vero anxietas adeo adaucta est, palpitationes tam vehementes fuere, ut gradu praecedentes omnes accessus hic longe superaverit; leipothymiae, dolor capitis pressorius, tumor venarum jugularium, illarumque undatio seu pulsatio observata sunt. Equitatione plane impossibili, ne ab omni abstineret motu, curru quotidie vel altero die vehebatur. Secta m. Majo vena anxietas rursus imminuta, corpusque ad motum alacrius redditum, sic ut subinde per horam obambulaverit absque magna defatigatione et spem recuperandae salutis suscipe-

rent parentes. Verum autumnali tempore omnia ingravescebant symptomata; sicca et anxia tussi sputa sanguinolenta, subinde purus sanguis ejiciebantur, quamobrem m. Novembri quatuor dierum spatio bis sanguis e corpore detractus fuit. Persistebat tamen anxietas, imo haec subinde tanta erat, ut mors propinqua videretur et infans perciperet, se non diu superfuturum, saepissime adfirmans, malum quò laborabat, omnibus omnino incognitum, incurabile esse neminemque comprehendere posse, quid ipse loco cordis perciperet. 14°. Decembris iterum instituta venaesectione levamen aliquot dierum attulit, sed gradatim rursus in pejus vergebat malum, adeo ut hyems ipsi infanti ferme intolerabilis, parentibus etiam summas crearet molestias.

Mensibus Aprili et Julio repetitae venaesectiones, decocta aperientia, depurantia largiter epota et totum hunc supervixit annum, absque ut vel ullum perciperet levamen. Febris per totum morbi decursum vix unquam animadversa.

Quae initio a. 1776. infantem examinans Cl. HANN praescripsit (hirudines, lene emeticum, pilul. cathart.) levamen pro tempore attulerunt, sensim tamen malum in pejus vergebat, motus plane reddebatur impossibilis, etsi corpus vel parum exercebat, insignem aquae copiam ore demittebat, lei-  
pothymia corripiebatur et per aliquod temporis spatium nil omnino videre poterat. Quaecunque

tunc adhibebantur remedia frustranea fuerunt, anxietates augebantur insigniter, praesertim cum lectum petebat, quae antea placebant, jam nihil amplius ipsum adficiebant, intumescebat facies, oedemate corripiebantur pedes, miserrimamque traxit vitam ad d. VIII. Mart. 1777. quo summa anxietate correptus, vivere desiit.

Instituta cadaveris sectio d. x. Martii. Color integumentorum licet non adeo lividus, quam in vita, stagnante quippe maxima sanguinis in corde aut vasis majoribus copia; horum tamen et subsectorum musculorum separatio taediosa erat, tantum enim in vasis, minoribus etiam adhuc aderat sanguinis, ut continuo efflueret et maximo esset impedimento adeoque multum temporis fuerit impendendum, antequam ossa penitus essent denudata et thorax aperiri posset. Tunc autem sternum a claviculis liberatum, separatis musculis, diffractis in quoque latere sex superioribus costis, ad abdomen reflexum fuit. Aperta sic thoracis capacitate non, prout caeterum solet, pericardium pulmonibus quasi cinctum et comprehensum sese exhibuit, sed unica massa conspiciebatur, totum ferme cavum adimplens et pulmones quam maxime comprimens. Haec autem massa pericardium erat, continens distentum maxime et sanguine repletissimum cor. Extendebat sese a diaphragmate (quod in dextro latere ad costam quintam, in sinistro tantum ad sextam adscendebat) ad locum



medium inter primam ac secundam costam ac laterales thoracis partes tantopere replebat, ut pulmonis dextri portio tantum anterior, margo nempe lobi superioris et medii conspiceretur, sinistri vero nonnisi exigua pars a parte laterali ac superiori sese manifestaret. Supra pericardium vena cava superior una cum subclaviarum principiis, parte thymi adhuc tectis conspicua, sanguine atro intumescebat.

Pericardio dissecto aquae copia quaedam effluxit, neutiquam vero tanta, quin saepe in cadaveribus, nullo hydrope affectis, talis imo longe major detur. Cor autem a sacco suo separatum turgidissimum erat, non vero aequabiliter, non ambo ventriculi ad eundem gradum erant distenti, sed dexter ventriculus una cum sinu atque aure ipsi appositis insigniter et multo magis quam sinister sanguine turgebat venaeque omnes per externam cordis superficiem incedentes, coronariarum rami, ad minutissimos ferme fines adeo dilatatae erant, ut felicissima etiam injectio illas distinctiores reddere neutiquam potuisset. Venae ex subclaviis enascentes, imprimis jugulares enormiter sanguine repletae erant, tenui, atro. Cava superior, ubi intra pericardium haeret, capacitatem naturalem non multum excedebat, inferior vero solito magis erat expansa. Pulmonales turgidae quidem, sed non ultra modum. Aorta magis quam solet in principio dilatata, sed arteria pulmonalis eo loco, ubi ex corde

oritur, tantopere contracta erat, ad bifurcationem ferme usque, ut omnium in se traheret attentionem, Canalis arteriosi, seu potius hac aetate ligamenti ex pulmonali arteria in aortam tendentis olim pervii, nullum adfuit vestigium. Pulmones extrinsecus nullam manifestabant labem; parvi tamen, compressi, non admodum extensiles, satis docuerunt officio suo, omni sensu, rite fungi non valuisse.

Vel externa cordis contemplatio mali sedem omniumque symptomatum unicum fontem in ipso delitescere docebat. Hoc itaque, ligatis vasis omnibus, tum quae a trunco accipit aut ipsi tradit, tum quorum ope cum pulmonibus cohaeret, a trunco, a respirationis organo liberatum, ulteriori examini fuit subjectum. Apertus primo sinus dexter cum aure fuit, ut copioso, tenui, atro sanguine emissio capacitas haec primo lustrari valeret. In pariete intra dextrum atque sinistrum sinum obvio foramen ovale aperturam monstravit, quae crassiorem stilum admittebat. Digitus ventriculo dextro inmissus dein apice incurvatus ac versus orificium arteriosum, solito more ex hoc ventriculo enascentis arteriae pulmonalis promotus, illud orificium nullo modo detegebat, verum absque omni difficultate in alterum illudque capacissimum admittebatur. Sed quanta adstantium, quanta pariter mea fuit admiratio, ubi vidimus apicem digiti in arteriam aortam, nullam omnino juxta constantes

naturae leges cum ventriculo dextro communicationem alere solitam, pertingere! Ventriculus ea propter dexter in loco opposito illi valvulae, pone quam aditus ad orificium arteriosum est, ad apicem usque findebatur, atque tunc digitus non tantum, verum oculus sublata parumper dicta valvula, orificium capax aortae detegebat, una cum margine glabro, ultra quem propulsus et deorsum tunc promotus digitus in alterum sinistrum cordis ventriculum pertingebat.

Secta ad sufficientem a valvulis semilunaribus distantiam arteria aorta et examinata eundem illum marginem monstravit, quo orificium dividebatur in partem majorem cum ventriculo dextro communicantem, in minorem ventriculo sinistro adscribendam. Arteria itaque aorta enascebatur ex ventriculis ambobus et sanguinem omnem ex utroque accipere debebat. Hoc autem notatu dignissimum magnae arteriae principium, alia sectione facta tanto melius oculis sese exhibuit; lustrato prius arteriae pulmonalis orificio. Haec arteria supra valvulas abscissa has parvas admodum ferme concretas et substantia quadam granulosa, carneas excrescentias referente, obsessas exhibuit, sic ut non nisi exiguum relinqueretur spatium, quod apicem tenuioris stili admittens huic aditum ad ventriculum dextrum praebebat, eundem vero difficilius a ventriculo ad arteriam trans mittebat. Loco inter duas valvulas medio apertum hoc orificium

postquam fuerat, binas tantum valvulas vidimus, diffformes, pro parte dicta granulosa substantia obsessas, qualis in arteria supra valvulas sese etiam exhibuit.

Dissecta tunc sinus dextri illa parte, quae aortae propinqua est, una cum arteria ipsa, in ipso orificio integrae duae valvulae, pone quas coronariarum arteriarum orificia dantur, sese monstrarunt, tertia medio loco secta erat. Margo glaber rotundus viam versus dextrum et sinistrum ventriculum distinguens, parietem inter binos ventriculos medium, in superiore parte terminans, pulchro sese exhibuit modo ac nullam omnino dubitationem reliquit, quin arteria magna communicaret cum dextro aequae ac sinistro ventriculo.

Sinus sinister apertus parvus, praeter aperturam foraminis ovalis, nihil exhibuit. Ventriculus etiam sinister nil insoliti ostendit, praeter dictum marginem in principio arteriae aortae. In crassitie ventriculorum tanta non animadvertebatur differentia, quanta plerumque locum habere solet, sed dexter si non crassior, aequalem crassitiem ac sinister habebat. Nullibi polyposa concretio observata.

Vitium hoc congenitum fuisse, licet primo aetatis anno videretur latere, recte existimat SANDIFORTIUS remque probabiliter explicat (ib. 35.). Illud autem, utut a MORGAGNO etiam morbus descriptus erat, tunc temporis fuisse incognitum, dq-

cent virorum clariss. GAUBII et HAHNII ineptae curationes et datae ad SANDIFORTIUM litterae viri celeb. LOUIS, Regiae Academiae Chirurgiae actuarii, ingenue confitentis, hanc SANDIFORTII observationem illustrasse casum consimilem, qui sese ipsi obtulerat et cujus phaenomena talia erant, ut absque expositione ab eo exhibita, comprehendi vix potuissent (\*).

Tertia observatio apud GINTRAC puellae mendicae quindecennnis a TACCONIO referente his verbis inscribitur: *de morbo, qui lapsum ab excelso loco et inde ortum terrorem secutus est.* Nimirum quinto aetatis anno dicitur ortus. Puellae incessus adeo erat lentus ac difficilis, ut ad tertium quemque gressum subsistere cogeretur. Manus, unguis praesertim, brachia, facies, labia, album oculorum mirum in modum livescebant: in dextro pectoris latere pulsatio valida continua; ingens artuum debilitas; solo liquido cibo eoque nonnisi aegre vescebatur, alvus vix solvebatur; flante Borea tam male habebat ut fere suffocaretur: vox debilis, pulsus parvus, frequens. Tandem hyemis tempestate serena at fri-

---

(\*) Plus récemment (1814.) inquit GINTRAC, on a vu les principaux médecins d'une capitale (Amsterdam) donner l'exemple d'un doute semblable. Itaque triginta annis, postquam a SANDIFORTIO nostro edita erat, quam vobiscum communicavimus, morbi historia. Est Obs. illius 37. pag. 131 sqq. Nec tamen vel a medicis Parisiensibus ante obitum cognitus fuisse videtur: quemadmodum docet casus ipse pag. sq. relatus.

gidissima dolorem questa sinistri lateris et sanguinem spuens nigrum, voce submissa et viribus fracta perrexit in via publica mendicare usque ad diem abhinc decimum quartum, quo ex loco, quo considerare solebat, rediens extincta est. Cadavere die sequente secto praeter livorem totius corporis, praegrandia hepar, omentum, ventriculum, herniam diaphragmatis, venas sanguine nigro turgentes, pulmones contractos, exsuccos, renitentes eoque, quo doluerunt, lobo dextro nigredine coloratos pleuraeque alligatos, sanguinem in diaphragma effusum, cordis mira cernebatur forma et fabrica: forma nempe non conici, sed ferme cubi, ventriculus sinister dextro suppar, hic robore ac torositate aortico similis, uterque pariter plenus sanguinis crassi nigri, arteria pulmonalis adeo clausa, valvulis sigmoideis arcte nexis, ut ne aquam injectam quidem, nisi per aperturam casu factam transmitteret. Ipsum hoc vas rugosum, contractum, sanguine vacuum; ductus arteriosus, quantum judicari potuit, coalitus: foramen ovale contra patulum magisque, quam in foetu, praecipue a dextris.

Lubet huic addere Obs. 37. non unam ob causam memoratu dignam. Puer natus Amstelodami, parentibus sanis, primo vitae biennio et ipse sanus videbatur. Anno aet. 3°. manum habuit graviter contusam, unde dolor ingens, pallor, spasmi, convulsiones, clamores, livor primum faciei, tum totius corporis animique deficientia. Secuti sunt post-

ea novi paroxysmi, minus quidem graves, at quotidiani, aegroque licet bene adpetente, debilitas, macies, atrophia, crurum praesertim. Saepe dolent hypogastria, lumbi praecipue, tempore paroxysmorum. Sitis vix explebilis, cutis sicca. Exinde symptomata exacerbata rursusque primo persistentia, tum decrescientia: perennante tamen colore violaceo genarum, labiorum, unguium digitorumque summorum.

Compluribus medicis Amstelaedamensibus in auxilium vocatis, nemo agnovit morbum; alii epilepsiam crediderunt, a genere nervorum, propter manus laesionem irritato ortam, alii accusarunt vermes intestinales: alii hepar aut splenem aegrotare dixerunt, plures scorbutum habuerunt: unus duntaxat ex vitio repetivit organico incognito. Quisque medicamina praescripsit adcommode ad eam, quam de morbo sibi finxerat, opinionem. Infans spes parentum ab his de eo sollicitis Parisios mittitur. In itinere tam gravem passus est paroxysmum, ut mortuum crederent. Parisiis aegro praescribunt frictiones ex lin. volat. opiat. camph. ad columnam vertebralem, femora, crura: balnea tepida, antiscorbutica, exercitium moderatum, victum vegetabilem, tempore paroxysmi potionem sedantem. Postquam plures menses Parisiis degerat novoque vitae generi adsueverat, hilaris fit puer, crura carnes et habitum recuperant, redeunt sensim vires, paroxysmi et rariores fiunt et minores, ut pater sanatum

credens reditum in patriam cogitaret. Verum pridie ante profectionem paroxysmo gravissimo suffocatus moritur.

- In corde eadem fuere, quae in SANDIFORTII puero reperta: scil. aorta ex duobus ventriculis nascentis, arteriae pulmonalis orificium retractum, foramen ovale non clausum.

- Non opus est reliquas persequi, tam sibi similes sunt. Id tantum notari meretur: qualia morbi signa sint, quae ex numero observationum quinquaginta trium, quas undique collegit erud. GINTRAC, licet comparare. Itaque pathognomonica maxime sunt: livor cutis, et membranarum mucosarum, dyspnoea, cordis palpitationes, caloris decrementum, summusque frigoris sensus, ne foci quidem aut solis calore tollendus, digitorum phalanges ultimae tumentes, sera pubertas, plerumque aliarum quoque partium evolutio impedita atque universe corporis inferioris prae superiore incrementum tardum. Haec constantia magis signa, alia minus certa: oculi protuberantes, humidi, alae narium extantes, labia grandia, facies tumida, tinnitus aurium, capitis dolores, animi habitus jam sedatus, jam tristis, iracundus, somnus turbulentus, tussis sicca, aut cruenta, purulenta, mucosa, caput grande, thorax arctus, artus extenuati caet. Crebro exacerbantur tanquam per paroxysmos haec symptomata, aut motu, aut animi pathemate, aut pastu, aut somni aut vigiliarum tempore concitato spasmo gravi magnaue dyspnoea,



vehementi cordis palpitatione, aut syncope, quo vulgo livor cutis increscit quemque excipit languor, lassitudo, debilitas, nec raro mors.

Fallere quidem possent haec signa, quae et hydropi pectoris ac pericardii et aneurysmatibus cordis et scorbuto et chlorosi et phthisi communia sunt; nec tamen omnibus omnia, neque a prima inde aetate manifesta: nec pari symptomatum syndrome, morbique origine ac decursu. Etenim inspicientes relatas ab erud. monographiae auctore observationes, magnam in tanto discrimine detegitis similitudinem. Desunt praeterea propria aliis consimilibus morbis symptomata, horumque phases, stadia, progressus, incrementa, quaeque exstant exempla cutis livore coloratae ex suppressis catameniis, ex plethora cutanea venosa caet., ea tum temporis ratione, tum macularum apparitione, tum pruritu cutaneo a cyanosi distabant, interdum etiam exitu, sive crisi per catameniorum fluxum, quo in puella morbum sanatum vidit ALBERTUS *Nos. Nat. I. pag. 342.*

Quaeritur, utrum morbus proVectiori demum aetate possit subnasci, quod certe diagnosin redderet magis obscuram. Ex omnibus exemplis, quae huc referuntur, pauca tantum huc attinent. Nam vitium manifesto congenitum, quale aortae ex duobus cordis ventriculis nascentis, quod crebro repperitum, hujus esse loci nemo facile sustinebit. Foramen ovale recludi posse, exempla nonnulla tes-

tantur: quamquam tum etiam superfuisse a primæ ætate hujus vitii seminium opinor: quibus enim illud accidit, ii fere debiles fuere, scrofulosi, phthisici, debili aut impedita circulatione pulmonali. Exceptionem facere videtur puer Obs. 44. verum ne in hoc quidem membrana foramen ovale tegens justæ fuisse magnitudinis dicitur, ita ut morbus pulmonum gravis sanguinis cursum turbare facilius potuerit. Obs. 48. exemplum obfert eurysmatis cordis passivi et reclusi foraminis ovalis ex morbo pulmonis. De Obs. 40. propter deficientem ætiologiam et anamnesin, judicium difficile est. Universe notandum, in talibus casibus aut ingentem terrorem, aut morbum pulmonum, aut utrumque cyanosin provocasse.

Quæ cum cyanosi complicabantur morbi, aut componebantur, ab illa non multum mutati, sæpius autem retardati sunt: quæ ipsam sequebantur hæmorrhagiæ, hydropes, diarrhœæ plerumque tragoediæ prænotabant finem.

Subinde emendari paululum visa est pubertate, aut prudente medicatione, etiam larga hæmorrhagiæ; verum levamen fallax, mors certa, sive ex alia valetudine superveniente: febre, apoplexia, hæmoptysi, peripneumonia, phthisi, sive accidentibus oedemate, hydrope, spasmo, convulsionibus, syncope, eaque aut non multo diu postquam in lucem editi sunt infantes, aut post menses aliquot, aut annuos sustulit; aut perennantes

ab altero, tertiove anno usque ad pubertatem, adultam aetatem, immo quadragesimum sextum et quinquagesimum septimum superfuerunt aetatis annum. Fertur etiam exemplum viri caerulei, qui uxorem duxerat ac liberos procreaverat, verum infirmos illos, scrofulosos ac brevis aevi. Oppressio, debilitas, frigus, paroxysmorum frequentia, magnitudo, duratio viriumque post eos restitutio prognosin definiunt.

Anatome pathologica ostendit, patuisse foramen ovale sive non rite clausum fuerit, sive reclusum denuo. Una cum hoc vitio conjungebatur vulgo aut crassities parietum ventriculi cordis dextri, aut obstaculum quoddam transeuntis sanguinis sive in ventriculo, sive in arteria pulmonali, sanguinis venosi cursum ad auriculam sinumque sinistram devocans, quo cum sanguine arterioso miscetur. In aliis cum foramine ovali etiam patuisse ductum arteriosum Botalli, superstitie circulatione foetus. In longe plurimis septum ventriculorum fuisse perforatum, sive potius non perfectum idque vulgo ad basin, ita quidem, ut arteria aorta sanguinem ex utroque ventriculo reciperet cumque hoc vitio priora illa conjungerentur sive alterutrum, sive utrumque: nec non angustia, coarctatio, aut coalitus arteriae pulmonalis. Esse ubi utraque auricula in dextrum ventriculum patebat; esse ubi utraque arteria ex sinistro ventriculo nascebatur; esse ubi arteriae illae majores una cum

his vitiis sive origine, sive decursu deflectebant; aut cor tantummodo simplex repertum est.

Ex his, quorum peculiaris explanatio ad forum pathologicum pertinet, sequitur, non tantum patuisse vias has, verum simul sanguinem venosum in sanguinem arteriosum influxisse: id quod ad cyanosin efficiendam postulatur: siquidem ab una parte numerosa prostant exempla harum viarum patentium, nullo indicio hoc vitium in vivis prodeunte et a parte altera non desunt, aut foramine ovali aut septo ventriculorum non clauso, aorta sinistrophe ventriculo contractis, arteria vero pulmonali et ventriculo dextro amplis, dextrorsum atque pulmones versum fluxisse sanguinem. Prius igitur quam morbus caeruleus fiat, aequilibrium inter circulationem utramque sublatum sit oportet, ita ut sanguis venosus arteriosum invadat, unde etiam cur a prima aetate inde non semper aequae manifesta fuerint morbi caerulei signa, explicatur.

Verum hujus loci non est, haec ulterius persequi. Animos igitur mentesque nostras ad therapeiam convertamus. Haec num aliqua sit in vitio organico, non sine caussa rogatis. Certe incurabilis vulgo morbus est. Potest tamen aliquatenus, quo minus aut fiat, aut increseat prohiberi, procurando plenum spirandi officinae exercitium, ut sic via ad pulmones libera, altera illa antiqua secludatur: quo referunt sanguinis venosi per funiculum umbilicalem caet. depletiones, quae ster-

nutationem, tussim, expectorationem concitant, frictiones cutis aromaticae calidae: verbo quae ad asphyxiam neonatorum adhibentur auxilia: morbum factum hygieine mitigare quodammodo poterit: aëre puro, sicco, calido, vestitu de lana, frictione sicca, calida, aromatica, cibo facilis solutionis, leviter roborante, aquae mineralis gazo-sae: Selteranae, Spadanae potu; alvi libera excretionem, quiete aut levissimo tantum corporis motu, spe animique hilaritate, alacritate. Obsunt vero equitatio, balnea frigida, emetica, cathartica, stimulantia, spirituosa, narcotica. Proposita a nonnullis oxygenio praedita remedia, parum bonae frugis promittunt. Paroxysmos sedare quiete, revulsione: pediluviiis, manuluviiis, balneis, interdum etiam depletionem, aquae frigidae potione, sedantisque medicinae, non sine fructu tentarunt.

Morborum cum cyanosi aut compositorum, aut complicatorum ea jure merito jubetur medicatio, qua hujus potissimum ratio habeatur. Phlegmasiarum igitur minus antiphlogistica, quam revel-lens, derivans: quandoquidem in ipsa pleuroperi-pneumonia gravi etiam leviores sanguinis detractiones ingens secuta sit virium imbecillitas (Obs. 48.). Haemorrhagiarum pariter revellens simulque adstringens: hydropum per digitalem purpuream cum lenioribus tonicis copulatam affectionumque adynamicarum per haec ipsa, eo tamen gradu modoque praescripta, ut turbando circulationem nec

cordis laesionem aggravent, neque effectu secundo augeant praesentem jam corporis debilitatem.

---

#### DE MELANOSI.

Nuper de melanosi plura scripserunt auctores potissimum Francici, postquam LAENNECCIUS ejus mentionem fecerat. Morbus est ex rarissimis, de cujus natura dissentiunt; alii ad carcinomata referunt et vitia parasitica, alii ad sanguinis dyscrasias. Hanc conjecturam allatis rationibus adstruxit celeberrimus de anatome pathologica scriptor LOBSTEIN. De qua antequam statuamus, citabimus observationem LAENNECCII priorem, siquidem altera (duas tantummodo profert) huic ipsi dubia habetur.

» Coqua, annos nata 59. boni antea corporis habitus ex aegritudine animi gravi, duobus abhinc mensibus, inciderat in hanc corporis valetudinem, quae initium fecerat a corporis universi lassitudine tanta, ut cruribus insistere non posset. Simul in cunctis musculis torporem ac stuporem sentiebat, ut decumbere cogeretur. Brevi et appetitus et somnus defecerunt, accessit alvi fluxus et vomitus atque parvi tumores nigri sub cute in multis corporis locis comparuerunt. Hi cernebantur numerosi in thorace anteriore, interpositis subinde maculis pulicum morsibus comparandis et in mammis

sibi tam propinqui erant tumores isti, ut largam facerent maculam. Etiam visebantur in abdomine, brachiis, femoribus, praesertim parte interna. Aegra versabatur in conditione ingentis debilitatis omni privata adpetitu et somno paucumque quod ceperat cibum evomebat: semper alvus fluebat, spiratio erat difficilis, tussis frequens, pulsus mollissimus, sub digito explorante facile deficiens. Hisce symptomatibus per dies sequentes persistentibus semperque incrementibus eaque aggravante oedemate universali, cutim splendore albo induente, cui magis adhuc tumorum nigredo repugnabat, occubuit aegra d. 25. Septembr. a. 1816. in Nosocomium suscepta d. 27. m. Augusti ejusdem anni (\*).

Cadaver tumores obtulit eosdem in corpore interno, qui in cute, cystide includentes substantiam aequalem nigram aut nigrescentem, alibi duriores, alibi mollem, pulposam; in textu celluloso circum vasa et glandulas lymphaticas abundabant inque glomeres convoluti nervos artuumque vasa circumda-

---

(\*) In historiis aegrotantium a CRUVEILHIERIO relatis digestio facilis, motus febrilis; nec alvi fluxus, nec anodynia constans. Universe notandum, medicos Francicos, nomen melanosium latissimo sensu sumere, ut critico opus sit iudicio, ad singulas observationes discernendas et ad suum quemque titulum revocandas.

Notabile exstat melanoseos exemplum in ALIBERT *Nosol. Natur.* Tom. I. pag. 553 sq. icone illustratum: cujus tamen aegrotantis historia deest.

baut; quae vasa sanguifera, nervis integris, cum iisdem ita confundebantur et coaluerant, ut sine ruptura secerni ab illis non possent. In ipso parenchymate glandulae thyreoideae similes tumores erant inque pulmonibus, praesertim ad basin et circum glandulas bronchiales, inter mediastina, sub pleuris, in epiploo, mesenterio et circum ipsa abdominis viscera, uno excepto hepate lardaceo, non autem fellis vesicula. Cor, cerebrum sana, neque ossa magis facile frangenda, quam aliorum qui ex morbo acuto perierant.

An apoplexia omnium fere organorum uti visum est operis Laennecciani editori? quam sententiam si amplectamur, delata magis, quam soluta quaestio est.

In observatione praeposita hepar hoc vitio carebat: quod tamen in aliis non fuit, neque alia etiam: pancreas, renes, ovaria: minus crebro in rene minusque etiam in textu erectili; in cerebro et spinae medulla nondum detectum est, auctore LOBSTEINIO, qui tamen semel vidit, supra thalamos nervorum opticatorum, in apoplectico, qui in latere sinistro, eodem quo in capite, inter cutem et musculum glutaeum magnum glandulam lymphaticam magnopere tumentem ac scirrhosam habebat, intus idem vitium includentem. In ossibus, praeter medicum Anglicum HALLIDAY, ipse vidit LOBSTEINIUS, in cadavere anus marasmo confectae, cuius tamen morbi historiam ignorasse videtur.

Morbus est inprimis senum, nec tantum homi-



num, verum animalium quoque eoque summum efficitur virium decrementum et nutritionis defectus et macies et hydrops, nunquam vero febris, quo indicio aliis juncto phthisin ex melanosi pulmonum a phthisi pulmonali propria sive tuberculosa discerni posse, existimat LOBSTEIN.

His praemissis ad eam redeamus quaestionem, quam antea proposuimus, quorsum referre oporteat melanoses, utrum ad carcinomata, quae LAENNECII, an ad dyscrasias, quae LOBSTEINII opinio est. Rationes quibus hic suam defendit, partim a sede melanosium varia, partim ab analysi chemica, partim a physiologia experimentalis traxit, quas si lubet, apud hunc auctorem invenire poteritis, neque hoc loco repetemus, cum ad forum pathologicum hanc quaestionem pertinere censeamus.

Curacionem si quaeratis, ignotam eam habetote, quam si quis vestrum poterit repperire, magnus mihi erit Apollo.

---

#### DE CORDIS EURYSMATE, HYPERTROPHIA ET VITIIS VALVULARUM.

Varia sane morborum fortuna est. Alii vix ullos nacti sunt descriptores; alii contra numerosissimos. Ex fortunatis illis morbi cordis sunt, de quibus non tantum complures monographiae sunt

editae, verum etiam illae ab artis medicae heroibus. Fortunam hanc paene nimiam dixerim, reputans eorum, qui de iis scripserunt opinionum sententiarumque discrepantias ac medicorum vulgarium errores, ubivis jam morbos cordis et videntium et oppugnantium. Sic enim comparati sunt homines, ut si res quaedam sermone crebro celebretur, in ipsam extemplo mentes cogitationesque suas figant. Nec tamen illa rei crebra usurpatio infructuosa est. Nam in luce positae et pertractatae saepius indies adcuratiorem illius notitiam comparabimus.

Est haec o Amici! cognitionum humanarum progressio, quae initio adumbratae tantum et vagae quodammodo, postea magis magisque definiuntur, circumscribuntur ac perpoliuntur denique.

Antiquiores turbatae circulationis causas a polypis solebant repetere. Ex quo autem ad anatomicum se converterunt medici, eurysmata cordis veterum polypos summovent. Verum hic nequaquam substitit medicorum anatomicorum industria, qui duo distinxerunt aneurysmatum, sive eurysmatum genera: activum et passivum, prius cordis hypertrophiam, alterum ejusdem dilatationem vocarunt notaruntque varias esse posse in variis cordis cavis eurysmatis species conjunctas, ut dextri ventriculi dilatatio sit cum sinistri ventriculi hypertrophia utque non tantum ventriculorum, sed auricularum etiam haec vitia esse, animadverterent. Hyper-

trophiae porro tres distinxerunt formas: simplicem scilicet, excentricam et concentricam, cavea hypertrophica vel eadem, vel amplificata, vel contracta. Tandem causas etiam subjecerunt: internae nempe cordis membranae inflammationem, unde tum carnis ipsius augmentum, tum valvularum indurationes, ossificationes, stricturae, quibus stricturis, novo sanguinis circulantis impedimento, musculus ille vel robore et torositate increscit, vel, quod rarius, resistendo impar dilatatur, id est aneurysma patitur sive activum, sive passivum, ita ut quae cordis irritati aut inflammati sequelae sint, novae fiant irritationis causae. Communia cordis aegri symptomata feruntur, dyspnoea, palpitantes et anhelitus sub corporis motu, somni turbati, rubores faciei primum, deinde livores, aut pallores cachectici, oedemata, leucophlegmasiae. Morbus proventus vel primo adpectu se prodere medico dicitur aegrotantis in lectulo vel extra lectulum sessione, propter decubitus vix tolerabilem, capite in pectus inclinato, vultu livido, tumente, tumentibus pariter ac liventibus labiis, artuum inferiorum oedemate, signis hydropis: ventris, pectoris, pericardii iisque ex congestione venosa variarum corporis partium: haemoptysi, vomitu, apoplexia, syncope, pulsuque ut plurimum vario et mutabili.

Vos quo in diagnosi juvem, ex particularibus historiis, quas notarunt scriptores, aliquot com-

mentabor. Habet horum morborum diagnosis difficultatis plurimum, ut neurosin cordis ab ejus vitio organico non semper ita facile discernas (\*). De hac tamen optime meruerunt recentiores eoque res perducta est, ut celeberrimus monographiae morborum cordis auctor CORVISART non tantum singulos a singulis discernere, verum etiam singulorum partium hujus visceris vitia per sua signa indicare, conatus sit.

Primo distinguenda sunt, hoc auctore, duo genera aneurysmatum: activum cum hypertrophia, passivum cum parietum tenuitate et atonia. Prius expectabitis, ubi corporis temperies sanguinea, constitutio robusta, vigor aetatis, animus fortis: alterum, ubi temperies lymphatica et cacochymica, debilis constitutio et infirmus animus; prius ex laesione acuta aut occulta cordis propter nixum, motum, coitum, cantum, tussim, pectoris inflammationem, contusionem, animi commotionem, diaetam lautam vinosam; posterius ex morbis chronicis, corporis infirmitate, animi pathemate tristi, pulmone debili. In priori facies rubra, vultuosa,

---

(\*) Difficultatem diagnosticam auget rara morbi simplicitas, frequens complicatio. Circa neurosium cordis diagnosin animadvertit BOUILLAUD (Tom. I. pag. 315. l. l.) eas vulgo componi cum aliis aliarum partium neurosibus: ventriculi, intestinorum, organorum spirandi, sensuum, cerebri, aut ab altera parte cum haematosi vitiosa: anaemia et chlorosi.

oculis rubentibus; in altero pallida, languida, interdum livida aut violacea, ex congestione venosa. In illo ictus cordis prompti, validi, manifesti, pulsus creber, durus, fortis, vibratus; in hoc ictus cordis rari, tardi, obscuri et debilis pariter pulsus interdum frequentior quidem, at mollis, obscurus. In primo genere pectus percussus edit sonum obscurum: in secundo nullum. En elegantem utriusque aneurysmatis comparisonem a CORVISARTO traditam! Quaeritur, utrum tam vera sit, quam elegans. Et primo quidem CORVISARTO praeceptorum haud semel obloquitur LAENNECCIUS discipulus. Verum hic forsitan ex nimio stethoscopii sui amore. Quapropter praestabit historias consulere, quam audire disputationes. Erunt autem illae CORVISARTI citandae et KREYSIGII praesertim, siquidem per paucae quas tradidit LAENNEC vitii sunt complicati, compositi atque eam ob causam ad hanc litem dirimendam minus idonei.

Obs. 12. CORVISARTI obtulit hypertrophiae symptomata, cujus in mortuo indicia; similiter Obs. 14, 15 et 16: in 17. non diserte morbi historia narratur; in 13. minus perspicua erant signa: verum morbus erat complicatus.

In observationibus Kreysigianis saepius nonnulla sive in aegrotante, sive in cadavere notanda desideramus. In Obs. 9. Cordis ictus dicitur tumultuosus, perturbatus, pulsum in carpo non mutans, qui semper regularis sentiebatur, at simul durus,

praesertim in brachio sinistro. Vehemens cordis ictus fuit in Obs. 10. In 13, initio vehemens, postea irregularis, intermittens, tumultuosus pariterque pulsus, qui extra paroxysmos regularis. In Obs. 15. pulsus semper creber fuisse et magnus dicitur, ictus cordis justo fortior et latus. In 17. magis parvus, quam fortis simulque undosus, obscurus, latus cordis ictus eique similis pulsus isque perquam irregularis tam roboris respectu, quam rhythmici. In Obs. 24. dixeris cor hypertrophicum fuisse, nec desideras hujus etiam vitii peculiaria symptomata. In Obs. 26. ictus cordis irregularis quidem, nec tamen palpitatio manifesta, pulsu etiam nunc irregulari, qui antea celer et durus: erat autem polypus in utroque corde. Symptomata cordis hypertrophici quoque non deerant in observationibus virorum doctorum KOBERWEIN et WOLFF, notatis pag. 202 et 505. Tom. III. monographiae Kreysigianae. Haec testantur universe veraces esse notas aneurysmatis cordis activi: quemadmodum a parte altera veraces quoque sunt notae passivi aneurysmatis. Monendum tamen crebro aneurysma activum unius cum passivo alterius cordis jungi, nec deesse exempla ossificationum in valvulis et arteriis, quibus ut circulatio, ita symptomata mutantur oportet.

Notetis, ex ventriculo dextro graviora esse vulgo laesae respirationis et sanguificationis sym-

ptomata et promptiorem hydropem et mortem propter sanguinem alteratum.

Jam mecum pervolvite descriptas aneurysmatis passivi historias. In fabro ferrario (Obs. 18.) **CONVISARTI** facies pallida, tumidula, respiratio sublimis, parva, impedita, pectus non resonans, hydrops, pulsus debilis, parvus, frequens ac peculiaris in cordis regione tumultus dilatationem ejusdem indicabant et stricturam orificii aortae. In Obs. 19. quae sequitur, constitutio robusta cordisque ictus celeres et lati, pulsus creber, irregularis et fugax in dextro carpo, in sinistro sensum omnem subterfugiens, sed simul faciei pallor, loquelae difficultas, decubitus in utrumlibet latus, oedemata, pervigilium, tussis cum dolore cruenta. Obs. 20. exemplum obfert aneurysmatis passivi ventriculi cordis sinistri, a quo pulmo hujus lateris retropulsus et graves respirationis et circulationis noxae, quae graviores etiam in coquo observationis sequentis, cui ventriculus dexter cordis dilatatus erat.

Apud **KREYSIG** alias magis, alias minus manifesta fuere symptomata. In Obs. 14. dilatationis sive aneurysmatis passivi erant signa cadaveris reclusionis confirmata eamque causae propriae praecesserant. In Obs. 18. non exacte describitur cordis vitium. In Obs. 25. ictus cordis vehementes adeo, ut non tantum cernerentur manumque impositam tollerent, verum etiam audirentur, cordis aneurysmate passivo existente, Non defuerunt igitur re-

gularum exceptiones, neque immerito de signorum constantia dubitarunt LAENNEC et ANDRAL.

Jam videamus, quid de diagnosi variarum partium cordis aegrotantium sit statuendum. LANCISIO auctore signum certum dilatati ventriculi dextri est pulsatio venae jugularis, consentiente LAENNECCIO, negante CORVISARTO, qui graviora esse a parte pulmonis symptomata: anhelitum, haemoptysin, livorem, aut colorem nigrescentem faciei et promptiorem hydropem in hac specie contendit. Talia fuere symptomata in Obs. 15. CORVISARTI aneurysmatis activi et in Obs. 14. KREYSIGII aneurysmatis passivi cordis ventriculi dextri. Certius tamen esse signum ex sono magno (*bruyant*) cordis explorati ad partem inferiorem sterni, docet LAENNEC in hypertrophia, in dilatatione vero ex tumore venarum jugularium. Signa denique auricularum affectarum infida esse, auctorum observationes testantur. Erant autem vulgo cum valvularum vitiis et orificiorum stricturis complicata. Nec pulsibus semper credendum in cordis aneurysmate docet, observatio 26. clar. KREYSIG, rem confirmante ANDRALLIO, qui neque ab orificii aortici strictura repeti tuto pulsum irregularem, observat. Denique hypertrophiam cordis sinistri apoplexiam facere atque ex aneurysmate congestiones fieri venosas et subinde gangraenam crurum, variorum auctorum animadversio est.

Haec erat fere cognitionum summa de cordis



aneurysmatibus ea aetate, quae nostram hanc proximè antecessit quaeque debentur medicis excellentibus SENAC, CORVISART, LAENNEC, TESTA, KREYSIG: quos secuti sunt BERTIN et BOUILLAUD, de quorum laboribus nunc referre breviter oportet.

Et BERTIN quidem, illius distinctionis auctor est, de qua breviter diximus, in hypertrophiam cordis simplicem, excentricam et concentricam. BOUILLAUD vero ipsam repetit ab inflammatione membranae cordis internae, sive endocarditide chronica. In observationibus hypertrophiae morbum hunc illustravit. Prima (Obs. 113.) senis est, apoplexia sanguinea interempti, nato ex cordis sinistri hypertrophia, in habitu corporis apoplectico. Erat pulsus magnus, fortis, paullo crebrior, ictus cordis praecipue sinistri validus, ictuum sono circumscripto, obscuro: aberant signa congestionis venosae, quia cum hypertrophia nullum erat sanguinis impetuosius moti obstaculum, aut impedimentum.

Sequens observatio cum hypertrophia excentrica (aneurysmate activo auctorum) obferebat aneurysma aortae. Obs. 115. (BERTINI est) natae hypertrophiae excentricae ex rheumatismo articularum acuto in juvene est. Erant cordis ictus validi, pulsus vibratorius. In Obs. 116. mallei ictibus comparantur cordis pulsationes feminae ferme octogenariae Obs. 117. obfert symptomata vitii cordis dextri, sinistro quamvis hypertrophico, verum cor ingens et pectoris hydrops ambos pulmones valde

compresserant. In Obs. 118. cum morbo cerebri; in seq. cum morbo pectoris, fuit hypertrophia cordis sinistri concentrica. Obs. 120. (a BERTINO ducta) hypertrophiae cordis dextri ea monstrat symptomata, quae hujus aneurysmati activo adsignaverat CORVISART, dyspnoeam, haemoptysin, congestiones venosas, oedemata caet. nec dispar Obs. 121. ratio est, in qua tamen neque sinister ventriculus vitio caruit. Hypertrophiae concentricae cordis dextri cum peripneumonia exemplum est in Obs. 124. Sq. hypertrophiae generalis, sive plurium cavorum sunt casus, in quibus alia simul valvularum aortae vitia; nec visa atque reperta in cadavere semper symptomata in vivo interpretabantur. Neque etiam ubivis adnotata invenio hypertrophiae signa characteristic: auctam vim ictuum cordis, pectus non resonans ac protuberans, quae consignaverat auctor. Duas praeterea habet observationes dilatationis: altera in constitutione lymphatica cordis sinistri praesertim, dextri altera in diathesi scorbutica.

Caussarum in numero ponuntur motus corporis nimii, nixus vehementior, saltatio, cantus, coitus, tussis, aromata, spirituosa, affectus animi, rheumatismus, arthritis, morbi pectoris, pulmonum, prava thoracis structura, morbi abdominis, haemorrhoides, suppressa catamenia, morbi cutanei, denique ipsius cordis neuroses hujusque congenita symmetriae vitia. Auctore BOUILLAUD nulla est potentia nocens,

quae aliquando caussa aegritudinis cordis fieri non possit remque tum ex cordis officio ac munere multiplici, tum ex arcto illius consensu cum aliis partibus explicat. Is redarguit praeceptorem CORVISART, quod nimium tribuerit caussis moralibus, ipse culpandus, quod nimium tribuerit caussis physicis, atmosphaericis. Ipse intelligens quae de inflammatoria horum vitiorum origine statuerat, non in omnes casus convenire, duas fecit eorum classes: alteram laesionum mechanicarum: dynamicarum, organicarum alteram.

An morbus sanari potest? Si reputetis, esse vitium organicum, in parte nobili, prae omnibus ad vitam sustentandam maxime necessaria, adsentiamini CORVISARTO, prognosin infaustam edenti. Et sane sinistrum eventum praevidentes ac praedicentes prudens edetis prognosticon, quod summo nititur calculo probabilitatis. Attamen CORVISARTI sententiam limitavit ac mitigavit BOVILLAUD; atque revera unus alterve aeger e tanto periculo evasisse legitur.

Citat Celeb. KREYSIG duo exempla ex ALBERTINO, feminarum ex corde aegrotantium, quibus opem tulit natura: prius matronae, quae cum hoc vitio consenuerat; alterum juvenulae nobilis, cui morbus summopere increverat primo, sensim decreverat dein atque remiserat, adeo ut biennium satis fortunate viveret; cui tertium GUATTANI adjecit, cui post obitum aneurysmate cordis sinistri, ossi-

ficatione valvularum semilunarium ipsiusque aortae destructione et ruptura valvularum mitralium et trabecularum carnearum repertis, contigit septennium degere et satis bene valere suisque officiis fungi, cum antea multa mala passus erat idque prudenti vitae generis instituto. Jure igitur summo vir cl. KREYSIG in therapeia exponenda ante omnia laudat animi corporisque quietem ac levem diactam atque ejusmodi victum, quo sanguinis crasis aut servari aut emendari naturaeque conamina moveri sustentarique possint: quo nomine ex fonte therapeutico ossificationis processui adversa ei habentur mercurius et alcalia fixa.

Aneurysma activum antiphlogisticam requirit ac refrigerantem medendi rationem, quae quantum valeat, docuere exemplo illustri magni duumviri ALBERTINUS et VALSALVA. Rem more suo narrat horum discipulus MORGAGNUS *Epist. Anat. Med.* XVII. art. 30. » Antequam scribendi finem facio de aneurysmatibus, a VALSALVA multo saepius, quam credidisset, per anatomen in arteria aorta deprehensis, committendum mihi non esse intelligo, ut silentio id prorsus dissimulem, quod tanta exitialis morbi frequentia permotus cogitare coepit, nimirum ut ipsi inter initia occurrendo incrementum progressumque interciperet. Occurrendi ratio illa est ab ejus studiorum socio HIPPOLYTO FRANCISCO ALBERTINO vulgata, quam si perlegeris, continuo mecum existimabis, neminem alium facile existitis.

ae qui tam severa diligentia exsecutus sit, quod HIPPOCRATES olim in venarum internarum varicibus in hunc modum praeceperat: conducit autem talibus, si ab initio curandos suscipies, ut et venae de manibus sanguinem emittant et diaeta, e qua quam siccissimus et exsanguissimus fiat. Sed tantae severitati par utilitas respondit. Nam quod HIPPOCRATES subiecit: si curentur incipiente morbo rursus in loco venae considunt ad latus humilesque fiunt, idem prorsus ab eadem curatione, in tempore adhibita ipsis quoque accidit arteriis. Neque hoc VALSALVA ex pulsationis duntaxat caeterorumque signorum discessione intellexit, quae aneurysma incipiens comitantur, sed et ipsis oculis usurpavit. Cum enim vir nobilis, quem sic persanaverat, ex alio postea morbo forte interiisset, arteriam, in qua olim aneurysmatis initium fuerat, contractam rursus ad naturalem modum, sed quasi callosam eo loco deprehendit. Hoc quidem ut multa alia annis illis posterioribus VALSALVA scribere praetermisit: cum aliis tamen communicavit ac nominatim cum praestanti medico spectataeque siquis alius fidei viro, JOANNI ANTONIO STANCARIO, a quo ipse, cum A. 1728. Bononia transirem id et quae subijciam, accepi. Scilicet misso, quantum oportebat, sanguine factisque caeteris, quae postea scripsit ALBERTINUS, cibum potumque VALSALVAM magis magisque in dies singulos imminuere consuevisse, usque dum eo perveniret, ut pul-

lis selibram mane daret, vespere autem dimidio minus, neque aliud praeterea, si aquam excipias, et hanc quoque intra certum pondus, quam aut gelu, ut vocant, cydoniorum, aut lapide osteocolla medicabat in tenuissimum pulverem comminuto. Ubi satis aegrum hac ratione macerasset, ut prae imbecillitate vix e lectulo, in quo ipso praecipiente, jam inde a principio decumbebat, manum attollendi facultatem haberet, paulatim in dies singulos alimentum auxisse, donec rediissent necessariae ad surgendum vires. Hoc autem addebat STANCARIUS, ut qui ipse quoque juniorem monacham eadem ratione usus, feliciter percurasset, primis illis, quibus sic curati surgere incipiunt diebus, pulsationem redire, sed terrere non oportere: neque enim illam perstare, imo demum omnino evanescere, neque amplius reverti, nisi forte homines nolint se intra moderatas vivendi leges continere. Juveni enim doctori, qui id noluit, frustra ea curandi norma VALSALVAM antea pulsationem abstulisse; hanc enim reversam iterum et cum ea morbum hominem denique confecisse."

( Duo in hanc historiam notanda habeo: alterum fuisse aortae quidem aneurysma hoc pacto curatum, quod facile tamen ad simile cordis vitium transferri potest, alterum ex MORGAGNI animadversione, fore plures quibus multo gravior VALSALVAE curatio, quam aneurysma videatur, eo praesertim tempore, quo illa utilis esse

pōsset, longe aliter sensuros, cum eo res deducta fuerit, ut neque gravissimae adsiduaeque molestiae, neque mors ipsa in singulas horas impendens ullo amplius praesidio vitari queant. Duobus hisce tertium addam CORVISARTI monitum, convenire hanc curandi methodum in solo genere activo ejusque periodo prima tantum: esse autem huic adfinem derivantem a MORGAGNO cum successu adhibitam, per manuluvia calida scilicet, quae quamvis non tam curativa, quam palliativa dici mereatur, tamen ad levandos angores sedandasque cordis palpitantis turbas, non aliam facile hac efficaciorē experiemini.

Sanguinis copiam minuere, cordis motum retardare prima medici cura esse debet: alterum victu tenui, parco, aut si hic non sufficiat, cauta prudenterque repetita sanguinis detractio: alterum quiete et animi et corporis. Cauta et prudenti sanguinis detractio in hoc de quo dicimus genere activo idque initio, antequam hydrops factus sit et fractae corporis vires, cavendo simul, ne in syncopen incidant aegri, ex nimia scilicet sanguinis jactura: quamobrem depletio parva sit, aut topica, quarta aut sexta quavis hebdomade iteranda, praesertim florente arteriarum vita, tempore verno, aegro sanguineo, hirudinibus, suppresso haemorrhoidum, catameniorum fluxu, ad anum, femora admotis. Alvus praeterea enematibus ducenda aut solvenda eccoproticis refrigerantibus.

Extus in cute excitanda inflammatio, ulceratio est, per epispastica, fonticulos, setacea, non tantum, ubi rheumatismus, arthritis, exanthema praecesserint, sed ad internam vegetationem antagonistica secretionem inhibendam (Cf. ZACUTUS LUSTANUS, lib. I. Obs. 133. *Prax. Hist.* lib. VIII. Obs. 30.). Intus vero praebenda julapia refrigerantia: nitrum, pulv. salin. compos., sim. quibus etiam phlogistica sanguinis crasis emendabitur.

Tandem peculiaris fol. herb. digitalis purpureae virtus celebranda est, qua irritabilitatem cordis obtundere ejusque ictus retardare animadvertitur. Aliorum testimonia colligens cel. KRETSIG ad suam experientiam quoque provocat in multis hydrothoracis casibus hoc titulo profuisse ostendit hujusque remedii efficacitatem comparat ei chinae chinae in febribus intermittentibus: quam adeo constantem in altera morbi periodo expertus est, ut audacter aegrotis promiserit, ipsos se jam altera nocte ab usu remedii dormituros idque revera ita eveniret. Simul tamen hortatur, ne antequam laxatus sit corporis habitus et genus vasorum, hanc medicinam praescribamus, quam vi quadam tonica prodesse et vasorum genus roborare existimat. Eam ut edat, nec nimia dosi, nec crebro nimis dare jubet. Nimirum gr. 1 — 2. pulv. 10 gtt. tincturae  $\frac{1}{2}$  gr. extr. aquos. cochl. decocti dr. i. ex unc. viii. ad col. unc. iv. 3, 4, dd. aut emendata aegri conditione 2 dd., ita quidem, ut ingruentibus paroxysmis 8 aut 14



dies, aut usque ad symptomatum remissionem notabilem eo utantur aegri, sensim decrescendo; tum seponatur atque nova nascente exacerbatione, ad eam recurratur: porro succrescente hydropse ac ubicunque vires cordis arteriarumque insigniter decrescunt. Interea temporis, ubi vitio organico recta via occurrere non licet, hujus in corpus noxas tollere functionumque aequilibrium restituere medicum oportet, concoctionem scil. emendando caet. quo facto, vita diu sustentari, eodem auctore, feliciter poterit.

In passivo genere magis tonica remedia prodeunt, quibus praeter digitalem cel. KREYSIG adnumerat in hoc, quod volumus, vitio ferrum et alumen. Illud antiquioribus probe cognitum fuisse docet citatque erudit. SENAC lib. IV. cap. XI. pag. 17. cui consilio maxime adcommodatae sunt: tart. ferri solub. tinct. mart. aper. ac thermae martiales: aquae Driburgenses, laudante JAHNIO, potissimum ubi constitutio chlorotica. Martialia tamen, quia requirunt corporis motum, quem hi aegrotantes ferre nequeunt, crebrior erit aluminis aut amarificantium remediorum praebendorum opportunitas, inter quae miror non recensita esse acida mineralia, a quibus curationis tonicae initium utiliter fieri poterit.

Quae circa usum succorum herbarum recentium, tempore vernali, seri lactis, tempore aestivo, uvarum, autumno, nec non thermarum Carolinarum et

aquae Selteranae in genere activo et circa usum nutrientium: cocciolatae, juris carniū, lactis cum aquis mineralibus martialibus is, quem dicebamus, auctor, praecepit, ea legisse apud eum non pigebit: quoniam vero de plerisque proprias observationes non citat, neque mihi usu sunt comprobata, ea vobis commendare vereor, deque nonnullis dubito, ac nominatim de tepidis balneis saponaceis, ad absorptionem concitandam laudatis, de cocciolata ad nutriendum; quae in hoc morbi genere dubia atque suspecta habeo. Ab his hujus auctoris monitis haud uno in loco deflectit LAENNEC. Nam in hypertrophia commendans methodum VALSALVAE et ALBERTINI: venaesectionem et diaetam hydrope et cachexia corporis neutiquam vetari contendit, immo diuretica nunquam esse efficaciora, quam post venam sectam. De digitalis virtute minus magnifice sentit (ipsam contra defendente consobrino) atque diureticis antepōnit cathartica. In dilatatione etiam cum hypertrophia in venaesectione facienda cautionem praecipit laudatque amara et martialia et acet. plumbi sive saccharum saturni, quod saepe quidem utile expertus est, nunquam vero remedium heroicum.

Digitalem pulsus retardasse notabiliter, potissimum illius infusionem sive per os, sive per anum ingestum observavit ANDRAL eamque indicari in hypertrophia, contraindicari vero in dilatatione arbitratur.

Bouillaud denique digitalem, quam praecipue methodo endermica proficuum censet, cordis opium vocat.

Ecce testimonia testimoniis repugnantia eaque testium quidem et peritissimorum et fidissimorum! Quae quo pacto conciliabimus ignoro, nisi consulamus ipsas aegrotantium historias.

Pharmaceuta obs. 26. CORVISARTI nobis primum obfert exemplum sanationis, quamvis symptomata gravia minari videbantur vitium cordis organicum. Hic juvenis enim temperiei biliosae, ex animi acritudine prehenditur cordis palpitationibus vehementibus ictibusque in cordis regione anomalis magnaque spirandi molestia. In Nosocomium venerat facie extenuata, paullisper flavescente, oculis languidis, ore pravo, linguae postrema parte subflava, spiratione sublimi, difficili. Cor crebro et fortiter pulsabat, ictibus validis, anomalis, pulsus durus, vibratus, regularis tamen, pectus percussum resonabat, aliquis in hypochondrio dextro dolor. Metui cordis vitii organici successit spes, ex simplici affectione spastica provenire symptomata morbi; affectio non admodum chronica (quinque mensium tamen) sensus in hepatis regione, cutis flavedo hanc spem fovebant et in hunc finem dirigendo artem praescriptis demulcentibus, antispasmodicis et quovis quarto die venae sectione, sedando animum, tam prompta secuta est sanatio, ut post secundam ab ingressu in Nosocomium hebdoma-

dem aeger egredi potuerit, prospere valens et vigenus.

An ex neurosi phlogosis et vitium organicum natum fuisset? Equidem nullus dubito.

Methodi VALSALVAE salubritatem in cordis hypertrophia exemplo notabili probavit LAENNEC. » Monacha 50 ann. cui a 3 aut 5 annis catamenia substituerant, duodecim annos gravia patiebatur cordis aegritudinis symptomata: palpitationes validas, crebras, oppressionem, anhelitum, subitaneam ex somno excitationem, oedema pedum, liventibus genis, naso, labris. Imprimis ab anno inde haec symptomata increscebant, ut sine metu suffocationis surgere ex sella fere nequiret aegra.

In hac conditione versanti proponitur VALSALVAE methodus. Accipitur. Continuo victus ad quartam partem minuitur, detrahitur sanguis altera quaque hebdomade. Inde primo levamen, tum sexto fere mense symptomatum omnium ablatio, sola superstitie debilitate, vix tamen majori, quam ante curationis initium. Spiratio libera. Nullae palpitationes, nulla oedemata, nullae ex somno excitationes, nulli denique in facie livores. Sanguis primo ex longo tantum intervallo, deinde nullus detractus. Pedetentim ad victum pristinum factus est recursus: minor longe cibi quam prius necessitas. Exacto biennio in optima valetudine, cholera invadit intra paucas horas lethalis, cum convalescere jam et obdormiscere inter gratulationes

adstantium videretur. Cor longe minus quam ea aetate eaque corporis statura expectasses, aspectu rugoso, rugis praesertim longitudinalibus, parietibus laxioribus, nec tamen emollitis insigniter, crassitudine non multa eaque, quae cavorum capacitati responderet.

Quid exquisitum valeat exactumque vitae regimen, testatur exemplum Guattanianum, supra a nobis post KREYSIGIUM citatum.

Herbae digitalis purpureae efficacitatem manifestant observ. 14, 15, 16, 17. Kreysigianae: prima matris familias senescentis quae hac medicina per quatuor septimanas continuas a paroxysmis liberata est nocturnis: nec tamen juvit, malo sub hyemem exacerbato. Quae sequitur observatio hypertrophiae cordis est in viro seniori, cui tantopere profuit, ut sanatum familiares crederent ipseque credidisset medicus, nisi aegrotantis inter loquendum agendumque agitatio ac sudor in vultu mentem perculissent. Postea, quod miror, alia minus adposita remedia praescripta, ex calidioribus antispasmodicis, quae procul dubio nocuerunt, dum perspicua erant in pericardio, corde, aorta, inflammationis indicia.

Seni aulico (obs. 16.) pariter alteram jam noctem adeo levem fecerat ac commodam, ut tam celeris rerum mutatio medici alterius amici moveret admirationem. Exinde podagrae paroxysmo invadente multum quidem emendata anxietas nocturna, nec sublatae tamen circulationis turbae, ex quibus

periit aeger, post iter dissuadente medico susceptum.

Vir nobilis obs. 17. parem expertus est infus. digitalis cum extractis lenioribusque salinis virtutem, rem mirante KREYSIGIO; verum Januario mense pristina rediere mala, sive ex aëre hyberno, sive ex vitae genere: neque itinere ad thermas Egerenses earumque usu, a quibus nihil boni praedixerat medicus, emendata, in hoc dum versaretur loco aegrum derepente nec opinato sustulerunt. In cadavere cor inventum est hypertrophicum.

Itaque in hisce observationibus, quibus etiam sequens 18 adjungi posset, levamen quidem notabile a remedio, nec tamen sanatio impetrari potuit. Quocirca ad alios nos convertamus et quidem ad ANDRALLIUM. Is manifesto pulsum a digitali tardiolem fieri observavit, ut intra paucos dies a nonaginta pulsibus ad quinquaginta, quadraginta, immo triginta descenderit atque aegrotantis exemplum memorat, cujus pulsus a 72 pulsibus intra horae minutum primum altera jam die ad 58, sensimque ad 50, 48, 43, 40, 36, 32. deveniebant. Ex variis ejus parandae modis infusionem habet efficacissimam, sive ori sive ano ingestam. In pulvere aut forma pilularum major dosis requiri ei videtur omniumque minime conspicua virtus extracti atque tincturae; vomitum crebro ciet, etiam per intestinum rectum ingesta: quem eapropter non a ventriculo inflammato, sed a nervis turbatis repe-

tit ac tum potissimum fieri pulsum tardiozem, ubi vomitum ac nauseam concitat digitalis cumque hac pulsum tarditate etiam insignem esse ejusdem irregularitatem. In febre ab ea pulsum non mutari inque sola cordis hypertrophia indicari. Debere tamen cognosci pulsum frequentiam; esse homines, quorum pulsus tardissimus (triginta numeraverat in viro 55 annos nato) immo via per aortam impedita longe rariores esse posse arteriarum, quam cordis ictus: remque sequenti exemplo probat, quod etiam sanationis spontaneae exemplum est. Agaso aetat. ann. 46 ante biennium dyspnoeam patitur ac saepe pedum oedemata: nunc orthopnoeam, vultu violaceo, ascitem, anasarcam, tussim molestissimam. Cordis pulsationum rhythmus anomalus, pulsus saepe octava demum aut decima ventriculi contractione pulsans tumque vel una, vel duabus, vel tribus pulsationibus sequentibus; noctes extra lectulum transegit asphycticus. Post quatuor dies spiratio liberior, hydrops cito decrescens: urinae copiosae, quae prius parcae; ac quo minor dyspnoea, eo melior pulsus, semper tamen ratione ictuum cordis rarissimus, ut 30 aut 40 pulsibus arteriarum responderent 120 ictus cordis. Per 14, qui sequebantur, dies symptomata cordis aegri pedetentim disparuerunt; spiratio faciliior, facies naturalis, nullum hydropis vestigium, tandem pulsus cordis pulsationi isochronus uterque tamen

nequaquam regularis. Aeger qui sibi sanus videbatur, discessit.

: Docent quae citavimus observationes, insigne quidem levamen attulisse digitalem, nec tamen perpetuum illud, aut constans. Juvaret forsitan antiplastica: nitrum, sal. ammoniac. mercur. dulc. addere: cum hoc remedio tamen caute mercandum, propter imperfectam a morbo praecipue diuturniore haematosin. Cavete autem, credatis, nunquam morbum digitali fuisse sanatum. Crebro administrandi ratio non satis efficax culpanda erit. Rem doceat haec morbi historia, ab operis Laennecciani editore in nota adjecta. Agricola 46 annos natus, jam decimo mense anhelus, cui eapropter multum sanguinis per venaesectiones et hirudines detractum erat, nihilominus dyspnoeam continuo increocere sibi sensit, ut aeger non nisi sedens et corpore multum incurvato aërem haurire posset. Vultus et crura ex aquis tumebant, praecordiorum sonus obtusus, cordis ictus turbulenti, validi, ad claviculas usque resonabant. Praescripta a medico infus. aq. digitalis vasculum mane et vespere, pilulae extr. digit. et lactuc. viros. ãã gr. i. omni bihorio et tinctura digitalis artubus infricanda oedematosi, eo cum eventu, ut die abhinc quinto hydrops fere evanisset, dyspnoea decrevisset, ictus cordis turbulenti esse desiissent et distingui possent contractiones ventriculorum a contractionibus auricularum, quae prius non poterant. Vix mense ex-



acto nulla hydropis nota cordisque ictus praecordii regione circumscripti: manifesto indicio volumen organi aegrotantis decrementum fecisse insigne. Haec sanatio deinceps eventu fuit confirmata.

Saepenumero purgantia diureticis antecellere auctor est LAENNEC, neque cito nimis de aegrorum salute desperandum esse: quod ipsi evererat CORVISARTO, medico certe nequaquam timido. Hic notarium curans ex familiaribus jam plures annos ex corde aegrum et nunc hydropicum, adversus quae venaesectiones, diuretica et cathartica quaedam inutiliter adhibita cum essent, mortem brevi futuram praedixit CORVISART. Aliquot diebus abhinc apud eos agyrtae cujusdam miraculosae celebrantur hydropis curationes. Hominem ex taberna arcessunt, qui aegro drasticum pulverem ex vini spiritu potandum propinat: qua potione alvus vicesies evacuata urinaeque copiosiores factae sunt eaque quotidie per septimanam et quod excurrit repetita, indies magis profuit et diathesin serosam sustulit penitus, ut aeger ex eo tempore decem annos vitam vixerit satis vitalem.

Aqua laurocerasi, acidum hydrocyanicum remedia incerta LAENNECIO habentur mihique etiam in ea, de qua dicimus cordis aegritudine minus apta videntur. Hujus lethalem eventum in Scotia nuper animadversum notat is, quem modo laudabam, vir celeberrimus.

Dilatationi cordis adversa creduntur amara et martialia, quibuscum nonnulli digitalem purpuream copulare praecipiunt. De his vero dicere veritat deficiens observationum numerus, quem complere demum posteritatis experientia poterit.

Interim verbulo notandum, aquas Driburgenses JAHNII aegro (HUFEL. *Journ.* B. XXIII St. III. pag. 72 sqq.) profuisse plurimum, unde et paroxysmi perquam mitigati et vires notabiliter auctae sunt.

---

#### ANEURYSMATA AORTAE.

Plures casus aneurysmatum aortae notavit MORAGNUS, tum a VALSALVA praeceptore, tum a semet ipso animadversos. Ex primis, qui observavit, magnus fuit VESALIUS, ea secutus, quae in exterioribus aneurysmatibus antea deprehenderat. Signa in aliis alia, perquam dubia habet LAENNEC. eaque fere, quae a vicinarum partium pressione fiunt. In sene (VALSALVAE est) septuagenario dolores gravantes in sinistra thoracis parte a flatuum eruptione dumtaxat mitescentes, molesta tussis. In concitatori motu gravis spiratio, thoracis dolor, aliquando etiam cordis palpitatio. Tandem animi deliquium, copiosum sanguinis sputum, gravissima respiratio cum stertore, pulsus debilis, rarus, durus, vibratus, raro inaequalis.

Recrudescunt symptomata, donec stertore et spuito desinentibus, ore hianti moritur. Arteria magna a corde ad diaphragma in enorme dilatata aneurysma, juxta thoracis vertebrae 4 et 5, cui tenaciter adhaerebat, disruptum.

In rhedario [difficultas spirandi a motu ingravescens non sine quodam cordis angore. In jugulo et temporibus arteriae saliebant, pulsus durus, rarus, vibratus. Decubitus in utrumlibet latus. Ultimis vitae diebus animo saepius defecit atque facies intumuit.

Vir 50 ann. natus, laudabili corporis constitutione, queritur de gravi respiratione a violentiori praesertim motu, in sinistra juguli parte tumor durus, paulatim auctus. Labentibus viribus febricula, pulsus aliquando celer et durus, aliquando inaequalis, capitis dolor, subdelirium. Respirationo vitiata cum stertore, vox feminea. Thoracis aliquis dolor, difficilis, immo impedita deglutitio, facie ac capite rubente; mors.

Eadem symptomata fere in altero viro quinquagenario et in muliere sexagenaria et in Antonio Ferrarino, cui paroxysmi remittebant, ut in hystericis et in tubicine, accedente ad spirandi difficultatem deglutiendi molestia, propter aneurysma arcus aortae asperam arteriam et gulam comprimens et in Bellunensi viro et in anu octogenaria et in viro inque muliere, illius pulsu vehementi, vibrato, praesertim sinistro; hujus pulsu in carpo

nullo; illius aorta a corde ad emulgentes arterias dilatata, ossea; hujus corde duro, magno, hypertrophico, dilatata aorta, ab ortu ad arterias intercostales usque, quae indicia ostendit proximae in os mutationis: qualia etiam exhibuit alterius subclaviae initium. Eadem fuere quoque in Marchione du Palais apud SENACIUM, inter quae et illud, ut jacere non posset, curvato autem ad anteriora corpore sedere cogeretur.

Par ratio est symptomatumque significatio in obs. CORVISARTI, LAENNECCII, BERTINI, aliaque in aliis ex partium pressione, aut circulationis impedimento hisce juncta: in lapidario dolor humeri brachiique stupor: in aliis suffocatio, ex trachea compressa: in aliis sputa cruenta; in aliis symptomata comatosa, apoplectica, aut paraplegia, destructis corporibus vertebrarum ac tumore ipsum canalem vertebralem comprimente, aut dolores capitis, pectoris, lumborum caet. pulsibus saepe vibratis, saepe inaequalibus, in utroque brachio, aut irregularibus, anomalis, interdum naturalium similibus, tumore pulsante, aut pulsatione in quodam corporis loco: in pectore, abdomine illiusque percussi sonus obtusus, hujusque viscerum ex tumore premente laesio multiplex.

An haec signa certa huicque vitio peculiaria? Negat LAENNECCIUS, neque immerito animadvertit, nisi extus tumeat, ejus indicia organorum vicinorum compressionem aut mutationem denotare,

neque stethoscopium aut percussionem indubia dare: nonnullis contra sonum percussionis obscurum ictusque simplices auscultatos semper morbum patefacere, contententibus.

Quodsi LAENNECCII cogito auscultandi peritiam, magis inclinatur animus in hujus dubitandi modestiam, quam in aliorum adfirmandi temeritatem.

Difficilior erit diagnosi, quo major morbi complicatio: quas tamen rei difficultates vincere aliquando poterit repetitum examen et accurata causarum, habitus corporis omnisque vitae aegrotantis cognitio.

Morbum cognitum infausta sequatur praesensio summi vitae discriminis mortisque inopinae, cui prudens respondeat regimen vitae medendique consilium, ad sanguinis impetum refraenandum cursumque moderandum inprimis idoneum: ad quod quae faciant sive diactetica, sive therapeutica auxilia et in cordis aneurysmate exponendo et in tradenda curatione antiphlogistica, docuimus.

Ex recentioribus Cff. BERTIN *Traité des Maladies du Cœur et des gros Vaisseaux, redigé par* J. BOUILLAUD, Paris 1824. et J. HOPE *a Treatise on the diseases of the Heart and great Vessels* 2 Edit, Lond. 1835; quorum ille auscultando posse dignosci aortae aneurysma contra LAENNECCIUM defendit hujusque vitii principium esse aortitidem sive aortae inflammationem, opinatur: hic de singulis signis eorumque fallaciis copiose disputat in *Lib. II. Pars I.*

que iis, quae physica dicuntur, summam fidem habet: nobis tamen, analytico examini rem subiectis, non plane omnem scrupulum exemit.

---

### DE BLENNORRHOEIS, SIVE MUCI PROFLUVIIS.

Est quoddam in corpore systema membranarum mucosarum, cum cutaneo systemate cohaerens ei-que adfine, quod et digestionis et respirationis et secretionis et generationis officinas intus investit, tamquam cutis interna, in recondita viscerum penetralia pertinens. Hujus systematis ab una parte cum cute, ab altera cum rebus externis quamplurimis multiplici vinculo juncti, crebrae sunt aegrotandi opportunitates et aegritudinum vicissitudines, morbo ab una ad alteram sedem migrante. Exemplo sint muci profluvia chronica, sive blennorrhoeae, quorum multa jam antea commemoravimus, de coryza, catarrhis variis morboque mucoso verba facientes, alia commemorabimus deinceps, ubi de urinarum ac generationis officina hujusque morbis sermonem habebimus. Illud dumtaxat hoc loco monendum, non ita crebro, ac quidem credit medicorum vulgus, ab atonia esse haec muci profluvia mihi que longe minus probari HAASII, quam REILLI sententiam: vid. auctam secretionem

indicare sanguinis congestionem et auctam partis actionem, neque dubito, quin mihi adsentiamini, postquam hujus argumenta cum ea, quâ gaudeamus, physiologiae et pathologiae cognitione comparaveritis; cui, si meam experientiam, satis longam illam et crebro repetitam, citare liceat, prae-  
 eticum etiam argumentum theoreticis illis accedet. Tunc enim ejusmodi blennorrhoeis, in patria nostra humida frigida tam crebris tamque pertinacibus, feliciter mederi mihi contigit, quum ad irritationis causas: catarrhales, rheumaticas, gastricas, serofulosas, arthriticas, scirrhasas mentem advertissem: dum contra vulgari inhaerens atoniae, debilitatis, laxitatis opinioni non multum profeceram. Ego autem perquirens, quamobrem pergat medicorum vulgus atoniam accusare et tonica praescribere, utut tam parvus sit hujus curationis successus, eam mihi videor rei reperisse interpretationem, quod in morbi pertinaciam, vivendi genus, clima patriae culpam conjicere, quam de sua ipsi arte dubitare maluerint. Neque nego, interdum tonicis, adstringentibus, stimulantibus rem succedere; verum illud longe alio modo, quam illi explico talemque medicationem non omni periculo carere, arbitror.

Quodsi jam contemplemini late patentem hanc mucii officinam ejusque ad tuendam oeconomiae salutem servandumque partium aequilibrium dignitatem, mente complecti poteritis, quanti sit, bene

perspectum habuisse hunc disciplinae pathologicae locum. Saepe cutis externa ejusque functio accusanda, saepe cutis interna, intestinalis, sordibus immunda, saepe cachexia quaedam: scrofulosa, syphilitica, arthritica, canerosa, saepe emunctorii: setacei, fonticuli vice fungitur blennorrhoea jamque habitualis facta est; quae omnia ponderare adcurate oportet, priusquam manum operi admoveatis. Nimirum blennorrhoeam sistere, crebro nihil aliud est, quam symptoma tollere, aut morbum ad aliam sedem transferre, quae migratio saepenumero morbi mitioris in pejorem transmutatio est.

Ipse in muliere observavi, quae ex leucorrhoea incidit in phthisin pituitosam. Aliquando salutaris est, naturaeque beneficio vere critica, pulmonum catarrhum verbi causa tollente alvi fluxu mucoso: quod tum sperare licet, quum blennorrhoeam partis nobilioris blennorrhoea partis ignobilis excipiat: quas crises in acuto praesertim morborum genere expectabitis.

Blennorrhoeas optime curabit, quem causae non fefellerint: medicina igitur nunc diaphoretica, nunc antigastrica, nunc cachexiae peculiari contraria, interdum aut palliativa tantum, aut nulla, si habitualis ea secretio facta sit: inque iis curandis praeterea corporum etiam natura cognoscenda est; ut therapeutices universalis legibus obtemperandum ac generalia artis praecepta servanda sint



ei, quicumque salutarem hanc professionem rite, hac etiam in parte, exercere cupiat.

---

## DE VERMIBUS INTESTINALIBUS ET MORBO VERMINOSO.

Ex quo tempore zoologia ejusque pars helminthologia majori studio coli coepit, hic etiam morbus adcuratius coepit indagari atque cognosci, ut igitur his demum temporibus ea pathologiae animatae pars vere culta atque elaborata dici possit. Quod imprimis eruditorum debetur Germanorum industriae: BLOCHII praesertim, GOEZII, MÜLLERI, ZEDERI, RUDOLPHII, BREMSERI laboribus, quorum tot tantaque sunt merita, ut ad Gallos etiam, suorum tantum et legentes et laudantes scripta, eorum fama pervenerit.

Omnes autem, qui de hoc morbo ejusque curatione scripserunt, superavit Doct. BREMSER, cujus monographia (*über lebende Würmer im lebenden Menschen*, Wien 1819. additis iconibus egregiis, ad naturam depictis) tanto majorem meretur laudem, quod communi careat vitio monographiarum, quae cum in singulo morbo describendo versentur, quo magnificentius de libro ipso auctorisque in eo collocata opera sentiat, ita ornantur et amplificantur quacvis, ut librum qui legat, nul-

lum esse alium in hac tellure morbum credat, praeter hunc ipsum, de quo agitur.

Erat autem BREMSERUS liberalis vir ingenii summiq; iudicii, cujus liber non tanquam abortus, aut foetus ingenii immaturus spectandus est, quales multi sunt nostrorum hominum libri, sed tanquam partus sanus omnino, post duodecim annorum graviditatem peractus. Quare hanc ingenii Bremseriani prolem vobis omnibus cupio quam commendatissimam.

Proxima morbi caussa vitium esse adsimilationis videtur, quo sive mutetur humorum alibilium erasis, seu nimia eorum creetur copia, ita ut digestionem non respondeat absorptio, spontanea quadam generatione in visceribus nascuntur parasi, sive entozoa.

Scilicet vetus illud HARVEI placitum: *omne vivum ex ovo*, plures patitur exceptiones. Nam quorundam animalium (ne plantas memorem) quorundam animalium adeo simplex est fabrica, ut vel sola fissione et divisione numerosa ac repetita possint multiplicari, ita quidem, ut unaquaeque pars suam sibi eamque propriam vivat vitam atque ex quavis particula novum fiat animal ei, unde separatum est, simillimum. Hujus generis, ut notis, sunt polypi. Atque hoc quidem phaenomenon summam testatur in his animalibus vim reproductionis summaeque vigentem vitam plasticam. Huic analogum est phaenomenon quoddam in cor-

poribus animalium etiam perfectiorum animadver-  
tendum ac quemadmodum in polypis fit reprodu-  
ctio externa per fissionem, ita in hisce fit repro-  
ductio interna per separationem molecularum or-  
ganicarum spontaneam. Alimenta nimirum corpo-  
re recepta humorum inquilinorum: salivæ, succi  
gastrici, pancreatici, enterici, biliosi, et muci  
ipsius admixtione et organorum digerentium ac-  
tione, miram subeunt mutationem ac fermenta-  
tionem quandam vitalem, qua in naturam mu-  
tantur corpori organico vivo, animali analogam  
simulque humoribus vivis affusis quadantenus vi-  
tæ fiunt participes, quæ si digestioni respon-  
deat absorptio et assimilatio, ita ut omnes par-  
tes alibiles, nutrientes alimentorum resorbean-  
tur ac suscipiantur, perfectum erit harum actio-  
num æquilibrium et optima vitæ organicæ vale-  
tudo, sin vero quæ digestionem paratur materia,  
non resorbeatur aut assimiletur, molecule illæ  
organicæ, fluidis vivis quasi imprægnatæ a reli-  
quis secedentes coeunt inque corpora coalescunt  
organica, viva, proprium sibi vitam degentia, ita  
tamen, ut loco, in quo nata sunt, adhaerescant ab  
eoque remota moriantur. Quod hi sint entozo-  
orum natales, non tantum hydatidum et tumorum  
cysticorum in hepate analogia, altero in alterum  
transmutato (RUDOLPHI l. l. I. pag. 410.) verum  
etiam taeniae genesi probatur, quam sibi visus est  
observasse RUDOLPHIUS. Ipsum audite rem narrantem

(pag. 411 l. l.). » Sub canis fricatoris dissectione et tractus ejus intestinalis, ob villos examini subji-  
ciendos, attenta lustratione, in superiori intestino-  
rum tenuium parte nodulos, seu puncta reperi plu-  
rima, alba et minutissima, villosae fortiter inhae-  
rentia, quorum antequam natura innotesceret, in-  
dagatione microscopica aliquot horas occupatus  
fui. Taeniae cateniformis tandem capita esse vi-  
di, villis adnexa, seu potius cum iisdem coalita  
et fere confusa, ut oscula licet eorundem sucto-  
ria observaverim, locum tamen, ubi villo inhae-  
rere inceperint, distinguere non potuerim. Hoc,  
me saltem iudice, taeniarum natales designare vi-  
detur, ut earundem nimirum capita, sub dissimi-  
latione orta, a villis nondum separata, vel iisdem  
innata fuerint, postmodum remittenda."

Itaque vermes generatione spontanea, sive quae  
BREMSERI sententia est, *formatione primordiali*,  
(*Urbildung*) fiunt, ex qua conjectura multis pro-  
babilem adfingere explicationem licet.

Intelligitur, quo pacto vermes oriantur in dissi-  
tis etiam et reconditis locis: in cerebro, hepate,  
aliis. Nam dissimilatio, RUDOLPHIO interprete, quo-  
vis corporis loco fieri potest. Hinc cur alia ento-  
zoorum genera aliis animalibus, aetatibus, parti-  
bus magis sint propria, perspicitur. Nam ut sua  
est cuivis animantium generi fabricatio, ita hanc  
sequuntur, quae in eorum corporibus existunt in-  
colae, utque alia est haec fabrica aliis aetatibus,

sic alia quoque aliis oriuntur genera incolarum: infantia praecipue ascarides, pueritia lumbrici, aetate adulta taeniae, et partes quod spectat, filaria cellulosae, hepatis distomata, intestinis tenuibus taeniae, crassis lumbrici, coeco trichocephali, recto oxyurides, reni strongylus gigas magis familiares.

Perspicitur, quare, quamprimum pristina sede relicta in aliam migrent, ex intestinis v. c. in ventriculum, symptomata inferant gravia, quamobrem in corporibus sanis atque robustis haud aegre ferantur, in debilibus contra, infirmis plurimum creent molestiae.

Nimirum duplex corporis conditio est, qua vermes generantur. Altera est corporis temperies phlegmatica, scrofulosa, lymphatica, languente nutritione: unde atrophia magnaue voracitas, ventre duro, tumido.

Altera est, ubi primarum viarum, sive ventriculi et intestinorum actio summopere viget, ubi energiae digestionis major est, quam quae ad corpus alendum sustentandumque requiritur: unde canali cibario plus chyli paratur, quam in secundas vias suscipi possit, huicque tantae energiae digestionis impar est absorptio, aut adsimilatio. His igitur nequaquam infirma sunt intestina, sed nimis robusta atque turbatum est digestionis et adsimilationis aequilibrium.

Quapropter errant, qui putent, semper debilia

esse in hoc morbo intestina semperque roborantia, amara indicari.

Itaque in morbo verminoso malorum fons non minus in adparatu nutritionis, quam in adparatu digestionis quaerendus magnaue ejusdem est cum morbo scrofuloso aliisque generis lymphatici, absorbentis valetudinibus cognatio puerique scrofulosi simul verminosi esse solent.

Nascitur morbus verminosus potissimum aetate puerili, in sexu femineo, temperie lymphatica, scrofulosa, in locis humidis, sub victu crudo, farinaceo vitaeque sedentaria, otiosa, iisque conditionibus, quae digestionis nutritionisque vitiis patent: ut endemicum esse in patria nostra morbum et epidemicum fieri sub tempestate humida tum inter animalia, tum inter homines observetur: quas epidemias verminosas, negantibus licet WICHMANNO et RUDOLPHIO aliisque, defendit BREMSERUS.

Quod autem non solis humidis regionibus proprius sit, probatur exemplo Helvetiae, ubi maxime familiaris est. In hac autem regione ex victus genere nasci, BREMSERO videtur: siquidem ejus incolae lacte, lacticiniis, caseo vescuntur, quae uti plurimum habent nutrimenti, ita morbum ante alia alimentorum genera faciunt. Rem docet exemplo senis robusti qui cum, amico suadente, diaetam mutaverat et lacticiniis usus erat, verminosus factus est, deinceps vero, postquam ad pristinum victum redierat, convaluit; tum altero mulieris exemplo,

duodecim liberorum matris, sex puerorum et totidem puellarum, quae quoties femellam gestaret, invincibili adpetitu in cibos crassos, ex lacticiniis et farinaceis ferebatur, simulque in morbum incidebat verminosum, a quo tum adpetitu, tum morbo immunis fuit, marem utero gerens; ita ut res sexies repetita, partus futuri sexum certo praesagire didicerit.

Praecipue vero nocent haec lacticinia farinosa, si nimis copiose ingerantur, neque labore, ut oportebat, subigantur. Nam duris corporibus, labore improbo firmatis, robustisque visceribus optimum eadem alimentum praebent. Contra diaeta tenuis, quantopere vermibus obsit, piscium famelicorum exemplo BREMSERUS ostendit: scilicet in genere cyprino post inediam perpessam nullum reperiri vermem, licet vermium feracissimo, animadvertit.

Symptomata morbi verminosi praecipua haec sunt: faciei color pallidus, mutabilis, oculi moestissimi, pupula ampla, palpebra inferior livescens, nasus tumidulus, pruriens, epistaxis, susurrus aurium, lingua sordida, foetor oris, salivatio matutina, adpetitus ciborum abnormis, anorexia, fauces caninae, nausea, vomitum, vomitus, ventris dolores, alvi dejectio mucosa, punctis, aut striis cruentis tincta, urina turbida, jumentosa, limosa, lactea, venter tumidus, durus, macies, inopia, animus morosus, varius, mutabilis.

Haec quidem vulgaria maxime hujus morbi symptomata, quorum sexaginta numeravit HAENTUS no-

stras nosque, si omnia vellemus recensere, ab auctoribus tradita, centena numerare possemus. Cujus rei si quaeratis rationem, breviter ipsam interpretabor.

Fit aliquando, ut vermes ejiciantur, qui nullam creaverant molestiam, aliquando contra numerosa praecedunt gravissimaque symptomata. Est autem hoc nequaquam vermibus tribuendum, sed sive corporis naturae, seu morbo complicatō. Nimirum vermes crebro corpora incolunt aut scrofulosa, aut nervosa: ex quibus mira provenit symptomatum cohors. Cogitate quaeso nervorum intemperiem, affectum nervum sympathicum ejusque plexum solarem, nec mirabimini, mille formis ludere hoc morbi genus.

Profecto fallax est admodum et dubia vermium morbique verminosi diagnosis. Est tamen animadvertenda symptomatum syndrome et concursus minusque probanda multorum ratio, qui symptomata distrahendo dubiam reddere morbi dignotionem student. Oportet autem duplicem indagare horum symptomatum fontem: alterum ipsam digestionis officinam, alterum genus nervorum. Ex priori proveniunt linguae et adpetitus affectiones, nausea, vomituritio, vomitus, alvi dejectio liquida, aut diarrhoea chronica, quam inter signa morbi certissima habet WICHMANNUS; urina jumentosa, turbida, venter tumidus, durus, atrophia. Ex altero caetera quaevis multaue nervorum generis mala, quae vermibus imputantur: amaurosis, surditas



aphonia, epilepsia, catalepsis, syncope, vertigo, spasmi, convulsiones, deliria, cordis palpitaciones, circulationis turbæ, motus febriles, cæc. quæ non simplicem morbum indicant, sed statum nervosum cum statu verminoso compositum. Iterum vobis in memoriam revocare liceat utilissimam illam symptomatum morbi symptomatumque hominis aegri distinctionem, quam alio loco (*Init. Discipl. Patholog.* §. 547 sqq.) plenius exposui quamque in omni arte diagnostica ob oculos habere decet.

Caeterum scitote, ut graviditatis omnium minime dubium indicium partus est, sic certissimum morbi verminosi signum vermes esse e corpore expulsos: quod imprimis tenendum, ubi de peculiari agitur cujusque vermis diagnosi, quæ eo difficilior est, quo facilius symptomata nervorum et aegrum fallunt et medicum quoque sæpius in uno eodemque corpore plures hospitantur species vermium. Nam neque ipsa taenia, etiamsi Gallis *ver solitaire* dicatur, crebro sine consortio est.

Tæniæ duplex species est in homine reperta: altera bothriocephalus, sive taenia lata dicitur; altera taenia solium. Pertinet utraque ad entozoa cestodea. Cf. J. VAN DER HOEVEN *Handboek der Dierkunde* I. D. pag. 115 sqq. quem librum vobis ut cognitum scio meritoque commendatum, ita characteres generum ex eo discite, tum *tæniæ* pag. 115. tum *bothriocephalæ* pag. 116. simulque

inspicite citatas BREMSERI tabulas, sive icones.

*Taenia. Corpus elongatum, depressum, articu-  
latum. Oscula capitis quatuor suctoria. (Taenia  
solum BREMSER, Tab. III. fig. 1—14.)*

*Bothriocephalus. Corpus elongatum depressum,  
articulatum. Caput subtetragonum, bothriis duobus,  
vel quatuor oppositis, (Bothriocephalus latus, Tae-  
nia lata Tab. II. fig. 1—12.)* Itaque altera species  
ab altera capite differt; verum etiam, quamvis ab  
hoc ducti sint characteres generis, differt articu-  
lis, qui in bothriocephalo latiores, quam longio-  
res inque parte media duo habent foramina, in  
taeniae vero medii articuli longiores, quam latio-  
res et foramina habent marginalia, vage alterna;  
ad quae discrimina eo magis animadvertat medicus  
oportet, quia hi vermes vix integri aut exeunt, aut  
cernuntur. Bothriocephalus in Polonia, Russia,  
Helvetia et quibusdam Galliae regionibus reperit-  
tur, sive potius Polonorum, Russorum, Helveto-  
rum intestina tenuia incolit; vermis adulti corpo-  
ris longitudo est viginti pedum et ultra. Taenia  
solum nostris hominibus omnibusque Europaeis,  
praeter eos, quos memoravi, peculiaris, longitudine  
corporis est non facile definienda a quatuor, decem  
ad viginti, viginti quatuor pedes et ultra. Notate  
tamen, hanc longitudinem ex partibus expulsis  
non recte definiri, quoniam saepenumero plures  
sunt: unde quae de mira hujus entozoi longitudine  
a rei medicae scriptoribus narrantur, commodam

habent intelligentiam. Feruntur quoque exempla utriusque speciei in eodem corpore hospitantis, quae testantur, nullam unius tantum gentis, aut populi esse, quamvis alia aliis gentibus familiaris sit magis et domestica. Eapropter vero utraque species accurate discernenda est, quia bothriocephalus longe facilius pellitur, quam taenia quaeque in illa specie juvant remedia, eadem in hac saepenumero fallunt.

Caput taeniae parvum est, tenue, quatuor oculis suctoriis munitum. Foramina articulorum neque ad absorbendum, neque ad corpus figendum, sed ad ovaria pertinere videntur, neque igitur, ut fama est, articuli accrescunt, sed vermis integer nascitur. Taenia autem fenestrata ex ovariis fissis existit. Capita, quae crebro a corporibus sub ipsa dejectione secedunt, aqua tepida crebro et caute affusa saecibusque omnibus segregatis, quaerenda. Corpus movere taenias motu undulatorio, quem percipere aegri ponderisve sensu aut aurac frigidae molestari angique dicuntur, una cum fame ingenti summaque voracitate et repentino crebroque deliquio, aut vertigine: quas tamen notas, ut cognoscere juvat, ita iisdem non admodum oportet confidere, nisi simul vermis articuli fuerint ejecti. BREMSERUS ipsius eadem esse, ac lumbricorum symptomata monet alioque loco, quod observatoris periti est et callidi, animadvertit, quae, inscio aegro, aut nulla, aut levia concitarat in-

commoda, sciente gravissima concitare: postquam scilicet odiosi hospitis exuviae sive indicia prodierant.

Nematoideorum, entozois cestoides longe perfectiorum, quinque genera sunt, quorum species in corpore hominum detexerunt: nempe genus *ascaris*, *oxyuris*, *strongylus*, *trichocephalus*, *filaria*; quibus communia sunt: corpus teres, elasticum, canalis intestinalis hinc ore, illinc ano terminatus, sexus sejuncti.

*Ascaris.* Corpus teres, elasticum, utrinque attenuatum, caput trivalve, genitale masculinum spiculum duplex. Hujus species est *ascaris lumbricoides* hominis aliorumque mammalium incola. Longitudo corporis est sex, decem, immo quindecim pollicum: quo plures, eo minores esse solent. Hic vermis, caeteris frequentior, his indiciis se prodere fertur; sensu formicationis in ventre, pruritu nasi, salivatione orisque foetore, urina lactea, pallore in vultu: nec tamen alia esse taeniarum, quae horum sunt signa, censet BREMSERUS. Interdum numerosissimi reperti sunt, in glomeres convoluti et implicati ac difficulter e corpore exturbantur (BREMSERI Tab. I. fig. 13 — 17.)

*Oxyuris.* Corpus teres, elasticum, parte postica feminae subulata. Os orbiculare. Penis vaginatus. (BREMS. Tab. I.) Hujus speciei mares femellis minores sunt et rariores; crassa tenellorum, praesertim rectum incolunt ac denso agmine molestum

ani pruritus, inprimis vespere, lecti tepore moti concitant, in adultis vix adsunt.

*Trichocephalus.* *Corpus teres, elasticum, parte antica capillari, subito in crassiorem transeunte. Os orbiculare. Genitale masculinum simplex, vaginatum.* Hujus species *trichocephalus dispar* in coeco hominum intestino maxime vulgaris est eumque observarunt in Epidemia mucosa celeberrimi commentationis de morbo mucoso auctores ROEDERER et WAGLER. Differunt feminae corpore subrecto, a maribus corpore spiraliter involuto. Vid. BREMSER Tab. I. fig. 1—5. Non multum molestare videntur, quos incolunt homines.

Atque hae species sunt vermium intestinalium; de quibus hoc loco sermo est. Nam *strongylus gigas* ad renes, *filaria medinensis* ad cutem, *entozoa cystica* ad alia viscera pertinent, eorumque aetiologia, diagnostice, therapeia adeo obscurae sunt, ut cum de iisdem certi vix quidquam dici possit, hactenus de cysticis hisce tacere, quam temere aberrare malimus. Caeterum conferatis laud. BREMSERUM, in ipsius de morbo verminoso Monographia.

Prognosis universe haud infausta est. Morbus raro est lethalis: minus tuta cum febribus, aut morbo scrofuloso complicatio. Quo aetas junior, eo discrimen majus. Praesertim affectus nervorum convulsivos, spasmodicos timete. Ascarides facilius lumbricis expelluntur. Taenia omnium dif-

ficillime. BREMSERO ascaridum expulsio difficillima habetur, contra atque ego expertus sum.

Morbus verminosus maxime chronicus esse et nisi tollatur diathesis, reverti solet. In pueris sanatur crebro ipsa aetatis mutatione. Ut omnis complicatio aut compositio graviolem facit morbum, sic gravis est status verminosus in febribus aliisque acutis, propter irritatum genus nervorum et fractum saepenumero viscerum tonum. Quod in serofulosa etiam complicatione, ubi languet maxime vita plastica, notatur.

Aetas junior, infantilis ob proclivitatem in spasmos et convulsiones majus subit discrimen.

Nascuntur ab hoc morbo propter affectum genus nervorum: epilepsia, catalepsia, chorea s. Vit, tetanus, trismus, aphonia, amaurosis, caet. Hic tamen adsit oportet status nervosus, tanquam seminium. Nam nec deesse multos, quibus entozoa etiam numerosa nihil nervos laeserint, antea jam monuimus. Ideo laudanda est RUDOLPHI BREMSERQUE horum symptomatum verminosorum censura, quam paucis vobis tradere lubet.

Ille postquam symptomata varia ac noxas, quae vermibus tribui solent, recensuerat, haec subiecit: » Vermes humani, ascarides lumbricoides et taeniae convulsiones et spasmos varios, ascarides vermiculares praeterea pruritum ani et genitalium taediosum, filariae medinenses dolores subcutaneos ciere possunt, caetera mala iisdem vulgo ad-

scripta, commentitia sunt." Hic varios citat casus, in quibus ipsa mors, aut gravia mala vermibus innocuis imputata sunt. Primo visa reperta viri doct. COUREON PERUSSEL in *Journal de Médecine*, Paris 1807. Tom. XIII. tum aliorum, in quibus hydrophobia, scrofulosis ipsaque mors a vermibus male fuere repetita. Alios risus convulsivi, syncopes, aliarum convulsionum, paralyseos, ruminationis, aphoniae, amauroseos, diarrhoeae anthelminticis aut sanatarum, aut mitigatarum: casum epilepsiae et maniae verminosae, quos retulit celeberrimus nostras THOMASSEN A THUESSINK; de hac tamen dubitat, quia nulla vermium ejectorum mentio facta est. Etiam choream s<sup>i</sup> Viti et epilepsiam et tussim spasticam post vermium expulsionem fuisse sublatas, citata ab eo exempla testantur. Nolite tamen credere, quidquid vermibus tribuatur, horum culpa existere, aut a vermibus peripneumoniae aut pleuritidis symptomata orta esse, quae virorum doctorum LE PELLETIER, SUMEIRE, aliorum opinio fuit, nec quoniam post vermes expulsos symptomata siluerant, hos eorum fuisse causas, quod de suis ipse curationibus ingenue fatetur: siquidem res ipsa saepenumero altius repetenda est; quamobrem nec praetermisit redarguere illos medicos, qui de solis vermibus e corpore pellendis solliciti, aegros drasticis enervant.

Supersunt tamen duo vermium crimina examinanda: alterum volvuli a vermium numero intestina

obstruente: alterum perforationis; de quibus viri docti in varias sententias abierunt.

Primum quod attinet, centenos vermes intestina recondere posse, sine colica aut volvulo, compluribus mirisque exemplis probat: ipsos autem casus huc relatos sive a cerebro aegro, sive a ventriculo, vermibus irrepentibus irritato, sive ab hernia legitimam habere interpretationem, ostendit.

Alterum vero prorsus negat ac testem excitat RUDOLPHIUM, qui multis argumentis hanc opinionem refutat.

Verum uti non facile hac aetate hujus opinionis patronum invenietis, ita sunt, qui vermium stimulo inflammari intestina arbitrantur et ex inflammatione perforari. Hanc opinionem tuetur etiam GENDRINUS atque MORGAGNI testimoniis eam probare conatur; quae tamen ad rem probandam non satis idonea videntur; si cum iisdem, quae prius de ruboribus mucosae intestinalis, BILLARDO interprete, diximus, conferatis sique cogitetis, fatente etiam GENDRINO, longe abesse, ut semper intestinorum phlogosis sit, ubi vermes; quod ne tum quidem observatum est, ubi vermibus resecta atque infarcta penitus intestina erant (BREMS. pag. 131.)

Quid igitur de conjectura BROUSSAIIII statuendum: vermes nasci propter auctum ex phlogosis intestinorum mucum (II. pag. 569.) ipsi perspicitis et simul quo jure ROEDERERUM, WAGLERUM tes-



tes invocaverit suae sententiae, quia in morbo mucoso crebras invenerunt trichurides.

Posse inflammari intestina, vermes includentia, et ex inflammatione gangraena, et sphacelo factis elabi posse vermes, quis neget? Qui vero exinde vellet efficere, vermes fuisse inflammationum aut caussas, aut effectus, vereor, ne brevi exceptionum numerum superiorem inveniret numero confirmationum.

Ipsi rem perquirite. Jam tempus est praecipienda de curatione morbi verminosi.

In morbi verminosi curatione duplex universe est medendi consilium: alterum spectat vermium expulsionem, alterum idque praecipuum diathesis verminosae emendationem. Etenim gravis error est, omnem hujus morbi medelam in vermibus quocunque modo expellendis versari iisque expulsi esse absolutam. Vermes nempe ipsius morbi sunt producta eorumque expulsio minima eaque symptomatica pars curationis est. Praecipua vero illa est, quae ad ipsam pertinet morbi verminosi naturam et caussam proximam, ad illam scilicet diathesin, unde vermes generantur.

Ista autem vermium expulsio non una ratione tentanda, verum in aliis alia.

Anthelminticorum, sive vermes pellentium remedium duo genera sunt: alia anthelmintica propria, sive venena vermium; alia purgantia, alvum concitando, vermes e corpore eliminantia. Quae

anthelminticorum distinctio vere practica eapropter retinenda est, quia interdum haec, interdum illa seligenda sunt auxilia, interdum utrisque utendum, neque perinde est, quo tempore unum alterumve adhibeas. Nam uti empiricorum est, alia post alia indiscriminatim praescribere multaque heterogenea copulare, sic medici rationalis est, eam medendi methodum sequi, quae ad morbi aegrique conditionem maxime adcommodata est, omniumque rerum, quae ad aegrum pertinent, computatione nititur.

Anthelmintica propria maximeque universalia feruntur: aqua gelida, spirituosae, olea foetida. Nimirum ut quae vermibus noceant, cognoscerent helminthologi, experimenta fecerunt in entozoa viva e corpore rejecta. Ex hisce effici videtur, frigus non ferre praesertim animalium calidi sanguinis incolas, sed cito obrigescere et mori: citissime in spiritu vini et oleis foetidis. De quibus tamen experimentis recte praecepit BREMSERUS, ea magnas requirere cautiones, neque semper tutam esse ex iis, quae extra corpus entozoa laedunt, ad ea, quae in corpore vivo fiunt, conclusionem. Accedit enim extra corpus frigoris noxia potestas et habitaculi pristini haud innocua permutatio. Praeterea ipsa medicamina ingesta nec pura, neque integra vermes tangunt, quippe a ventriculo corporisque succis mutata demum ad intestina, vermium sedes, deferuntur. Interea tamen de noci-

va eorum, quae recensuimus, ultimorum praecipue, in corpora entozoorum vi eo minus dubitari licet, quoniam gravissima experientiae auctoritate firmantur.

Praeter haec alia sunt mechanica, alia nervina antispasmodica, alia denique tonica, aut adstringentia. Ex mechanicis anthelminticis, i. e. iis, quae mechanica ratione vermes necare creduntur, potissimum commemorandum est stannum idque granulatum; nam limatura stanni ipsis intestinis non minus, quam vermibus obesse posset. Datur ad unc 1— $\beta$ . ex syrupo. Huic jure suo non admodum favet BREMSERUS.

Nervina antispasmodica plurima sunt anthelmintica. Efficaciora sunt (nam omnia enumerare longum foret) rad. valerian. sylvestr. g. as. foetid. camphora, sive in pulvere, sive in julepo cum aceto copulata. Ad tonica denique referuntur: sem. santonici, sem et herb. tanaceti, quae simul peculiaris aliquid aromatici vermibusque ingrati habere videntur. Amara sunt potissimum absinthium et quassia. Adstringentia vero: acida mineralia, martialia, praecipue sulphas ferri, sive vitriol. mart. et fortasse cort. quoque rad. granator. nuper adversus tæniā adhibitus, qui tamen majori dosi, qua praescribitur, et vomitum et alvum movet.

Anthelmintica purgantia sive oleosa sunt, sive salina, sive mercurialia, sive drastica.

Ex oleosis inprimis laudatur oleum Ricini. Ex salinis sal Glauberi, sal Ebshamense, tart. vitriol. sal culinare, sal ammoniacum. Ex mercurialibus calomel, quod cum aliis purgantibus, praesertim drasticis copulari solet. Ex drasticis: jalappa, scam-moneum, gummi gutta, quibus interdum vel alia mitiora purgantia: fol. sennae, rad. rhei adduntur, vel saepe etiam calomel. Caeteris tamen antecellit jalappae radix. Ejus resinam adhibere BREMSERO minus tutum videtur. Eorum tamen ad regulas therapeutices universalis in singulis faciendus est delectus, uti deinceps ostendam, ubi de speciali curatione sermo erit.

Externa remedia quod attinet, ea utiliter interdum admoventur, potissimum nervos sopiendi fine. Scilicet ubi dolores colici, aut ubi ore nihil ingeri potest, in tenellis v. c. tumque vi anthelmintica propter absorptionem cutaneam, hac aetate praesertim vigentem, prodesse possunt. Cujus generis sunt: oleum cajeputi, RUDOLPHIO auctore, petroleum, allium, unguent. arthanitae, s. aloës cum petroleo Ph. B., fel tauri, similia. Nec tamen, ut antiquioribus placuit, ad praecavendam intestinorum a vermibus perforationem commendari merentur.

Atque haec universalia sunt maximeque celebria remedia anthelmintica. Peculiariora singulis speciebus adversa nunc superest, ut commemoremus. *Bothriocephalus latus*, sive taenia lata et taenia

solium non ita facile expelluntur; quapropter validissimis remediis expugnari solent et ingens est tum medicaminum, tum methodorum ad eas expellendas laudatarum copia; in quibus dijudicandis et admovendis diversae speciei etiam habenda ratio est. Tantus videlicet est armorum ad taeniam profligandam numerus, ut vel exinde de parva eorum efficacitate iudicium ferre possimus. Interea tamen multum quoque differt, quaenam species taeniae corpus occupet et e corpore sit pellenda. Bothriocephalus enim, sive taenia lata multo facilius pellitur, quam quae nostris hominibus propria est, taenia solium. Quae quidem caussa est, cur toties remedia et methodi in Helvetia et Russia adhibitae et quidem bono adhibitae eventu, nostrorum medicorum spem fefellerunt, qui nisi hanc specierum diversitatem ignorassent, non arma accusassent, sed hostem, his armis saepe superiorem.

Propter diagnoseos difficultatem, ad detegendam taeniam laudatur terebinthina, qua adhibita, partes ejus secedere solent.

Est methodus CLOSSII, in quam casu incidit. Praescripserat scilicet matronae cuidam, alio fine, mixturam ex terebinthina in vitello ovi soluta cum aqua menthae piperit., sub cujus usu in syncopen delapsa est, ex qua suscitata, magnam partem taeniae dejecit.

Ab hoc inde tempore CLOSSIUS ubicumque tae-

niac latentis erat suspicio, terebinthinam adhibuit, dosi tamen pro aetate et irritabilitate aegrotantium diversa.

Notavit hanc methodum Cl. VOLTELEN in *Pharmacol. Univ.* Part. II. pag. 178. ac licet non semper respondeat, in re tamen dubia tentari utique operae pretium est.

Ipsae, quae ad taeniam pellendam celebrantur methodi, innumerae fere, ut plurimum drasticae sunt. Laudantur praeterea: aqua frigida, rad. filicis maris et Chaberti oleum. De praecipuis breviter.

Methodum ALSTONI mechanicam, quae stanno utitur, de qua supra, pag. 263. inefficacem expertus est BREMSERUS.

Reliquae methodi ad unam fere omnes sunt, ut diximus, drasticae; cujus generis etiam sunt celebres maxime Herrenschwandiana et Noufferiana.

Ex illa postquam duos dies mane et vespere drachm. i. pulv. filicis maris sumpsit aeger, ei praebetur pulv. ex gum. gutt. gr. xii. cum sal. absynth. gr. xxx. et sapon. Starkej. gr. ii. adhibito deinceps ol. ricini unc. j.

Ex hac praescribitur jusculum ex butyro recenti cum pane alb. et aqua sique alvus durior, injicitur clyisma ex decoct. fol. malv. et alth., cum sale et ol. olivarum, ac summo mane pulv. subtil. filicis maris dr. i—iii. ex unc. vi. aq. tiliae. Denique bolus purgans adhibetur ex merc. dulc. scammon. āā

gr. x. g. gutt. gr. vi — vii. cum conf. hyacinth.  
Quodsi rejiciatur, aut non exeat vermis, adduntur  
sal. Ebsham. dr. ii — viii. ex aquae calidae cyatho.

Notetis, has methodos ad taeniam latam oppug-  
nandam laudari, in alia specie saepenumero pror-  
sus inertes esse. Hanc methodum ita mutavit  
ODIERIUS, ut loco boli purgantis substituerit oleum  
Ricini (unc. ii. o  $\frac{1}{2}$  h. cochl. ex jure carniū). Iis  
mitior est methodus Weigeliana, quae mixturam  
salinam ex unc  $\beta$  — j. salis Glauberi ex duabus aquae  
fontan. libris, cujus vespere sumatur vasculum et  
elixir. vitrioli Mynsichti (gutt. 30 bis de die) aut  
elix. acid. Halleri (gutt. 10 ex vasc.  $\frac{1}{2}$  aquae cum  
saccharo) adhibet.

Ad taeniam solum expellendam caeteris tamen  
anteponenda videtur BREMSERI methodus: siqui-  
dem per decem annos ea curavit taeniosos quin-  
gentos, quorum quinque tantum iterata vice me-  
delam adhibuit. Initium curationis fiebat ab ele-  
ctuario anthelmintico purgante; ex semin. cinae,  
siue tanacetii ruditer contusi unc.  $\beta$  pulv. rad. valer.  
sylv. dr. ii. pulv. jalapp. dr.  $\beta$  — scr. ij. tart. vi-  
triolat. dr. i  $\beta$  — ii. oxym. scillit. q. s. ut fiat elect.  
D. 2 — 3 dd. cochlearculum. Deinde utuntur ae-  
gri oleo Chaberti empyreumatico, interposito sub-  
inde pulvere cathartico. Quod oleum tamdiu adhi-  
betur, donec unc iv — vii. adsumtae sint. Est au-  
tem haec curatio longior, unius aut duorum men-  
sium, eo tamen certior, neque tantum in ipsum

vermem, verum etiam in vermium genesin omnemque diathesin verminosam agere videtur. Interea temporis ab omnibus farinaceis durioribus, leguminosis et pinguibis cibis abstinendum est aegro. Certissimum perfectae curationis criterium est, quod nulli omnino articuli taeniae per tres menses dejiciantur. Convalescentibus nihil opus esse, contendit BREMSERUS, nisi ubi status pituitosus praevalcat, quo in casu aliquamdiu guttulis roborantibus uti jubet: ex tinct. aloës comp. Ph. Austr. dr. i. tinct. mart. pom.  $\frac{3}{4}$  i. elix. vitriol. Lond.  $\frac{3}{4}$  β—3, 4. dd. gtt. 10—30. ex aq. aut vin.

En methodum Bremserianam! cui major fides habenda est, quam drasticis illis aliisque methodis, quarum multae mere empiricae nihil methodici habent; quae symptomata quidem tollunt, nec tamen tollunt morbum.

Quae ab aliis laudantur ol. terebinth. cum ol. ricini ol. animale Dippelii et petroleum minorum virium sunt. Aquam frigidam magna copia ingestam taenias latas depulisse, vir celeb. PALLAS auctor est. Debilioribus aquam flor. aurantior. addere jubet RUDOLPHIUS. De virtute cort. granatorum, judicabunt posteri.

Interim tenendum est, aliud quid esse, taeniam sub hac illave medicina fuisse ejectam, aliud quid esse, ipsam vi hujus medicinae exsulasse. Nam ex vulgari illo: *post ergo propter*; nulla certa habetur conclusio.



Adversus lumbricos praesertim juvant: rad. valer. sylv. cort. geoffraeae surinam. semin. santonici, tanaceti, allium, cepae, asa foetida, et inter cathartica: fol. senn., rheum, calomel, jalappa, quaeque ex his componuntur medicaminum formulae. Allium, cepae ex fonte diaetetico: reliquae ex fonte therapeutico sunt.

Inter medicaminum formulas compositas caeteris praecellunt electuarium Störckii et electuarium Bremseri ex semin. santonici, aut tanaceti, pulv. rad. valerian., jalappae, sal. polychrest. et oxym. scillit. quorum prius magis catharticum est, quam posterius; quo ita utitur BREMSERUS, ut mane et vespere sumant pueri cochlearculum, donec alvus fiat liquidior, aucta subinde, si opus sit, dosi, aut interposito pulvere ex jalappa, fol. senn. et tart. vitriol. Ea autem hujus methodi praedicanda est salubritas, quod non semel et simul efficacius purgando, sed alvum faciliorem reddendo et alterando ac digestionem promovendo colluviemque verminosam subducendo prosit, quo facto simul et vermes pelluntur et diathesis corrigitur verminosa. Eodem consilio saepe rheo usus sum, aut jalappa cum mercurio dulci, refractori dosi; subinde etiam solo semine santonici, ubi tonus intestinorum emendandus erat. Corporibus laxis debilibusque convenit sulphas ferri, quod prisco nomine vitriol. martis adpellatur. Ascaridum expulsio medicamen-

tis potissimum tonicis, enematum forma admotis, tentanda est. Caeterum iisdem, quibus lumbrici oppugnanda sunt armis. Prosunt maxime inter cathartica: jalappa, mercurius dulcis, aloë.

Praeter haec adversus hos quoque hospites molestos electuar. Störckii, aut Bremseri commendari meretur. Ex purgantibus aloë, sive extr. ejus gummosum praecipue rectum intestinum afficere dicitur, quod horum vermium commune habitaculum. Quodsi purgantibus ore assumtis ad infimam sedem depulsi fuerint oxyurides, bis de die injiciendum curat BREMSERUS clysmā ex inf. herb. absynth. rad. valer. semin. tanacet. cort. aurantior. adjecto oleo c. cervi foetid. sique phlegmaticus fuerit habitus, felle taurino.

Alii clysmata ex aqua frigida laudant, alii ex allio cum lacte cocto, quorum salubritatem saepius expertus sum, aut ex asa foetida vitello ovi soluta, addito sale culin. alii ex aqua calcais cum lacte. Cum vero pruritu corpus nimium irritant haec animalcula, clysmā oleosum has turbas sedabit. Subinde in vaginam irrepunt ac manifestam pruritionem provocant, non praecipitis moralibus, verum injectionibus medicatis inhibendam. Dolores colici a vermibus optime sopiuntur oleosis, lacticiis similibusque clysteribus, abdominisque inunctionibus oleosis aromaticis.

Diathesin verminosam emendabunt plurimum victus parvus, roborans, potissimum animalis, motus

corporis in aëre puriori, oleum Chaberti empyreumaticum, alterantia, amaricantia, amara.

In hac nimirum diathesi corrigenda curationis summa versatur, victus sit ex carne recenti oleribusque recentibus, additis allio, sinapi, raphano rusticano similibusque: potus ex cerevisia amara, aut pauxillo vini rubri; prodest motus corporis, rusticatio, peregrinatio. Ad tollendum morbi seminum in oleo Chabertino praestans habetur remedium. Ex alterantibus parcae repetitaeque purgantium doses de rheo, aloë, jalappa, mercurio, nec non gummi ferulacea seligenda sunt.

Ubi nimis activa fuerit digestio, neque ei adaequata absorptio et assimilatio, in corporibus robustis, salina praescribenda, aut et calomel et jalappa, aut sp. vitrioli, methodo Weigeliana.

Sin contra debilia intestina: aloë, rheum. g. ferulacea, amaricantia, amara, praestant. Torpidis incitantia magis conducunt (sem. sabadill.?) et victus aromaticus, vinosa, spirituosa tinct. aloës, myrrh. caet. Laxis adstringentia, martialia, aqua frigida, tinct. martiales vitriol. mart. quaeque id generis alia sunt; ita ut semper ad praecepta therapeutices universalis ars dirigatur. Morbo complicato composito complicata composita apta est medendi ratio: gastrico antigastrica, scrofuloso antiscrofulosa, nerveo nervina cum anthelmintica copulanda. Nempe non sufficit, simplicis morbi cognoscere medendi methodum, oportet etiam ad com-

plicationes compositionesque medicinam accommodare.

Harum complicationum omnium creberrima est complicatio saburrealis, tumque juvabit saepenumero tartarus emeticus, cujus usum in hoc morbo praedicant multi: aut etiam cathartica sive mitiora, sive torpidis, efficaciora drastica. Nocebunt oleosa.

Ubi, quod saepe pueris evenit, vitium scrofulosum et verminosum junguntur, proderunt antiscrofulosa anthelminticis copulata: antimonialia, mercurialia, murias barytae, similia, de quibus deinceps.

Ubi adest status nervosus, aut excitantia nervina: valeriana, g. ferulacea, camphora; aut sedantia: flor. zinci, magisterium bismuthi, praescribenda et a drasticis cavendum.

Quoniam vero tantus est anthelminticorum cujuscunque generis numerus, seligenda sunt, quae cuivis complicationi maxime respondent, ita ut in gastrica complicatione anthelmintica evacuantia, in scrofulosa antiscrofulosa, in nervica denique nervina caeteris anteponantur, quo simul simplicior habebitur formula.

Ultimo loco monendum est, peccare eos, qui drastica cum anthelminticis propriis miscendo, ab horum virtute quid boni exspectant. Nam drasticorum virtute citius exturbantur, quam vermium corpora attingere, aut seminium corrigere possint.

Hisce consecraria quaedam addere lubet circa vermes morbique verminosi curationes.

1. Vermes rectius morbi producta, quam morbus dicuntur.
2. Quae gravia ab iis excitantur symptomata vulgo non horum, sed corporis aegri symptomata sunt.
3. Vermium expulsionem minime confecta res est: quemadmodum docet morbus crebro recidivus.
4. Inprimis corrigenda atque tollenda est diathesis verminosa.
5. Hoc potissimum nomine reliquis aliorum medicorum curationibus partim empiricis, partim drasticis antecellit BREMSERI methodus rationalis.
6. Nec juvabit tamen, nisi legitimo adjuvetur et firmetur vitae regimine.

*Formulae Bremserianae.*

Nº. I.

R<sub>2</sub> Sem. cinæ s. tanacet. rudit. contus.  $\frac{3}{4}\beta$ .

Pulv. rad. valerian. sylv. 3ii.

— — jalapp.  $3\beta$ — $\Theta$ ii.

Tartar. vitriolat.  $3\beta$ —3ii.

Oxymell scillit q. s. ut f. Electuar. D.

2, 3. dd. cp.

## Nº. II.

R<sub>o</sub> Herb. absinthii.  
 Rad. valerian. s.  $\mathfrak{aa}$   $\bar{\mathfrak{z}}$  j.  
 Semin. tanacet.  
 Cortic. aurant.  $\mathfrak{aa}$   $\bar{\mathfrak{z}}$   $\beta$ .  
 C. C. M. D.

2 Cochl. affund. aq. fervid. libr. I. vase clauso stent p. noctem. Cola. Exprim. Inde fiant clysmata quorum utrique adde ol. c. c. foetid. cochl. j.

## Nº. III.

R<sub>o</sub> Pulv. rad. jalapp.  $\mathfrak{g}$  j.  
 — fol. senn.  $3\beta$ .  
 Tartar. vitriolat.  $3j$ .  
 M. f. pulv. divid. in iij vel iv. part. aeq.  
 D. S. o. h. pulv. aut o.  $\frac{1}{2}$  h. pulv.  $\frac{1}{2}$ .

Donec purget.

## Nº. IV.

*Oleum empyreumaticum Chaberti.*

R<sub>o</sub> Olei corn. cerv. foetid. part. j.  
 — terebinth. part. iij.  
 Mixta stent per quatrimum.

Dein destilla ex retorta vitrea in balneo arenae ad  $\frac{3}{4}$  partes. Serva in lagenulis unc j —  $\beta$ . continentibus ac probe obtur. ne aëris accessione nigrescat et crassescat.

N<sup>o</sup>. V.*Guttulae tonicae.*

R<sub>o</sub> Tinct. aloës compos. Pharm. Austr. 3j.

— martis pomat. ʒj.

Elix. vitriol. Anglic. Pharm. Lond. ʒβ

M. D. S. 10, 20, 30. gutt. 3, 4. d. d.

ex cyatho aquae, aut vini.

---

DE MORBO SCROFULOSO.

Divisio morborum in externos et internos, ut multis difficultatibus premitur, ita illud grave incommodum tulit, ut cum externi a chirúrgis, interni a medicis describerentur et curarentur, nulli plenam tenerent medendi scientiam, nec raro vel insana-biles reputarentur aegri, qui sanari potuissent, vel perirent, qui a doctiore medico potuissent servari. GALENUM ferunt in praesagiendo morbi eventu etiam aegrum curationis patientem vel impatientem spectavisse; sic nos etiam medicum spectandum esse censemus, cujus scientia, vel inscitia aegrotantium salus continetur; neque aliam ob causam morbos sanabiles complures non sanari credimus, quam quod multi morborum remediorumque scientia legitima carentes manum operi admovent.

Haec si ad eum, de quo hoc loco dicimus, morbum transferatis, intelligetis, cur tot scrofulosi pereant, medico parum docto, aut perito curati.

Vos, quo pleniorē habeatis morbi hujus notitiam, primo discernite variam et fallacem morbi speciem. Scrofulae, strumae, Graecis *χρῆμαδες* vocantur glandularum praesertim conglobatarum tumores, qui crebro in collo, cervice fugaces, ex catarrho, refrigerio, aliave caussa externa cito nascuntur et cito evanescunt (*scrofula fugax* dicitur) saepius ex peculiari vitio systematis lymphatici oriuntur, cui si proprius accedat corporis habitus externus, morbi scrofulosi nomine dicuntur.

De hoc multa exstant eaque praeclara medicorum Anglorum scripta RICH. RUSSELL, THOM. WHITE et ROB. HAMILTON; tum inter Francicos vir celeb. BAUMÉS, inter Germaniae medicos CAROL. GEORG. THEOD. KORTUM de vitio scrofuloso scripserunt, nec non de curatione praecipue CHR. GUL. HUFELAND: quorum opera ad finem hujus libri laudabo.

Duplex hujus morbi varietas et forma distinguitur: altera scrofula propria quibusdam dicitur; altera scrofula mesenterica; cujus quidem distinctionis nisi auctor, saltem patronus est Doct. KORTUM cujusque, ab aliis licet neglectae auctoribus, notas vos ignorare eo minus cupio, quo magis naturae observatione ipsam veram esse didici.

Nimirum in altera varietate aegri sunt pulchro



faciei colore, genis roseis, oculis magnis, caeruleis, capillis pulchris, corpore pleno, succulento, cute glaberrima, animo hilari. Labium superius tumidum est, nasus crassior, narium, labiorum excoriatio, nec raro lippitudo aut ophthalmia eos molestat. Externi glandularum, imprimis in collo tumores multi, concatenati, ulcera recrudescencia erebro inque aliis locis renascentia, cicatrices foedae, turpes in iis animadvertuntur. » Haec imprimis varietas (sunt verba viri doct. KORTUM, cujus descriptione usus sum) in qua materies scrofulosa maxime maturata, et ad summum, sit venia verbo, specificitatis gradum exaltata esse videtur, haereditario modo propagatur vixque solis caussis occasionalibus ad illam producendam satis inest facultatis. Raro ante tertium quartumve annum oritur, etiam melioris conditionis homines vexat: cum altera species in solos fere pauperes et plebejos cadat. Non adeo segnes ac phlegmatici, sed sanguinei potius temperamenti satisque alacres sunt pueri. Raro pereunt atrophici. Alii contra affectus scrofulosi secundarii, v. c. tumores albi articularum, spina ventosa, ulcera, ophthalmiae, aliaque oculorum mala, phthisis etiam pulmonalis sub hac vitii forma utplurimum se ostendunt." Hactenus KORTUM; quem priusquam cum recentioribus auctoribus medicis, hanc distinctionem utplurimum negligentibus, conferatis, audite quaeso alteram etiam varietatem tradentem.

Haec dignoscitur facie cachectica, pallida, tumidula, oculis languidis, lacrymosis, animi morositate, tristitia, segnitia, ac senili quadam prudentia, aut gravitate, tumoribus colli, aut nullis, aut paucis frigidis, capite magno, fronte et occipite prominentibus, corporis macie, ventre duro, turgente, depravatae digestionis notis. Ex hac in atrophiam, tabem mesentericam facilius transitus est, propter affectas glandulas mesenterii inque stadio ultimo pedum, manuum oedema, mortis praenuntium. Ea saepenumero cum rhachitide jungitur: atque aetate juniori, altero jam vitae anno, aut maturius invadit et potissimum pauperculos plebejos infantes pravoque usos victu adfligit: ita de hac forma is, quem citabamus auctor; qui uti in priori acrimoniam, sic in hac diathesin pituitosam et solidorum atoniam phlegmaticam praevalere existimat.

THOM. WHITE negans, morbum esse haereditarium, per consequentiam etiam negat, peculiarem habitum scrofulosum omneque ad morbum seminum in cutis teneritudine ponit, cui interdum pallor, oculorum languor ac torpor denique junguntur: neque tamen hoc seminum ad strumas solas, verum ad omnem omnino adversam valetudinem disponere contendit. Caeterum valetudinem, initio facto a mesenterii vitio per varias ejus phases traducens, quae singulis partibus strumosis peculiariora signa sunt, tradit ac duplicem illius va-

rietatem confundens, tanquam unam spectat metamorphosin morbosam.

Quatuor distingui possunt morbi gradus, sive stadia (quae videlicet ad scrofulam propriam pertinent). In primo tumores colli pone aures, sub mento mobiles sunt, non dolentes nullusque abdominis tumor, vel induratio. In secundo tumores externi, numerosi, mole ac duritie augentur; abdomen non prorsus liberum, habitus scrofulosus manifestus. In tertio dolent tumores, inflammantur, exulcerantur. Corpus fit sensilius, irritabilius, laeditur digestio, conglomeratas quoque glandulas vitium occupat, accenditur febricula. In quarto gradu denique articuli adficiuntur et ossa, fiunt tumores albi, caries, morbi hectici, phthisici, secundarii.

Hactenus tradita morbi stadia, aut gradus bene distincta atque descripta ab eruditissimo medico KORTUM, ejusdem denotant morbi aetates et incrementa. In primo stadio cernuntur morbi natales, in secundo adolescit, in tertio viget, in quarto corpus depascitur omne. Notetis vero, hunc decursum saepenumero esse tardissimum, quippe qui quatuor, aut quinque annorum spatio circumscribitur, interdum diuturniore etiam atque observante GUL. CULLENO (*Practice of Physic*. Lib. III. cap. 1. §. 1242 sqq. pag. 433 sqq.) quovis vere recrudescebat, facto humorum orgasmo novisque natis ulceribus; aestate contra denuo decrescit sicque non

raro ad pubertatem usque protrahitur.

Vitii autem scrofulosi quo pleniorē habeatis notitiam, variarum formarum ipsius historiam breviter persequamur et quas laedat partes, videamus.

Egregias lustrantibus MASCAGNI tabulas minime mira videbitur tam multiplex morbi forma ac facies. Nam quum lymphaticorum genus per corpus universum ad ultimos usque organismi fines pertineat, intelligitis, vix ullum fore corporis locum, quo ipsorum mala valetudo declarari non possit. In capillitio tineae formam induit, in facie exanthematis tuberculi, in oculis ophthalmiae, blepharophthalmiae, mydriasis, in aure otorrhoeae, in cute reliqua tumorum, excoriationum, ulcerum, in articulis hydropis, rheumatismi, in ossibus cariei, emollitionis sub specie prodibit, mesenterio aegrotante, atrophiam, pulmone, phthisin, hepate, icterum, capite, hydrocephalum provocabit ipsaque sanguinis crasi vitata, febriculam hecticam, ut adeo aegritudinum fere nulla sit, quam interdum vitium scrofulosum mentiri non animadverterint medici.

At rogabitis, si hoc vitium tam varium sit et mutabile, quo tandem artificio detegi poterit?

Hoc fine primo advertendus habitus est, num ejusmodi sit, qualem descripsimus, scrofulosum, tum notandi tumores glandularum lymphaticarum, denique observandum, plerosque morbos scrofulosos

suis discerni characteribus: in ente tuberculorum formam induere (\*) sc. in facie, collo artubusque superioribus, qualia tubercula ut plurimum rara, dispersa, a parva incipiunt macula rubra, livida, sine calore, sine dolore aut pruritu, ad manus attactum duritiem quandam habente. Haec macula pedetentim post unum alterumve mensem in tuberculum increscit, tandemque emollitur ac cutis rubra fit, violacea, ac rumpitur interdum inque ulcus mutatur scrofulosum, marginibus duris, non dolentibus, rubro-lividis, profundis, nec pus laudabile, sed humorem tenuem, saniosum plorantibus. Ophthalmia scrofulosa, creberrima illa, sub specie blepharophthalmiae, psorophthalmiae, hordeoli, blennorrhoeae sacci lacrymalis atque ophthalmiae externae prodire solet. Et hoc loco metamorphosis in tuberculum et ulcus crebra est, quod sive a pustula, sive a phlyctaenula initium ducit inque turpem cicatricem, corneae maculam mutatur; aut transit haec pseudophlogosis in pannum, quem fig. III. Tab. III. delineandum curavit BEE-RIUS (†).

- In ossibus spinae ventosae, paedarthrocaces nomine dicitur, quae" ossium praecipue spongiosorum ad articulos potissimum et epiphyses expansio

---

(\*) Cf. RAYER Tab. XII. fig. 10.

(†) Cf. de scrofulosa hac forma VON AMMON Tab. I. fig. IX. cf. et fig. VIII.

est, cum carie juncta, saepius dolorifica ulcera partium mollium foeda sibi adsocians, difficulter sanabilis". (Cf. KORTUM l. l. Part. II. Sect. III. cap. II. pag. 298. et ANT. SCARPA de *Anat. et Pathol. Ossium.*) Hujus etiam loci est abscessus lumbaris, sive muscoli psoae, quem scrofulosi adscribit pluribusque exemplis illustrat ROB. HAMILTON, l. l.

Tandem scrofula mesenterica praesertim in atrophiam desinit, quam (a vitio endemico erat) summo gradu adumbrandam curavit ALIBERT, *Nosol. Natur.* Pl. B. pag. 448).

Itaque cernitis, cachexiam a lymphaticorum et glandularum genere ortam, habitum alterantem, deturpantem cutim, inflammantem oculos, ulcerantem partium parenchyma cellulosum ipsorumque ossium compaginem et medullam laedentem omneque tandem pervertentem negotium nutritionis atque universum corpus decomponentem, solventem, destruentem (\*). Quocirca operae pretium est, et causas et naturam et remedia perquirere.

Et causas quidem praecipuae dicuntur: aetas infantilis, puerilis, diathesis haereditaria, aër hu-

---

(\*) » Ossa ex morbo scrofuloso affecta sunt levissima, porosa, valde fragilia." G. SANDIFORT *Mus. Anat. Acad. L. Bat.* Vol. IV. pag. 48. Cf. Tabb. 33, 34, 35. nec non casum juvenis additamque iconem in *Observations on scrofulous Affections* bij ROB. HAMILTON, Lond. 1791. pag. 108 sqq.

midus frigidus, victus crassus, dyspeptus, voracitas, segnities, immundities. Nimirum ei aetati familiaris habetur, qua praecellit in corpore temperies lymphatica eoque loco eoque vitae genere, quo cutis munera languent et humores crudi, lymphatici abundant. Regionum frigidarum humidarum endemicam esse valetudinem, geographia medica testatur; quamvis dubitemus, huic soli causae morbum adscribere, quae nisi victus pravus aut haereditaria diathesis existat, vix succrescet.

Et victum pravum quod attinet, farinaceorum inprimis abusus culpandus est, ex solani esculenti tuberibus, quo solo fere vescuntur ex plebe pueri, cum divites aliis farinaceis, palato gravioribus, nec minus insalubribus abutuntur et carnibus frui prohibentur, ante alia ciborum genera ad diathesin illam emendandam maxime idoneis. Praesertim vero nocet talis victus, si pueri, ut moris est, totos dies in scholis includantur, ut sapiant, quam tamen sapientiam caro nimis sanitatis pretio ementes, miseri hi ex pueris sanis vegetis senes fiunt infirmi, morosi, vita cerebri in detrimentum universi corporis vigente. Quum, ut jure suo summus HUFELANDUS, naturae lege statutum sit, ut pueri totos dies in aëre se moveant corporaque exerceant.

Diathesin haereditariam agnoscunt alii, alii repudiant. Ex hisce potissimum citandus est THO-

MAS WHITE medicus chirurgus. Is quibus argumentis rem probare conatus sit, agite nunc perquiramus.

Morbus est, ita disputat, regionum temperatarum, tum aliarum, tum Angliae potissimum, neque humani generis tantum, sed animalium quoque, simiarum v. c., quae tamen in patria sua ex eo nunquam aegrotant. Puerorum morbus est, propter pravam victum primis mensibus et neglectam constitutionis naturalis animadversionem: quas ab causas ii praecipue laeduntur, quorum cutis tenerissima aegre fert aëris tempestatumque vicissitudines; qualis temperies gracilis locis mediae naturae ac latitudinis magis propria est.

Pravum vero vitae genus his tribus fere continetur: nimio cibo, nimio somno, motuque neglecto: unde glandularum mesenterii nascitur aegritudo: id quod duobus exemplis scrofulosorum ex parentibus fortibus creatorum, ab auctore illustratur. Nec majori jure curationis difficultas ad probandam diathesin haereditariam citatur. Nam indies crescit perficiturque ars medendi, neque dubium ullum superest, quin posteri remedia invenient malorum, quae hoc tempore empiricorum famam sustinent, ut medicorum rationalium opprobria sunt.

In hanc argumentationem animadvertimus, magis pugnari ratiociniis, quam rebus factis, confundi strumam, scrofulam mesentericam et scrofulam



propriam morbique originem repeti ex systematis gastrici atque mesenterii aegritudine.

BAUMÉS contra Whiteanam theoriam negat, mesenterium semper primo esse aegrum; quam sententiam quoque contra RIOLANUM defenderat MORGAGNUS remque probarat exemplo adolescentuli, ob strumas, quae collum occupabant, in Nosocomio mortui, in cujus mesenterio non modo strumam ullam, sed ne duras quidem glandulas deprehendit; Ep. 50. art. 28 sqq.

Quotidie autem, ita de controversia hacce circa haereditariam morbi originem recte praecipit ROB. HAMILTON, quotidie observamus, a parentibus ad prolem traduci hoc vitium: id quod nulla theoretica ratiocinatione refelli potest. Haereditarium esse, etiam contendunt BAUMÉS et nuper doct. SIMON, *Malad. Scrofuleuses* pag. 16 sqq., sed hic sensu minus vulgari.

Negari quidem non potest, diu in corpore latere ac data occasione per laesionem externam, exanthemata aliasque valetudines provocari morbum. Exinde tamen id duntaxat sequitur, latens fuisse in corpore seminium, suo tempore per potentiam nocentem evolvendum: cujus rei in aliis etiam diathesibus haereditariis crebra observatio exstat. Quodsi habitus gracilis cutisque teneritudo dicatur nobis et habeatur conditio corporis in scrofulosin proclivis, ex auctore cognoscere cuperemus,

an haec conditio a parentibus ad liberos traduci nequeat (\*).

Proximam causam si quaeratis morbi quae naturam, ea posita esse videtur in peculiari, necdum satis cognita systematis lymphatici aegritudine.

Antequam vero in ea perquirenda pergam, quid cadaverum sectio docuerit, videamus.

Et hic quidem primo laudandus est HAENIUS, qui historiam, quae hujus loci est, scripto mandavit. (*Rat. Med. Part. alt. cap. XI. pag. 149 sq. Ed. alt.*). » Puerum 10 annorum, multis in collo et sub axillis tumoribus scatentem, muco turgidum, ventre tumidum, cachecticum totum, praegressi anni autumno ad me attulerant. Quae remedia in

(\*) Nuper copiose de causis scrofularum disputavit Nosocomii infantum Parisiensis medicus A. C. BAUDELOQUE, qui, rejectis aliis, solum aërem accusat vitiatum, nec rite renovatum, in locis angustis occlusis: qui hoc auctore, oxygenii, azoti, acidi carbonici ratione insigniter ab aëre salubri differre debet; de quo certe auctoris Francisci placito dubitabit, qui cogitaverit experimenta a viris celeberr. GAY-LUSSAC et VON HUMBOLDT Parisiis facta, quibus efficitur constantem esse principiorum aëris atmosphaerici rationem. Verum haec utut dubia, minime dubia est aëris in ejusmodi locis corruptio, de qua etiam cf. KORTUM l. l. I. p. 323. hujusque aëris corrupti ad morbum scrofulosum creandum efficacia summa, quam multis rerum testimoniis demonstrat auctor. Secundum hanc aetiologiam natura morbi ab ipso ponitur in haematosi vitata, propter spirationem aëris impuri primumque cura in emendando pabulo vitae.

usum advocata sunt, haec postea historiae aliorum aegrorum dabunt. Puer hydropicus factus, post expletas decem in Nosocomio septimanas, calamitosam vitam terminavit.

Aperto abdomine mesenterium tum vehementer tumidum fuit, tum penitus nudum ac conspicuum, intestinis omnibus quasi naturaliter versus ambitum remotis. Tumores mesenterii magni durique iidem et solitarii, cum peritonaeo vero et ligamenti vertebrarum lumborum adeo intime concreti, ut mesenterium citra dilacerationem haud potuerit a vertebis solvi. Quoad naturam tumorum, in quibusdam medium folliculum occupabat alba materies, aut grisea, unita, aequabilis, crassa, pulte durior, mollior lardo, et in meditullio verae pulti similis. In aliis materies tum albidior erat, tum etiam in meditullio durior. In aliis tota iterum dura, aequabilis, similis. In nonnullis veluti calx aqua mista oculis adparebat, digitis nullam exhibens asperitatem. Denique in una alterave, vera calcarea materies, dura, tactu aspera, ceu in fungosum lapidem concreta. Ad vasa iliaca utraque, ad pericardium, sternum, diaphragma, supra asperam arteriam, ad jugulum, ad axillas, ubique ejusmodi reperiundi tumores erant. Multa in thorace et abdomine aqua.

Ad monstrosum nunc collum verso examine, tumores non amplius solitarii, sed et pluribus minoribus, sibi incumbentibus accumbentibusque et

communi cellulositate constabant. Membras alii tenues, crassiores alii, nonnulli denique prope cartilagineas habebant. Intercurrebant per tumorum intercapedines supraque eosdem arteriae, venae, nervi multi, per tunicarum substantiam dispersi. Tumore prudenter aperto, vasa eadem, in minores, quibus massa major componebatur, tumores se dividebant: tumorumque multi vasis in collo majoribus tam firmiter increverant, ut sine alterorum laesione separari non possent: vasa tamen illa majora a tumoribus non videbantur notabiliter comprimi. Encephalon solum ab his malis immune fuit.

Ubique in colli tumoribus diversitas materiae: immo aliquot ante mortem septimanis ingens adparuerat tumor, suppuraverat, disparuerat. Plerique vero quasi una cartilaginosa substantia erant, vel atheromata. Sedes porro omnium aut glandulae erant, aut adiposi folliculi."

SOEMMERRINGIUS in *Diss. de Morb. Vas. Abs.* §. 37. » invenimus, inquit, in mortuorum glandulis scrofulosis lympham viscidam, vel materiam caseosam, duram, plerumque in rotundis cellulis contentam. Quamvis hi glandularum tumores, sic pergit, vulgo obstructions vocantur, nihilo secius tamen non credendum est, impervias, sive vere obstructas esse ejusmodi glandulas: saepius enim saltim mercurio pervias eas reperi." In quem locum tamen animadvertit vir clar. OTTO, in summo

gradu inflammationis, aut vitii scrofulosi glandulas crebro aut totas, aut partim esse inflammatas. (*Lehrb. d. Path. Anat.*).

MECKELIUS vitium scrofulosum idem habuit ac tuberculosum l. l. II, 2, pag. 399 sqq. quae hypothesis magnam profecto veri speciem habet.

Siquis conjecturae sit locus, videtur in propria saltem scrofula subesse plethora lymphatica ac chronica generis vasorum lymphaticorum aut congestio, aut inflammatio eaque peculiaris, quam quae morbo vigente observantur ulcera, ophthalmiae, motus febriles, dolores, aliaque symptomata declarare videntur: quae quidem inflammatio lymphaticorum tardissima, utrum lymphae dyscrasia suscitetur, an vero ipsam faciat, fateor me ignorare, nec facile sciri posse, credo.

ALIBERT multis verbis lectoribus persuadere conatur, esse a syphilide morbum, cui tamen hypothesei obstat recentior hujus origo. Doct. SIMON doctrinae homoiopathicae patronus tum a psora, sive scabie, tum a lue, tum a sycosi vitium hoc repetit atque inde sulphur, mercurium et acidum nitricum thuyamque, cujusque virus specifica, tanquam antiscrofulosa propria proponit.

Argumenta vero, quae pro nostra thesi militant, sunt: aetas, qua nasci solet, vigentis scilicet generis lymphaticorum, tempus, quo augetur, venale, inflammatorium illud; morbi eventus, inflammationum similes; medicaminum denique derivan-

tium, revellentium, mercurialium utilitas summa. Caeterum si quis peculiarem subesse cachexiam, principium ac fontem heteroplasiae tuberculosae contendat, me ab hac ejus sententia non admodum alienum profitebor.

Prognosis petenda est a morbi origine, gradu, sede: ab aegrotantis aetate, viribus, conditione; a symptomatibus activis caet. A morbi origine ducitur prognosis; utrum haereditarium malum, quod difficulter tollitur. A gradu: utrum in primo, an ultimo stadio versetur, quod denotant: atrophia, febris hectica, morbi articulorum, aut ossium. A sede: utrum externa, num interna: pulmonum, mesenterii, viscerum nobiliorum. Ab aetate: utrum infantum, puerorum, an puberum, adultorum morbus. Illi medetur subinde natura, ea, quae pubertatis tempore contingit, metamorphosi: genere lymphaticorum arteriarum generi cedente. Saepius vero hanc medelam tantummodo adparentem esse atque scrofulosin alia forma repullulare, monet HAMILTONUS atque exemplis phthiseos pulmonum, abscessus lumbaris, ophthalmiae scrofulosae, surditatis rem probat.

Ad salutaria naturae molimina referre quoque oportet: faciei, capitis efflorescentias, profluvia serosa, purulenta, tumores externos, interno morbo emendato, auctum urinarum, alvi fluxum. Juvant igitur: impetigines, tinea capitis, otorrhoea, coryza, blennorrhoeae, quae tollunt plethoram se-

rosam, nec non ulcera externa, tamquam fonticuli naturales spectanda: urinarum profluvium; quo loco MEADIVS animadvertit, multa antiscrofulosa diuretica esse: juvat diarrhoea, tollendo gastricam coluviem, aut verminosam ac minuendo simul plethoram serosam. Chronica vero diarrhoea, aut colliquativa, quaeque stadio ultimo fit, damnanda est. Febris interdum saluti est, interdum pernicipi. Saluti est, initio morbi, tamquam efficacissimum alterans, tumores strumosos discutiendo, secretiones restituendo, excretiones augendo morbumque aut lysi, aut crisi solvendo. Pernicipi febris symptomata, hectica, suppurationis et colliquationis aut socia, aut pedissequa.

Si absque evacuatione, aut caussa quacunque manifesta dispareant tumores externi, aut efflorescentiae cutaneae, metus est, ne viscera interna perierit morbus. Nimirum haec ubi ita sint, monentibus viris experientissimis KORTUM, HUFELAND; RICHTER, semper timendum, ne malo omine scrofula externa in scrofulam internam mutetur, aut diathesi non sublata, majori pertinacia revertantur pristina mala.

In curatione potissimum diaetae ratio habenda est. Victus sit animalis magis, quam vegetabilis isque modicus et adcommodatus corporis motui: hic creber sit in aëre puro, sicco, quantum quidem id fieri possit. Hujus enim aëris salubritatis, quanta habenda sit cura, omnium optime, nostro quidem

judicio, explicuit medicus peritus BAUDELOQUE l. sup. laud.

Ut victus farinosus, aut pinguis nocet, sic prodest ex carne recenti, jusculis carniū, ovis sorbilibus, oleribus, cerevisia bene parata, aqua cum vini pauillo, aqua Selterana similibusque. Somnus sit parcior, vitetur ignavia, immundities. Vestimenta, stragula saepe mutantur, lavetur corpus balneo calido, si tumores spasmique solvendi; frigidum, maris praesertim, si corporis habitus laxior emendandus restituendusque partium tonus: frictiones, quibus post balnea utendum, optime fiunt pannis de lana, aromatum vapore impraegnata. In hisce cunctis summa ponenda est spes sanationis, nec raro his utendum est praecipue.

Remediorum, quae ex fonte therapeutico petuntur, triplex genus est: evacuantium, resolventium, tonicorum.

Evacuantia sunt potissimum vomitoria et purgantia: ex illis stibiata, ex hisce: rheum, aloë, jalappa, mercurius. Nempe gastrica in scrofulis cum saepe complicatio sit, praesertim in scrofula mesenterica, adeo ut sursum deorsumque ejici debeat colluvies saburralis, illud, siquidem opus sit, optime perficietur tartaro emetico, quo non tantum emesis, sed etiam catharsis concitabitur simulque salubri vomendi moliminum eventu, omne concutietur corpus. Purgantia, potissimum drastica et ex his jalappae radix laudantur, quo magis



moveatur corpus et depleatur lymphaticorum genus: quamobrem ipsi mercurium dulcem jungere solent. Ex quo censu est pulv. Basilicus, ex mercur. dulci, scammon et jalapp. ãã, quo infantum scrofulas feliciter curavit THO. WHITE. Sin vero infirmis intestinis prospiciendum sit, iisdem praeceunt aloë et rheum, quae magnis meritisque encomiis celebrat HUFELANDUS. Catharticis illis utitur aut emetocatharticis Nosocomii infantum Parisiensis medicus BAUDELOCQUE, ita ut reliquis ea interponat, tum ne illis nimium corpus adsuescat, tum ut decompositionis et compositionis acceleretur motus, quo quidem organismi cachectici in organismum sanum mutatio perficienda est.

Resolventium antiscrofulosorum et ingens numerus est et indoles varia: salina, saponacea, antimonialia, mercurialia, narcotica, sedantia, stimulantia calidiora, amaricantia, amara, gummi ferulacea hoc nomine a medicis commendantur.

Ex salinis reliquis praecellit aqua marina, quam magnis laudibus extollit RICH. RUSSEL, qui de ejus usu in hac valetudine librum singularem edidit. Hanc crebro expertus sum efficacem eique pueri prompte adsuescere solent. Ejus usum vetant inflammatio, suppuratio glandularum, motus febrilis.

Saponacea, alcalina, aqua calcis prosunt, ubi acor primarum viarum aegrotantes molestat.

Antimonialia, mercurialia (sine quibus, rem priam jam notante HEISTERO, ophthalmia scrofulosa

sanari nequit) utiliter secum invicem copulantur; qualis copula est in formula Plumneri, quo nullum novi praestantius antiscrofulosum. Formulæ additur interdum ex narcoticis cicuta, sive conium maculatum, jure a STÖRCKIO celebratum, vel etiam hoc sine iisdem utiliter adhibetur.

Inter calidiora, HUFELANDO auctore, celebranda est barytae muriaticae virtus, cujus dr.  $\beta$ . solvitur aquae uncia, quam tamen minus efficacem experti sunt alii. Certe nec omnibus aegris, nec omni morbo scrofuloso convenit. Aequum de hoc remedio praestanti judicium tulit medicus Parisiensis A. C. BAUDELLOCQUE, lib. laud. Calidiora etiam sunt: gummi ferulacea, inprimis asa foetida, quam in scrofula mesenterica profuisse animadverti saepius. Universe tamen monendum est, singulorum selectum fieri debere secundum ipsam et morbi et aegri conditionem.

In scrofula propria a calidioribus quibusvis abstinendum atque utendum est lenioribus: antimonialibus, mercurialibus, parca dosi, aqua marina similibusque. Ubi spasmodici quid subest, sedantia, narcotica: cicuta, aqua laurocerasi adhibenda; quemadmodum in torpore et laxo corporis habitu ad calidiora, stimulantia: g. ferulacea, aloëtica, guajacina deveniendum est: quibus praecipue locus est in scrofula mesenterica; a quibus tamen prudenter cavebitis, ubi tumores doleant, inflammantur, exulcerentur.

Nuper jodii fuit perquam celebrata ad strumas, virtus: quam si cognoscere velitis, adeatis laudatum saepius Nosocomii infantum, quod Parisiis est, medicum, qui hoc praecipue medicamentum adhibuit ejusque et efficacitatem expertus est magnam et optimam docuit administrandi methodum.

Est morbus scrofulosus congestio serosa, lymphatica, quae sponte inclinatur in chronicam phlogosin. Haec igitur omni ope praecavenda, tollenda plethora serosa, et ad congestionis indolem curatio dirigenda. Sicubi ad inflammatorium genus magis accedat congestio, subantiphlogistica, si ad spasticum, antispasmodica, sin denique ad passivam indolem, calidiora auxilia adhibenda sunt. Quoniam vero tempore verno major est in corpore universo incitatio, hoc etiam tempore huic morbo facienda est medicina: quo simul major est succorum antiscrofulosorum vegetabilium efficacitas.

Caeterum ut morbus est chronicus, ita in iisdem remediis admovendis persistendum est diu.]

Tonica antiscrofulosa potissimum sunt cortex Peruvianus, martialia, aquae minerales martiales.

Corticem laudant medici Angli exque iis FOTHERGILLIUS. Adhibendus est, ubi nulla colluvies, nulla universi systematis inflammati indicia, ubi habitus infirmus est; ubi magna est, corpus exhauriens suppuratio, praesertim in partibus externis. Nam ulcera interna raro corticem admittunt. Utiliter cum eo alia antiscrofulosa propria: cicuta, aqua

laurocerasi, ex antimonio parata copulantur: ita tamen, ut si haec adhibeas, non eadem formula comprehendas, ne alterum altero decomponatur: aut vis ventriculo inimica corrigitur addito cortice Winterano (FOTHERGILLIO auctore).

Ex martialibus aliis anteponunt; limat. ferri, tinct. martis tartarisatam sive aperientem et flor. sal. ammoniac. martiales, quorum in connubio morbi mucosi cum morbo scrofuloso eximia virtus est, denique aquas minerales martiales: Fachingenses, Spadanas, Pyrmontanas; Driburgenses caet.

Est autem aquarum mineralium multiplex genus et ratio: ut aliae sint purgantes, aliae roborantes, aliae solventes ex genere medio. Hisce tantam tribuit potestatem CULLENUS, ut ab iis potissimum morbi scrofulosi sanationem expectaverit (*Practice of Physic*. II, pag. 440.).

Coffea tostarum glandum quercinarum inter remedia tonica domestica ab HUFELANDO numeratur: quarum tamen vis antiscrofulosa mihi plurimum dubia habetur.

Horum etiam multa ipsis locis affectis utiliter admoventur magnaue est ulcerum artificialium in hoc morbo efficacia. Quoad topicum horum medicaminum usum, laudantur fomenta, cataplasmata ex herbis antiscrofulosis, emplastra mercurialia, de conio maculato, gummosa et usus aquae marinae externus; cauteria denique. Fonticuli, setacea tantae sunt virtutis antiscrofulosae, ut iis eorum, quos

curavi scrofulosorum sanationem, magnam partem tribuam. Naturam enim imitantur et tollendo plethoram lymphaticam simul a partibus affectis internisque humores derivant revelluntque.

Quantopere vero topica repellentia nocere possint, exemplo hocce monstravit PORTALLIUS (cf. BAUMÉS, pag. 341.). Puella circiter 18 annos nata, bene respondentibus menstruis, glandulas colli habuit tumidas, praesertim hyemali tempore per quinque annos continuos. Parentes complura topica adplicare curarunt adstringentia, neglectis remediis internis: detumebant glandulae: verum brevi postea emaciari, tussire, aegre spirare et febricitare coepit juvencula et tandem ex phthisi obiit.

Prius autem, quam hunc de therapeia locum mittamus, fructuosum erit, principum medicorum medendi rationem, seu praxin antiscrofulosam commentari. Itaque notandum, RUSSELLII aegros praeter aquam marinam, aliis quoque remediis vegetabilibus, animalibus, mineralibus: emeticis, spongia usta, praesertim vero aethyope minerali (ex mercur. et sulphur. coalitis) fuisse usos. Unus tamen exstat isque memorabilis casus (Hist. 32.) aegrae, quae pintam aquae marinae quotidie bibens catameniorum turbas, appetitus defectum omniaque mala strumosa pulsit. Ex WHITEI aegris 22, mercurio varia forma sanati sunt 16: caeteri, qui eo non usi sunt, habuerunt abscessus apertos, aut ulcera, cort. Peruv. myrrha, sarsapar.

curanda. Infantibus dabat cum drasticis: scammon, jalapp. in pulv. Basilico: adultioribus vespere calomel, altero mane sal polychr. praescribere solebat. HAMILTONUS in 8 casibus mercurium adhibuit, ex 34, quorum apud eum facta est mentio. Aliorum 26 meminit non ad curationem, sed ad morbum describendum ejusve exitum varium. Una cum mercurio etiam alia praebeuit: cicutam, salina, cort. Peruv. caet. Sed omnium palmarium erat mercurius: cui propterea magna pars sanationis adscribenda videtur. GEORG. HENNING inter deobstruentia primas etiam tribuit mercurio, aut soli, aut cum stibio: quae formula Plummeri. Ex qua auctorum collatione sequitur, mercurium et antimonium efficacissima esse auxilia ad emendandam cachexiam scrofulosam, usu comprobata, cui ex peritissimi BAUDELLOCQUE testimoniis, jodium etiam adnumerare oportebit.

In compendio vobis tironibus tradidi praecipua, quae a scriptoribus medicis de hac cachexia sunt adnotata. Dolendum est, desiderari hactenus morbi monographiam suis numeris absolutam, id est eam, qua omnes illius formae sive in corporis visceribus, sive in cute partibusque externis sese manifestet, describuntur atque simul remedia antiscrofulosa tum externa, tum interna, tum simplicia, tum composita, collectis undique auctorum testimoniis, recensentur ac dijudicantur. Quo demum labore peracto, plenior sperari poterit morbi scrofulosi historia.

---

 DE RHACHITIDE.

Anglos fuisse primos, qui de rhachitide scripserunt auctores, inter eruditos constat, sive quod in Britannia praesertim endemicum est hoc vitium, sive quod hujus regionis medici ad eum majori cura mentem adverterunt.

» Innotuit primum hic morbus (sunt verba FRANC. GLISSONII, in *Tract. de Rhachitide*, Lond. a. 1650. edito) quantum quidem ex aliorum relatione, diligenti facto examine, colligere potuimus, in occidentalibus Angliae tractibus, in Comitatu scilicet Dorset et Somerset, triginta circiter retro abhinc annis. Ab eo tempore paulatim ejus notitia ad alia quoque loca derivata est, Londinum puta, Cantabrigium, Oxonium, immo omnes pene australes et occidentales Angliae partes: in septentrionalibus autem Comitatibus multo rarius hic morbus occurrit et vixdum vulgo communiter est factus notus.

Caeterum nomen morbi vulgo receptum apud eos, quibus is familiaris, est *the Rickets*; quis vero primus morbum hoc nomine donaverit, valde est incertum, ut et qua occasione id factum casuve, an consilio."

Utrum a vocabulo Graeco *ῥαχίς* vel *ῥαχίτης* no-

men Anglicum ductum sit, quae GLISSONII esse conjectura videtur, vos si lubet perquiretis.

Magis refert, veram morbi speciem ex primis illis de eo auctoribus cognoscere. En brevem, sed accuratam descriptionem ARNOLDI BOOTH *Obs. Medic. de Affectibus Omissis* Lond. 1649. cap. 12. de tabe pectora! » Pectoream tabem adpellamus non quae intra pectus sedem habeat, quo pacto phthisis pulmonia eo nomine comprehenderetur; sed in qua ipsa pectoris crates vitietur: id quod fit in morbo, quem hic describendum sumimus. Est autem is puerilis duntaxat, seu infantilis et vulgatissimus in Anglia; uti et in Hibernia ab aliquot annis, ubi antea solebat rarissimus esse ac vix cognitus. Invadit autem non grandiusculos tantum infantes, sed et valde teneros ac recens natos: sicuti contra rarissime illos trimis majores adoritur et ut plurimum intra bimatam se continet. Multae corporis partes in hoc morbo afficiuntur: pectus, caput, artus, aliae; sed prae omnibus ac ante omnia pectus, cujus pars anterior, quae lata esse debebat ac plana, angustior fit; et utrinque acclivis, in medio seu sterni regione altius assurgit, tandemque prorsus carinatur. Costae inferiores, ad latus foveae ventriculi introrsum retrahuntur, quamquam utrinque velut scrobem faciunt totoque sui ductu quibusdam velut nodis asperantur ac inaequales fiunt. Vitiata pectoris figura respirationem facit impeditiorem ac crebri-



rem, cui etiam tussicula plerumque sicca comitatur. Caput grandescit ultra debitum modum; ac proportionē inferiores corporis partes, coxae, femora, crura extenuantur ac debilescent; unde infantes incessui inepti redduntur, non modo illi, qui nunquam adhuc eo usi fuerant, sed et qui firmiter admodum agiliterque incedere ac discurrere coeperant, diu antequam hoc morbo prehenderentur. Dorsi spina in multis curvatur atque arcus instar in exteriora flectitur. Ossa articularum in brachiis ac cruribus, non omnium, sed carporum ac talorum augentur ac tantopere protuberant, ac si duplicata fere esset eorum moles: unde etiam *doubling of the joints*, id est juncturarum duplicationem id vitium nominant Angli. — Praeter haec omnia dextrum hypochondrium tumescit totum. — Tumor iste cum pectoris aliqua angustia statim in ipso morbi initio adparent; sic ut interdum quidem ambo ista simul eodemque tempore se prodant, alias vero vel hoc vel illud alio nonnihil antea sit: nodi in costis ac scrobes istae in imis oris pectoris postea accedunt; quando etiam pectus fit magis magisque angustum. Capitis incrementum istis posterius est; nisi quod pectus toto morbi decursu arctius redditur, donec ad summam angustiam deventum sit, sicut carinae instar acutum fiat ac promineat; quod fere non fit, nisi paucis ante mortem diebus. Est enim lethalis hic morbus, si vel negligatur penitus, vel sero aut pra-

ve curetur; plurimosque quotidie absumit: neque ullus est annus, quo non aliquot millia infantum eo pereant. Articulorum granditas fere nonnisi ultimo loco supervenire solet: quamquam multi sunt, qui eam nunquam patiuntur ac moriuntur, prius quam ad eam deveniatur; sicuti rursus ex iis, quibus illa accidit, permulti evadunt, etiamsi incuriosius habeantur; quippe haud ita periculosa est illa tabis pectorae species, quae hoc symptoma trahit, quam quae eo caret."

Hisce, ut compleamus morbi historiam, observata quaedam GLISSONII subjungemus, Praeter irregularem partium proportionem: caput justo majus faciemque habitiozem respectu reliquarum partium; membra externa musculique totius corporis graciles et emaciati, quasi atrophia vel tabe absumpti cernuntur. Cutis universa flaccida et quasi pendula laxaque, instar chirothecae adparet, ut plus carni eam continere posse putes. Circa articulos protuberantiae in ipsis ossium extremis, praecipue in eorum epiphysibus radicatae, articuli artusque minus firmi ac rigidi minusque inflexibiles sunt, quam alias solent observari in defunctis. Pectus exterius macrum, valde angustum, praesertim sub alis et a lateribus quasi compressum, sternum non nihil acuminatum, instar carinae navis, aut pectoris gallinae. Costarum extrema, quibus cum cartilaginibus committuntur, nodosa sunt, quemadmodum de articulis carpi et tali animadversum est

etc. Hepar in omnibus justo majus. — Mesenterium aliquando inculpatum, aliquando glandulis justo majoribus, si non strumis affectum. Crebri pulmonum infarctus, aut tumores, aut abscessus et empyemata: interdum in cavea thoracis aquae serosae collectae: thymus magnus. Dura mater firmius cranio adhaerens. Inter duram et piam matrem atque in ipsis ventriculis cerebri serosae aquae in nonnullis repertae sunt: unde patet affectum hunc cum hydrocephalo complicari posse: Carotides justo ampliores, similiter quoque venae jugulares: arteriae vero venaeque ad exteriores partes delatae multo exiliores: quod num perpetuum sit, nondum adserere se posse, verum suspicari quidem, ita se rem habere perpetuo, monet auctor.

Haec si conferre velitis cum iis, quae quotidie in rhachiticis observantur, naturae speciem exprimere reperietis.

Creditur morbus a nono mense ad tertium aetatis annum infantes prehendere. » Asserimus, inquit GLISSONIUS, morbum hunc rarissime infantes mox a partu, aut ante semestrem aetatem, imo forte ante nonum mensem corripere. Ab illo tempore vero paulatim incipere, frequentius in dies grassari, usque nempe ad primum aetatis annum completum cum dimidio. Inde frequentiam quasi *ακμην* suam attingere et in eadem quasi consistere, ad finem usque secundi aetatis anni cum dimidio, ita ut tempus frequenter invasionis sit annus ille inte-

ger, qui mox primum sesquiannum a partu sequitur. Exacto secundo anno cum dimidio morbus in dies minus frequenter invadere incipit." Haec ut vulgo vera est temporis nascendi ratio, ita rhachitidis et congenitae et adultorum exempla feruntur. Congenitae exemplum prostat in *Museo Anatomico Acad. Lugd. Bat.* Tab. CLXXIII. Vol. IV. Adultorum rhachitidem aliorum referre oportet, ad osteomalaciam nempe secundariam, quae ad eum, unde nascitur morbum revocari debet, atque a rhachitide protopathica, peculiari morbo infantum, sejungi; quamobrem variae species a PORTALLIO descriptae, ad unum morbi genus nequaquam pertinere videntur, sed ad suum quaeque morbum: syphilitica ad syphilidem v. c., arthritica ad arthritidem et sic porro.

Caussarum remotarum numero comprehendunt, praeter seminia: aetatem, parentum valetudinem, diathesin haereditariam, quaecunque vitam reproductivam organicam debilitant, potentias: pravam nutricem, habitationem in locis obscuris, humidis, paludosis, abusum narcoticorum, longas valetudines infantum, in nutritionis officinam pertinentes caet.

Causa proxima in genere lymphaticorum ipsaque nutritione prava tam ossium, quam reliquarum partium ponenda est: eaque propter, neque immerito forsitan, nonnulli rhachitidem ad evolutionis impeditae morbos referunt atque vitae foe-

talis in infantiam protractae speciem. Malfatti Italus, cujus haec hypothesis est, recte etiam distinguit inter scrofulam et rhachitidem quarum ut altera in genere lymphaticorum et glandularum, ita altera in ossibus primario manifestatur. Praeterea, ut bene vidit Joh. Wendt, rhachitis tanquam morbus atonicus, scrofula propria tanquam morbus floridus spectandus est; aequilibrium vero turbatum inter acidum phosphoricum et terram calcaream in ossium formatione minus recte caussa rhachitidis, quam effectus nutritionis aegrotantis habebitur.

Symptomata morbi, Glissonio interprete, haec sunt: laxitas et mollities partium, debilitas et languor, ignavia et torpor. Si intra primum annum pueri hoc morbo infestentur, tardius solito pedibus insistent et plerumque prius loquuntur, quam incedunt, quod vulgo apud Anglos mali ominis reputatur. Sin postquam ambulare coeperunt pueri, hoc affectu corripiantur, paullatim infirmius pedibus insistent atque inter incedendum saepius vacillant levique de caussa titubant, aut etiam cadunt. Grandiores facti jamque pedibus commissi minus alacriter hinc inde cursitant, citius defatigantur, potiusque sedentes, quam pedibus insistentes ludere amant, neque sedentes quidem cum vigore corpus suum erigunt, sed id inclinantes modo antrorsum, modo retrorsum, modo ad alterutrum latus quaerunt sustentacula, quibus re-

cumbentes ignaviae suae auxilium praeboant. Vulgo moderate tum dormiunt, tum vigilant, ingeniosi sunt, non stupidi, immo praecocis solent esse ingenii, nisi aliud quid obstat. Vultum videre est magis compositum et severum, quam aetas postulare, ac si in rem aliquam seriam meditabundi essent. Caput justo majus est, facies plenior ac floridior, partes carnosae infra caput magis indies atteruntur, extenuantur. Protuberantiae et nodi circa nonnullos articulos maxime in carpis, minus paullo in talis, ac similes quoque cernuntur tumores in extremitatibus costarum. Ossa nonnulla incurvantur, praecipue tibiae et fibulae (\*), hinc ossa ulnae et radii, sed paullo minus et infrequentius, aliquando etiam ossa femoris et humeri. Nonnunquam decurtatio quaedam ossium deficiensque eorum accretio secundum longitudinem observatur. Hinc nonnulli pueri affectu hoc diutius afflicti pumiliones fiunt. Demum irregularis quaedam ossium capitis protuberantia, maxime ossis frontis antrorsum, huc quoque referri potest. Dentibus tum tardius, tum molestius erumpunt, levi occasione vacillant, aliquando nigrescunt, aut etiam frustulatim excidunt. In horum locum plerumque novi tarde ac laboriose succrescunt. Pectus in ul-

---

(\*) Hujus curvaturae notabile exemplum prostat in *Musep Anat. Lugd. Bat.* Tom. II. Tab. V.

teriore morbi progressu a lateribus angustior redditur, anteriùs acuminatur, contra subtumida quaedam abdominis repletio est et tensio hypochondriorum. Denique venae et arteriae in partibus primo affectis graciliores sunt debito minusque conspicuae, quam in emaciato corpore exspectares, in facie vero excedunt proportionem debitam. Saepius dyspepsia est magnaque voracitas et ructus acidi et alvus irregularis et urina turbida, lactea, mucosa, notante WENDTIO: qui docens, rhachiticos non semper ingenio excellere, in rei fidem Cretinismum citat, tanquam summum rhachitidis gradum (\*).

In definienda prognosi, sunt verba illius, quem saepius laudavimus, WENDTII, tam praesens, quam futurum spectare decet. Rhachitis, nisi quaecunque noceant potentiae amoveantur ac recta legitimaque fiat curatio, desinet tandem in atrophiam, aut hydropem. Ante omnia notanda est aetas cum morbi, tum aegri. Morbus quo adultior, aeger, quo junior, eo pejor exitus. Quae ex aetate fiunt in corpore mutationes, saepenumero morbum solvunt, aliis tertio, aliis septimo, aliis decimo quinto aetatis anno. » Multos novimus, inquit GLISSONIUS, solo beneficio aucti caloris, sive incremento

---

(\*) Eodem Cretinismum loco habet ACHERMANNUS, in libro de hoc hominum genere, Gothae a. 1790. edito.

aetatis, sive exercitiis sanatos absque ope medica, quos nemo amicorum affectos putaverat.

STOERCKII filius 3°. aetatis anno, BUCHNERI puella 7°. anno morbum spinalem exuit, ISENFLAMMII adolescens 15°. aetatis anno, sine ullo deformitatis vestigio fuit, qui quinto aetatis anno pessime erat conformatus. Etiam TRILLERUS circa pubertatis annos nonnullis rhachitidem abire, testatur.

Uti laudant nonnulli cutis efflorescentias: impetiginem, scabiem, sic damnant narium haemorrhagias, oedemata, febriculam vespertinam, corporis maciem et faciei collapsum.

Haec praesentis sunt morbi discrimina: magis etiam timenda futuri, ex relictis ab eo formae vitiis: spinae, thoracis, pelvis. Ex spina et thorace cyphosis, lordosis, scoliosis: unde asthmata, dyspnoeae, pulmonum, cordis, vasorum (\*) vitia organica, pectoris hydropes, caet. Ex pelvi vitiata partus calamitosus. Ex artubus motuum impedimenta, incessus turpis, vacillans, incertus.

Esse ossa molliora et flexibilia interdum instar cerae conjectarunt aliqui: negavit GLISSONIUS; probarunt ab aliis facta in cadaveribus rhachiticorum

---

(\*) Aortae ex spinae curvatura deflectentis exemplum cer-  
nitur in *Museo Anat. Acad. Lugd. Bat.* Tom. IV. Tab. 51.  
Quo loco notat vir clar., propter deficientem stricturam,  
quae plerumque animadverti solet, verosimile esse, minus  
perturbatam fuisse sanguinis per aortam circulationem.



pericula. In STOERCKII infante bimulo brachiorum ossa usque adeo mollia fuerunt, ut instar cerae perscindi se siverint. Puellae rhachiticae, 12 annos natae, ex cachexia mortuae femur medium, qua parte substantia compacta esse debuit, tenui scalpello suo uno ictu quasi lardum in orbem discidit STRACKIUS. In puero rhachitico undecim annorum, observante RUAFFIO, adeo mollia fuere ossa, ut incurva tibia aliaque scalpello discindi levi nisu potuerint, sanguine turgentia. Utroque in latere, ubi sternum costis unitur, insignes aderant nodi discissi, sanguinem stillantes. Dorsi etiam vertebrae cultri acies facile divisit. Ac licet non ubivis tanta sit ossium mollities ac flexilitas, utramque tamen sive praesentem, seu antecedentem indicant eorum curvaturae et vitiata forma. Absorbetur videlicet pars terrestris, i. e. phosphas calcis atque os in cellulosum parenchyma solvitur. Rem more suo interpretatus est ANT. SCARPA, vir immortalis: » Commutationis hujus, inquit, transitusque duri, compacti corticis ossium in cellulosa, spongiosam, osseam substantiam eximium quoddam aliud exemplum suppeditant ossa miserrimorum puerorum, qui rhachitide tentati decedunt. Nempe hujusmodi ossa vi morbi terreis particulis spoliata, seu necessario roboris et opacitatis elemento fraudata, mollia et pellucida tantopere evadunt, ut cultro facile excindi queant, iisque prorsus sint similia, quae diutina maceratione in acidis mineralibus,

aqua dilutis, subducta terra mollescunt. Morbosa id genus ossa parenchymati ossium cartilagineo similia et mollia valde sunt, et flexilia et ultra quam dici potest, intus rarefacta et spongiosa. Etenim secta secundum longitudinem ac in oleo terebinthinae suspensa, gelatinae ad modum translucent textumque ipsorum penitiorem exhibent tenuiter utrobique reticulatum; singulatim vero mollis laxati et expansi corticis fabricam primigenam cellulosa prorsus esse plane aperteque evincunt atque confirmant. Tab. II. fig. III. l. l.

Pervolventes PORTALLII monographiam crederetis forsitan, rhachitidem esse morbum secundarium, eumque ut plurimum originis syphiliticae: quae monographia utut eximia tantoque viro nequaquam indigna, tamen aliqua eget interpretatione, ut a vobis in arte ac studio tironibus cum fructu legatur.

Est igitur notandum, rhachitidis nomen latiori sumpsisse, quam a primis illis scriptoribus quique eos secuti sunt, sumitur, significatione, ut quas-cunque adutorum etiam cujuscunque originis *curvaturas spinæ ossiumque* hac denominatione comprehenderit.

Quaerentes vero, utrum posset rhachitis secundaria ex labe venerca parentum nasci, reperietis ante PORTALLIUM jam rem indicasse Jo. VEIRAC celeberrimum inter Roterodamenses medicum, in Commentatione, quae praemium aureum tulit a Societate artium et scientiarum, quae Trajecti ad

Rhenum est, anno 1792. Quatuor observationes profert, quae probant rhachiticos pueros ex parentibus syphiliticis fuisse procreatos, verum in hisce una cum symptomatibus rhachitidis indubia fuere symptomata luetica. Ex his una est, de qua utrum nutrix culpanda sit, posset quaeri: qualia exempla complura etiam citat PORTALLIUS: in quibus etiam, quatenus diserte describuntur morbi signa, non deſerant luis indicia, saepius magis etiam, quam rhachitidis manifesta.

Unam ex multis citabo, non unam ob causam notabilem. Infans Parisiis rus ad nutricem deferretur, quae ex eo contraxit syphilidem: nutrix maritum, maritus amicam infecit sicque contagione propagata, totum ferme pagum virus venereum inquinavit. Parisiis mittuntur, qui rem perquirant, medici. Hi, brevi tempore, et nutrices et tenellos ex syphilide esse aegros hancque calamitatem alias etiam domos afflixisse, comperiunt. Infantes habebant costas versus sternum nodosas, ossa carpi tumescientia, spinam, artusque inferiores incurvatos, ventrem tumidum, renitentem. Pallentes et extenuati complures nullum monstrabant syphilidis in genitalibus signum; alii et haec et cutim ulcusculis et pustulis tectam. Complures non alia habebant symptomata, quam parvas pelliculas albas in lingua, aut in velo palatino aphthas perpetuo recrudescentes. Cuncti illi aegri mercurio fuerunt curati. Intelligimus, quamvis relationem paullo

ampliores optaremus, in nullis defuisse prorsus morbi duplicis complicatque notas.

Neque aliter se res habet in rhachitide scorbutica, arthritica, scrofulosa; quarum hanc, propter utriusque morbi cognationem, plurimi varietatem magis, quam speciem nuncupabunt. In ea cum ossium vitio tumores glandularum colli aliarumque partium, affectiones pectoris, caries scrofulosa animadvertuntur.

In rhachitide scorbutica maculae scorbuticae, tumor sanguifluus gingivarum, dentium vacillatio eveniunt. Hanc etiam nigredo et fragilitas dentium significant. Rhachitis arthritica et rheumatica PORTALLII, me iudice, nihil aliud est, nisi arthritidis ossium, ipsi MORGAGNO haud ignota, qui » et rheumaticis quidem, inquit, atque arthriticis non semel contigisse, ut flexibilia ossa fierent, docent observationes." Exemplum autem a PORTALLIO prolata adulterum sunt atque tam parum rhachitidem referunt, ut frustra quaesiverim rationes, quibus nomen morbo vindicari posset. Cernitis igitur, quae antea monui, morbos dispares uno sub nomine comprehendisse PORTALLIUM et priores illius species non simplices esse, sed compositas ex rhachitide cum syphilide, cum scorbuto, cum scrofulosi; sique emollitio ossium sola rhachitidis character haberi debeat, omnem posse ossium inflammationem rhachitidis nomine insigniri.

Ac de emollitione quidem problema est, quod

sibi proposuisse medici videntur: quorsum defertur materies ossium terrestris. Aliis urina excerni, aliis aliorum deponi, placuit. Rei testimonia videte apud TRNKA DE KRZOWITZ in *Hist. Rhachitidis etc.* pag. 75 sqq. alterum est rhachitidis natae, ut videbatur ex fractura, alterum materiae osseae, errore loci, ad pulmones delatae: de utrisque hodie ea, qua gaudemus cognitione theoretica, dubia moveri possent gravissima.

Altera de *acido rhachitico* hypothesis, qua solverentur ossa, ex novis experimentis duumvirorum celeberrimorum TIEDEMANN et GMELIN de succo gastrico acidum muriaticum habente aliquam veri speciem ducere posset, si cum iis conferatis experimenta SCARPAE, qui acido muriatico ossium compaginem solvit, et thesin addatis VEIRACCII nostratis, acidam esse sanguinis in hoc morbo dyscrasiam. Verum haec theoria, quam victu ex lacte in acidam fermentationem prono probare conatur VEIRAC, mihi chemica magis, quam physiologica videtur: saltem adhucdum ejusmodi acida sanguinis dyscrasia magis conjecturalis, quam argumentis demonstrata censebitur.

Curatio rhachitidis ab aliis alioque tempore aliter fuit proposita.

Solebant medici antiquiores, uti omnium morborum, sic rhachitidis etiam curationem ab evacuantibus tum emeticis, tum purgantibus ordiri, deinde antacida saponacea, alcalina praescribere;

tandem roborantia : tonica , amara , peruvianum corticem , praecipue vero martialia. Omnium optime , nostro quidem iudicio , emendavit hanc methodum Jo. VEIRAC. Is incipiebat a lenioribus evacuantibus , ex ipecacuanhae praesertim et rhei radicibus , si post emesin catharsi opus esset. Interim victum praescribebat animale : ex jure carnis vitulinae , pane bis cocto , gelat. c. cerv. aqua parata et vitello ovi. Deinceps dabat alcalia , saponacea , etiam volatilia : ultimo loco ferrum , pulv. peruv. rubr. , rubiam tinctorum , thermas martiales , balnea frigida , frictiones , lectulum duriores commendans. Hanc curandi methodum exemplis illustrat , quorum alia monstrant , interdum post cachexiam emendatam demum roborandum esse corpus : alia saepenumero utramque curandi rationem esse consociandam. In exemplo primo , post adhibita evacuantia : ipecuanham primo , tum rheum et magnesiam et alvi lotiones , sub quorum usu morbus indies increcebat : ipse VEIRACCIVS curam suscipiens , saponaceis et alcalinis , interpositis subinde catharticis , morbum eo usque sanavit , ut balneo frigido , frictionibus vitaeque regimine relicta ab eo debilitas tolli commode posset. In exemplo altero , post alcalia volatilia adhibita , cortice peruviano absolvi curatio debuit. In tertio praeter emesin et catharsin solutione extr. cort. peruv. rubr. , addito sp. sal. c. cervi et tinct. ferri , frictionibus dorsi et artuum

ac balneo frigido usus est, eventu salutari. Nec dispar fuit curandi methodus in exemplo quarto.

Alii absorbentia reliquis anteponunt: ex quibus ostracodermata laudant HAENIUS et HALLERUS. Ille » aderat, inquit, Hagae Batavorum vir ex summis Reipubl. moderatoribus arcanum suae familiae possidens, quod gratis concederet parentibus, qui suos infantes rhachiticos dolerent. Initio praxeos meae communi methodo frustra infanti cuidam curando insudaveram: cumque brevi interiturus videretur, parentes metuentes a sumptibus, vólvere rem sibi demitti. Inaudierant interim arcani mox dicti laudes: adplicuere et ipsi ostenderunt mihi posthac eundem infantem sanum et vegetum. Casu contigit, ut collega mihi referret, se ex domestico amplissimi illius moderatoris rescivisse, totum arcanum nil nisi ostracodermata usta continere. Experimur: curas posthac inde fortunatas fecimus."

Rubiae tinctorum radix interdum profuisse dicitur. Nec tamen satis numerosa mihi videntur testimonia, ipsius salubritatem probantia: etiam crebro cum aliis juncta, neque immerito deinceps neglecta videtur.

Ex omnibus roborantibus nulla martialibus efficaciora: saltem nulla diutius famam virtutis sustinuerunt. Illud autem incommodi habent, ut aegre possint tenellis ingeri magisque vitatae haematosi partiumque carnearum imbecillitati, quam

morbo ipsi mederi videantur: cumque nonnulli perhibent, ex iis dentes nigrescere, ut ea propter matribus odiosa sint. Quae cum ita sint, nostras fortunas laudamus, quod remedium nobis datum sit et morbo par et aegris parvulis haud ingratum et acceptum matribus: oleum jecoris Aselli videlicet, cujus virtus antirhachitica nuper reperta indies magis idque jure merito celebratur.

Instituti ratio vetat, hujus remedii historiam perquirere et explicare. Nonnulla dumtaxat hoc loco vestrum gratia notabimus atque admonebimus, sperantes, fore ut vir aliquis eruditus, medicinae pariter ac chemiae organicae peritus nobis de hoc medicamine monographiam conscribat, numeris suis absolutam, multaque loca dubia, aut obscura rite interpretantem.

Gadus morrhua praesertim hoc oleum praebet; quod tribus modis paratur. Prior est, quo sponte exstillat, coloris olei olivarum, aut papaveris, alter, quo habetur ex hepate jam putrescere incipiente fuscum at pellucidum; tertius, quo igne paratur brunneum aut viridescens, acerbum, empyreumaticum. Ab aliis medicis prior, ab aliis posterior species laudatur: mihi haec empyreumatica nimis irritans, prior minus efficax, media efficacissima visa est. Infantibus praescribitur ejus cochlear parvum, grandioribus cochlear medium aut integrum, mane et vespere sumendum simulque bis de die spinae artubusque infricandum; ac



mirum est, quam prompte ingrato remedio adsuescant tenelli idque vel in deliciis habeant. Caeterum longo demum usu ac sub legitimo vitae regimine prodest, i. e. victu praesertim animali, motu corporis in aprico: sive curru vecti moveantur infantes, sive reptantes in arena, sole exsiccata; neque brachiis gestantur, nec sedeant totos dies in sellis; verum saepius decumbant levique motus genere utantur et balneo arenae. Ventriculo intestinisque debilibus alvoque fluente mucilaginea primo, deinde amara: lichen island. cort. Peruv., tandem martialia adhibenda sunt: quibus remediis antea solis uti solebam atque etiamnum, nec sine fructu utor, siquando oleum jecoris Aselli non ferant.

Nequaquam infitior, me ab hoc remedio prius alienum magis animum habuisse, quia cognoveram, quam parum novorum remediorum encomiis fidendum ac martialibus, quorum salubritatem toties expertus eram, prorsus contrarium hoc oleum videbatur. Nunc autem, postquam longo usu ipsius virtutem medicam compertam habuerim, fateor, me nullum cognoscere medicamentum antirhachiticum, quod cum hujus possim salubritate comparare.

Quod superest, curvaturae ossium ex rhachitide relictæ curatio mechanica mihi perquam restringenda, nec nisi circumspecte admodum ac prudenter adhibenda videtur. Longe minus profecto naturæ judiciis adaequata est ea curatio mechanica,

quam altera gymnastica, sine qua altera nulla est et qua sola tam nascentes praecaveri, quam natae curari ossium illae curvaturae poterunt: etenim *musculi ossa regunt*. Consuli de hoc argumento cum fructu poterit experientissimus medicus JOH. CHRIST. GOTTFR. JÖRG in *Handb. z. Erk. u. Heil. d. Kinderkrankh.* Ed. alt. Lips. 1836. cap. 21. pag. 928. et laudata ibi ejusdem auctoris scripta; nec non C. LACHAISE *Précis Physiologique sur les courbures de la Colonne vertébrale etc.* Paris 1827.

---

#### DE HYDROPE.

Hydropum familia praecipue regiones frigidas humidas tenet ac nostratibus notissima est. Idcirco nostra interest plurimum, quaecunque de ea scripto consignerunt auctores, colligere.

Hydrops adpellatur: congestio serosa, aut lymphatica in aliquam corporis partem, ex morbo facta. Quae ut intelligatur tenendum est, quemadmodum per cutim et pulmones perpetuo fit perspiratio externa, sic internam fieri in omnibus caveis nostri corporis perspirationem, quae in conditione maxime naturali, ut externa illa perspiratio vaporis forma prodit; sin vero sive copia augeatur, seu non rite resorbeatur, in humorem aut sudorem mutatur internum, partibus quibus inhaeret, molestum eas-

que et copia et stimulo suo laedentem: id est fit hydrops.

Est igitur vulgo spectandus hydrops tanquam sudor internus, qui ut sudor ille externus multas habere easque diversissimas causas potest ac cum externa perspiratione omnique humoris serosi in corpore secretionem arcta tenetur cognationis vinculo et tum ab illis impeditis, sive aëre frigido humido, in regionibus istis, ubi endemius est morbus, sive alia causa, provocari, tum iisdem restitutis, tolli ac resorberi saepenumero, animadvertitur.

Is pro ea, quam occupet sede: hydrocephalus, hydrothorax, ascites, hydrocele, anasarca dicitur; quae quidem ejusdem morbi species uno nomine generico comprehendi atque ad unum genus commune referri solent. Nimirum qui in capite hydrocephalus, qui in pectore hydrothorax, qui in abdomine ascites, qui in testibus hydrocele, qui inter cutim anasarca dicitur. Similiter distinguitur hydrops pericardii, ovarii, uteri atque vel in ipso viscerum parenchymate est, cerebri videlicet, pulmonum, vel inter membranas serosas: arachnoideae, pleurae, peritonaei harumve membranarum tractus peculiare: mediastinum, mesenterium, ipsas articularum synoviales; immo vix cavea corporis est ab hoc vitio plane immunis: quibus tamen omnibus commune est hydropis nomen et genus. Quare cum tot sint hisce affectibus

hydropicis communia, de illis primo universe dicam, adjectis deinde nonnullis, quae singulas species attinent. Ejusmodi conspectum generalem ad nostri potissimum instituti rationem pertinere, ipsi perspicitis. Nam cum ingens adeo sit morborum numerus, nec verbosus esse, nec ad particularia descendere possum; sed brevis esse laborans, illud praecipue mihi impositum esse arbitror officium, ut in hoc praxeos medicae labyrintho vobis itineris dux sim iisque vos instruam praeceptis universalibus, unde particularia possint quam facillima ratione duci atque intelligi.

- Stricto tamen sensu morbus proprius dicendus non est, sed plurimarum ac diversissimarum valetudinum effectus. Est illud nempe maximum nosologiae nostrae vitium, quod morborum formas ac species dum describit, causas naturasque negligat, quo incauti decipiuntur, existimantes, artificialem illam morborum classificationem naturalia comprehendere genera et species: unde multiplex nascitur errandi occasio. Quod ut saepius dixi, sic de hac quoque hydropum familia dicendum est, quae morbos continet minime naturae societate cognatos, sed ex multiplici gente copulatos.

Nam serosa illa congestio, licet specie ac facie externa convenire sibi quae similis semper esse videatur, origine tamen atque indole saepenumero est dissimillima, adeo ut ex opposito plethorae ve-

rae veracque inanitionis vitio succrescere posse deprehendatur. Quapropter vobis omnibus commilitones amicissimi! auctor sum, ut in praxi semper morborum investigetis naturas caussasque, neque nominibus istis vos decipi patiamini, verum ad therapeutices universalis praecepta artem omnem dirigatis, quod si sequamini monitum, salutarem facietis aegrotantibus vestris medicinam. Illius caussae remotae sunt: plethora, inanitio, vitae torpor, temperamentum phlegmaticum, lymphaticum, morbi praegressi, vitia organica, impedimenta circulationis, spasticae partium internarum stricturae, irritamenta quaecunque, cutis, renum, generis lymphatici functiones turbantia. Sub hisce enim, quae recensuimus, caussarum generibus singulae fere comprehendi facile poterunt.

Et secundum has quidem caussarum diversitates distinguuntur: hydrops calidus sive plethoricus, hydrops frigidus sive atonicus, hydrops spasticus, hydrops secundarius, metastaticus. Hae ut maxime practicae sunt hujus valetudinis species, sic singulas leviter perstringamus, quo melius et probabilem rei eventum teneatis et idoneam singulis curationem, deque remediis antihydropicis rectius judicetis.

Hydrops calidus igitur natus a suppressis aut intermissis, quibus corpus adsueverit, sanguinis evacuationibus, in corporibus juvenilibus, laute pastis, optime describitur a MAXIMILIANO STOLL in *Rat.*

*Lib. II. Pars I.*

*Med. Part. III. pag. 300 sqq.* » Hydropem quemdam (sic ille hoc loco de ea specie praecepit) videre erat, hinc inde quidem descriptum, minus tamen in praxi, ut videtur, cognitum, atque idcirco sinistra nonnunquam curatione vexatum. Is nobis hydrops plethoricus erat, seu ortus a plethora. Causas habuit aliis hydropis speciebus ferme oppositas; plethoram nempe et laboriosum abundantium humorum circuitum. Inde vasa sanguifera, cruore nimium distenta, aquosam portionem facillime demiserunt extruseruntque (\*). Sed ita dimissam difficulter receperunt: hinc aquae intra cellulosum corpus aut cava varia collectae hydropis eam speciem fecerunt, quam plethoricam appellabamus. Hydropis hujus genesin ipse mihi exemplo quodam illustrare conabar. Quemadmodum enim ultimo graviditatis tempore venarum iliacarum compressio abundantiam humorum in artubus inferioribus contentorum, sive topicam plethoram indeque crurum, femorum et pudendorum facit hydropem, sic plethoricis columna cruoris major, quam quae apte contineri vasis possit et expedite ad cor reduci, hydropem gignit. Hic morbus in corpora solum robusta, aetatis florentis et bene pasta, juxta nostras observationes cadit. Atque ex hac corporum, aetatis et vitae ratione, item

---

(\*) An per diapedesin, aut recentiorum endosmosin?

ex defectu caussarum, quae alias producere hydro-  
pis species solent, huic nostrae plethoricae oppo-  
sitas, hydropis hujus indoles cum eaque conve-  
niens medendi methodus innotuit. — Profuerunt  
autem phlebotomiae moderatae, sed aliquoties re-  
petitae et antiphlogisticus victus: decocta item  
emollientia, nitrosa, acidula, serum lactis cum ter-  
ra foliat. tartari. Quasdam hujus hydropis cura-  
tiones longo cremoris tartari usu perfecimus.

En hujus hydropis exemplum ex TISSOTI ad HALLE-  
RUM Epistola: » anno 1757. quinquagenaria proxime  
femina, intra turbas desinentis menstruationis, an-  
xias ducebat noctes, alimenta omnia fastidiebat;  
tumidissima gerebat crura parcissimeque rubrum  
mingebat lotium. Cremorem tartari suasi, omnino  
resedit inflatio, optima sanitas. Lapsis sex men-  
sibus eadem redeuntia symptomata eodem vici re-  
medio; idemque, me inscio, tertio insultui fauste  
opposuit.”

Nonne venae sectio menstrua perperam omissa;  
qua celebrata, qui biennio post secutus est icte-  
rus, potuisset forsitan anteverti? An vero prius  
jam morbi tandem lethalis futuri in corpore mu-  
lieris seminium?

En alteram hujus hydropis exemplum ex STOL-  
LII *Ratione Medendi!* » Coquus comitis St. \*\*  
quadrato corpore lacertosus, amplo thorace, bre-  
vique sed crasso collo, vigente hyeme pleuri-  
tide laborabat domi suae: aegre eluctatus dif-

ficilem in incessu et noctu supine decumbens respirationem querebatur; inter primos somnos veluti jamjam suffocandus evigilabat atque e lecto exsiliebat, auram capturus. Multas noctes sedendo transegit, crura valde tuebant aquoso tumore, uti etiam carpi. Hi vero modice. Pulsus amplissimi, tardi et instar chordae ferreae digitum ferientes. Aliquoties domi adhuc suae sanguinem emisit pleuriticum et cum aliquo, sed temporario levamine. Victu nihilominus pristino utebatur, carneo videlicet et vinoso; atque hoc quidem non raro meraciore, utpote multos inter labores et penes ignes incalescens. Exeunte vere mihi tradebatur. Usu squillae aliorumque remediorum urinas potentius moventium et crurum frictionibus intra breve tempus id est consecutus, ut noctu non excitaretur, aut excitatus non exsiliret. Disparuit intra paucas septimanas tumor crurum et manuum, thoracis incommodis sublatis. Discessurus a nobis cum pridie suas sarcinulas collegisset, hilaris et de recuperata valetudine sibi gratulatus, se lecto commisit: post mediam noctem cum ejulatu epileptice convellitur, inde apoplectico sopore pressus, vespere periit.

In cadavere cor triplo fere majus inventum est, ac alias solet offendi et giganteum; non morbose dilatatum, cum justa partium id constituentium proportio fuerit. Pulmones ubique laxiori cellu-



losa tela ambienti thoraci revinciebantur. Vasa encephali praegrandia et multo cruore (\*) distenta. Pauxillum aquae intra meninges diffusa.

Est alius hydrops huic adfinis inflammationis suboles, cujus exempla numerosa prostant in Epistolis Morgagnianis quemque nuper indicavit PINELLIUS *Nosogr. Philos.* III. pag. 72. et post PINELLIUM medici Francici. Hic potissimum post inflammationes membranarum serosarum chronicas nascitur: arachnoideae videlicet, pleurae, peritonaei seri effusione terminatas eumque inter nostrates etiam protulit SCHROEDER VAN DER KOLK, vir clar., in ejus *Obs. Anat. Pathol. et Pract. Argumenti* fascic. I. (qui solus hucusque prodiit) in cap. de *Hydrothorace*, pag. 15 sqq.

Hujus etiam census est hydrops post scarlatinam, de qua supra exposui. In eo hydrope calido, ut nocent stimulantia quaevis, ita quae adhibentur remedia, aquas pellentia, diuretica, acidula sint oportet, subantiphlogistica, antiphlogistica, refrigerantia. Curationis modum et eventum ex FRANKIO discite, summo artis magistro, *Epit.* I. VI. Part. I. pag. 324 sqq. » Florentis admodum habitus mulier 26 annorum, quam abdomine praeturgido in Nosocomio Ticinensi, ut praegnantem ma-

---

(\*) Quae fuit ratio inter hydropem illum et cor hypertrophicum? Utrum scillitica recte praescripta? Ad utramque quaestionem, perlecto hoc capite, respondebitis.

gis, quam aegram, quid hoc in loco contenderet, interrogavimus. Hydropicam se esse atque tertiam nunc sibi paracentesin, quod nec scilla, neque aliud remedium opem hucusque praestiterit, parari, dolens respondit. In Nosocomio refert mulier, se plures ante menses optime valentem, mediis sub menstruis terrore percussam esse sibique menstrua restitisse, brevi post in rebellem ascitem fuisse conjectam. Urina duas tresve ad uncias, turbidae cerevisiae fere similis, per nychthemeram reddebatur. Omnes caeterum corporis functiones, si modo sitim, dolorem ad lumbos, alvi siccitatem, calorem quidquam majorem, pulsusque magnos plenos, nec tamen frequentes exceperis, vix a sanis aberrabant. Nova tunc primum Scoti medici (BROWNII) de asthenica hydropum morborumque multorum natura, egregiam quidem, sed novitatis nimis cupidam juventutem inebriaverat. Ex auditoribus nostris tunc unum, quem novo systemati vel maxime favere noveramus, ut aegram pertractandam susciperet, elegimus. Ascitem praesentem pro asthenico declarans hic et opium et aetherem, magna satis dosi, cum corticis saturato decocto, ut remedium proponit. Venam autem aperiri, libram sanguinis educi, decoctum hordei cum cremore tartari et nitro propinari, jubemus. Non parum hanc methodum, quod terror seu deprimens potentia morbum, ob hanc causam asthenicum, induxerat, sodalium plures mox improbabant. Hanc

interim iniri viam jubentes, altera jam die libram urinae clarioris pulsusque altiores simulque liberriores obtinemus. Altera tunc venaesectio, priore non minor, instituitur. Hanc urinae secretio insequitur tam abundans, ut 15 dierum spatio hydrops omnis, sub magno contra opinantium stupore, disparuerit. Post annum eadem haec mulier, ut plenam singulis valetudinem ulterius manifestaret, clinicum institutum gratissime et laeta salutavit."

Calido, plethorico huic oppositus est hydrops frigidus, atonicus, quorsum pertinet casus, quem refert MEADIVS *Mon. et Praec. Med.* cap. 8. pag. 84. feminae, cui frustra datis medicamentis quibuscunque sive purgantibus, sive diureticis ter emissus est ex ventre humor, qui brevi semper iterum in cavum influebat. » Accidit tandem, (ita rem narrat MEADIVS) accidit tandem, ut eam inviseret anicula quaedam rustica, quae abdomen conspiciens, non sine summo cruciatu distentum, facile persuasit, ut singulis diebus mane et vesperti cochleare plenum seminum sinapis non contusorum devoraret, decoctique summitatum viridium genistae similibram insuper biberet. Postquam triduum hoc modo amarum laticem perpotasset, maximum sensit levamen; quin et sitis, quae molestissima fuerat, omnino sedata est. Alium interdum duobus aut tribus continuis diebus movebat id medicamentum et urina quotidie ad

libras minimum quinque aut sex profluxit. Perstitit in hisce per annum, neque rediit morbus."

Atonico huic hydropi apta est ex vinis medicatis, martialibus, cortice Peruviano, chalybeatis medicina, SYDENHAMO, BOERHAAVIO, MACBRIDIO, STOLLIO, FRANKIO auctoribus. Cort. Peruvianus, praesertim ubi ex intermittente febre natus est hydrops, indicatur, cujus curationis TORTO et SYDENHAMO probatae, hancce vobis referat historiam FRANKIUS l. l. pag. 392. » Sartor juvenis sex jam mensibus febre quartana laboraverat, quam senior medicus solis resolventibus, evacuantibus, salinis tractaverat, eo cum effectu, ut hydrops universalis anasarca et ascites insecutus sit. Ad hunc aegrum accersiti, cum primo ejus medico conferentes corticem proposuimus, quod consilium ille indignabundus rejecit. Corticem tamen praebuimus, eo cum effectu, ut urinis hucusque parcissimis, lixiviosis, compressa vix febre, summa copia excretis, trium spatio hebdomadum, aeger hic ad perfectam et constantem valetudinem redierit." Adjecit tamen, roborantibus interdum non tantum non dispelli, qui a debilitate est, hydropem, sed contra, donec aquarum moles imminuta sit, augeri manifesto, propter partium tensionem tuncque diuretica sese adjunxisse quodque a solo cortice non potuit, a composito hoc remedio impetrasse. Interdum etiam sensilioris temperamenti aegris leniora tonica, amara magis prodesse, interdum vero ad

chalybem deveniendum esse, monet eique subinde adjecisse opium.

Utrique intermedius quasi hydrops spasticus, a genere est nervorum, in hominibus temperiei mobilioris a caussisque nervos turbantibus, ad quem praecipue advertit FRANKIUS, prae aliis de hoc morborum chronicorum capite optime meritis. Is, ut nervorum in secretiones moderandas potestatem ostenderet, duas attulit observationes egregias, alteram infantis sub dentitione repentinam experti lateris dextri paralytin, qui quotiescunque ex eo tempore ploraret, more solito quidem lacrymas sani lateris ex oculo, minime vero ex oculo paralytico profundere solebat: alteram principis Poloni, ob conjugis dilectae obitum paralytin in dextro faciei latere patientis, cujus oculus in parte paralytica constanter lacrymas, altero fere sicco plorabat. Hujus loci est etiam animi pathematum in hanc valetudinem efficacitas, quam illustrat hoc memorabile exemplum Frankianum: » Viennensi vetulae, jam diu hydropicae, simul vero cataracta laboranti ne praestantiora quidem diuretica, urinas movebant, cum vero filiorum adspectu ante mortem gaudendi desiderio permota lentis extractioni sese submisisset, hac feliciter peracta et visu vix restituto, brevi mora, ingenti urinarum sub fluxu sanitatem illa adepta est." Accedit eximia opii in hoc morbo declarata virtus, quam et alii laudant et a WILLISIO ac MEADIO relatae aegrotantium histo-

riae testantur. Ille (*Pharmaceut. Ration. Sect. 7. cap. 1.*) casum narrat viri generosi, doloribus nocturnis a lue male curata vexati, qui hydropicus factus ita tumebat, vix ut se movere posset: » in hoc statu ad eum accersitus, inquit, et praeceptis medicis obstinatum reperiens, quod supererat, mortis non longe abfuturæ et pro certo expectandæ, propterea ut se et res suas, propter æternitatem componeret, prognosticon dedi. Ille non multum perturbatus, obnixè rogabat, ut εὐθανασία gratia laudanum ad libitum, aut saltem quovis vespere sumeret. Hoc cum admonitione quadam concedens discessi ac ut putabam, supremum valedixi. Postea pharmacum illud quotidie sumpsit ille et quotidie dosin auxit, ita ut brevi tempore quantitatem vix credibilem ejus absumsisset. Pharmacum hoc unico constanter usus, in dies melius habuit atque intra mensis spatium in tantum convaleuit, ut tumore omni et doloribus immunis factus, stomacho valeret et foras obambulet. Ab assiduo hujus opiatae usu sitis antea multum urgens cessabat et quaque nocte in sudorem magnum dissolutus insuper et urinam copiosam excrenebat."

Similem tradit casum MEADIVS l. l. pag. 85 sq., quem vobiscum communicare perutile censeo. » Vir quidam robustus, sobrius et temperatissimus, annorum circiter 40, hydrope ascite simul et tympanite laborabat. Originem morbo dederat collisio ab

ictu violento, ante sex fere hebdomades, in dextro hypochondrio facta. In dies ventris tumor augebatur, cum dolore gravissimo, siti intensa, urina admodum pauca eaque crassa et rubra. Diuretica incassum adhibita (sapo venetus, salia, lixiv. balsamum Gilidense, nitrum). A catharticis valentioribus in pejus ruebat malum. Paracentesis imperata est, sed renitebantur amici. Cum dolor jam esset intolerabilis, nec ulla spes de vita affulgeret, ut *εὐθυσία* saltem consequeretur, de anodynīs cogitare coepi. Haustulum igitur cubitum ituro dabam bibendum, qui habebat tinct. thebaic. gtt. xl. (ex aq. menth. cinnam cum spir. et lixiv. tart.) ab illo insperatum levamen sensit; somnus, qui diu defecerat, obrepsit, profluente per vices urinae copia, ut illa nocte librae minimum duae redderentur. Hinc animus mire confirmatus est. Quo quidem remedio, additis dein roborantibus, perfecta restituta est sanitas.

Notandum, ambos aegros dolores graves passos fuisse, alterum ex lue, alterum ex ictu: in neutro defuisse nervorum adflictorum signa.

Secundarius hydrops est, qui morbos acutos, chronicos, dynamicos, organicos sequitur: inflammationes, febres, profluvia quaecunque, vitia homoioplastica, heteroplastica. Homoioplasiae hydro-pis caussae, FRANKIUS exemplum profert (pag. 331 l. l.) Principis Bado-Badensis, cujus tota aorta usque ad suam in arterias femorales divisionem os-

sea reperta est, praecipue ad arterias renales, quibus vix setum porcinum inmitti potuit, vitio quidem gentilitio. Jure suo praecipit RICHTERUS, emphraxes, scirrhus caeteraque id generis non tam mechanica ratione ac pressione hydropem facere, verum tamquam stimuli, sive irritamenta fixa spectari debere: licet ab altera parte etiam circulationis turbac, ex iis motac, computandac esse videantur.

An rupturae vasorum lymphaticorum: an ductus thoracici, aut inventus in eo calculus? Cff. FRANK: I. I. C. SPRENGEL *Handb. d. Pathol.* III. pag. 355.

Ultimo loco hydrops vicarius, metastaticus, sympathicus commemorandus est, qui a turbata, languente, impedita renum, cutis functione, actione quadam vicaria oritur. Ex catarrho natum vidi et sanavi diaphoreticis, cum in aliis, tum in femina, initio praxeos: cujus sanationis en brevem relationem! » Mulier 30 annos nata, laxioris corporis habitus, crebris destillationibus obnoxia, catarrho afficitur pulmonum, cui medebar leni pectorali medicina. Illa tamen morbum parvi pendens atque operibus muliebribus incumbens, catarrho pulmonum evanescente, sensit sibi corpus turgere inque anasarcam incidit. Quod ut vidi eandem caussam accusans, sede duntaxat mutata, jussi lectum petere, atque infusum praescripsi sambucinum cum mindereri spiritu, quo copiosis largisque suscitatis sudoribus, brevi tempore et ca-



tarrho et anasarca liberata convaluit. Est haec quidem longe crebrior, quam vulgo existimatur, huius valetudinis in nostro climate humido frigido opportunitas. Sub constitutione rheumatica, tempore autumnali, plures Ticini hydropes observavit FRANKIUS, ratione antirheumatica tractandos: quo in casu vinum antimon. cum tinct. opii laudat DONALD MONRO (*On Dropsy* pag. 69.). Nec dispar arthritidis, podagrae, exanthematum, ulcerum male curatorum eventus esse dicitur: quae tamen suo singula modo et explicanda et curanda. Hydropis venerei, prompte ac penitus mercurio sanati, mentionem fecit RICHTERUS.

Renum functione laesa hydropem fieri, pridem erat cognitum. Urinarum tamen hydropicarum examen nuper demum factum est, ea cura, ut exinde novum morbi discrimen duxerint medici.

Nimirum detecto in urinis hydropicis albumine, coeperunt hydropis duo facere genera: alterum, in quo urina caret albumine, alterum, in quo albumen habet: quam distinctionem inprimis sanciverunt medici Angli inque iis Jo. BLACKALL et Ric. BRIGHT, rem confirmantibus medicis Francicis, RAYER, MARTIN SOLON, aliis. Innotuit deinceps hydrops ille sub nomine morbi Brightii: quoniam hic eum observationibus non tantum, verum etiam iconibus splendidissimis illustravit.

Agite jam recentiorum haec inventa nobis cognita faciamus!

Jo. BLACKALL in ea, quae extat illius de hoc morbo monographia, cujus quarta editio a. 1824. prodiit Londini, animadvertit, eam hydropum divisionem, quae a corporis cavis ducitur eam ob causam non sufficere, quia sedes naturam morbi nequaquam detegit: praestare alteram, quae ab urinarum crasi petitur, in quam examinando diabeticorum urinas venerunt medici, duce potissimum celeb. CRUICKSHANK. Is hydropem totius habitus discerni ab eo, qui est ex morbo viscerum, urina in priori coagulante per acidum nitricum, in posteriori obscure colorata, parca, hypostatica, sedimento rubro. Hanc doctrinam esse, ut quamvis in medicina opinionem, limitandam nos docet Jo. BLACKALL atque rei cognoscendae gratia plures profert observationes, in quibus alia fuit aliaque urinae conditio. Cap. II. memorantur casus, in quibus urina calore non coagulabilis, pallida erat, cruda, sine sedimento, subinde copiosa: hydropis ex scarlatina, casus I et II, ex catarrho, III, IV, ex morbo cordis VI; quibus etiam addit chlorosin. Cap. III. habentur exempla hydropis cavitatum abdominis et capitis, urina non mutata: in chlorotica, syphilitica, scrofulosa, ex alvi profluvio. Cap. IV. historiae narrantur hydropis, urina non coagulabili, parca, multum colorata, turbida, sedimento lateritio. Casus hydropis ex hepatitide, ex hepatis emphraxi quacunq; ex febre intermittente et morbo lienis; ex venarum abdominalium aegritudine; ex

pectoris inflammatione acuta, chronica; ex corde aegro; ex inflammatione pulmonis et hepatis simultanea; ex arthritide.

In tanta varietate morborum difficile fuerit causam invenire, qua urinarum definiatur secretio; universe tamen urina turbida viscerum abdominalium conditionem ac circulationem abdominalem sequi videtur.

Verum pergamus referre auctorum labores et observationes. Sequuntur hydropes, in quibus urina calore coibat. Caussarum in numero, ex quibus ea hydropis species nascitur, censentur scarlatina, incautus mercurii usus, refrigerium, caet. Ad primam causam pertinent casus decem, quorum ultimus illustratur sectione cadaveris neque renes, neque alia abdominis viscera aegra monstrante; in thorace erant pleurae inflammatae, quam symptomata indicabant, vestigia: in quinque casibus urinam cruore tinctam minxerant aegri. Suppar casuum numerus ad alteram causam refertur: in quorum ultimo extispicium detexit ulcera scrofulosa intestinorum et congestionem renalem. Qui a refrigerio repetuntur, casus sunt sex: a pravo vitae genere quatuor; in plurimis, rem indicante auctore, non deerant inflammationum signa. Sub nomine cachexiae magnam casuum varietatem comprehendit auctor: nec multum utilium: alia capita partim huius non sunt loci, partim ad singulas hydropis species spectant. Ex hisce casibus effici auctor exi-

stimat, in aliis urinam dotibus suis naturaque animali excedere, in aliis deficere: in illis denotari habitum corporis robustum, una cum obstructione interna; in his habitum imbecillum, interdum fractum, aut morbum gravem. Inter duo haec extrema mediam esse corporis conditionem, in qua urinae secretio non multum a naturali differt. Denique aliam urinae dotem notari debere, qua calore coagulatur, neque a sede, neque ab organo peculiari repetendam, verum universe hydropem primum comitari ac saepius etiam superaddi magnae viscerum aegritudini: quamvis leges, quibus regitur haec urinarum dyscrasia, hactenus lateant. Hanc urinae conditionem crebro esse ex diatesi inflammatoria oriundam, auctor opinatur. De qua illius conjectura quid statuendum sit, postquam alias aliorum auctorum observationes exposuerimus, rectius forsitan dicere poterimus. : : :

Igitur consulamus etiam reliquos: BRIGHIUM et Gallo-Francos de hoc morbo scriptores. . . .

Ric. BRIGHT postquam observaverat, e praecipuis causis hydropum esse impeditam circulationem praecipue per venas: ut cordis vitia et hepatis et tumores venam cavam prementes et morbos pulmonum: tum etiam morbos peritonei (aliarumque serosarum) docet, non satis attendi ad renum vitia organica, cum quibus conjungi solet urina calore coagulabilis, ac suas observationes cum iis Doct. BLACKALL consentire, fatetur. : :

Rem probant casus XV ex XXIV, facta cadaveris sectione. In primo erat manifesta diathesis inflammatoria: in secundo deërat: praecesserat tamen catarrhus tum pectoris, tum abdominis. In tertio comitabatur phthisis tuberculosa. In quarto ex refrigerio mali origo et peritonaei phlogosis; pariterque in septimo. In octavo diathesis arthritica, cor hypertrophicum; in decimo bronchitis: in undecimo nulla praeterquam renum alius partis laesio; in duodecimo pleuritis; in decimo tertio apoplexia; in decimo quarto haematuria (morbum provocaverat turbata cutis functio) in vicesimo secundo (in iis, qui prius sequuntur cunctis examen praevertit sanatio) rheumatismus, gravis renum laesio et serosarum inflammatio, vix ullus hydrops: in vicesimo tertio rheumatismus articularis et serosarum inflammationes. Ex brevi hoc conspectu efficitur, in longe plurimis casibus catarrhalem aut rheumaticam affectionem et serosas inflammasse et mutasse renum et secretionem et nutritionem: nec semper tamen constantem fuisse inter ipsam et secuturum hydropem rationem.

Ex Francicis medicis citandi sunt RAYER et MARTIN SOLON: de quorum laboribus nunc superest, ut exponamus.

Et ille quidem ex observationibus, quas laudat, morbi renum cum hydrope, duas profert, hoc loco notandas: alteram a VALSALVA, alteram a semet ipso, ut videtur, consignatam. Prior haec est,

*Lib. II. Pars I.*

(Ep. 41. art. 4.) » Juvenis agricola, cujus duo fratres et ipsi juvenes annis superioribus ex acutis morbis circa vernali æquinotio interierant, eodem anni tempore ad hunc modum decessit. Scabiem sibi, nescio quo adhibito unguento, abegerat: paulo post urina suppressa est, non sine vomitu et dolore interdum ad lumbum sinistram. Urinam tamen aliquoties postea excrevit, sed paucam et saturati lixivii similem, cujus exitum cathetere expedire nequicquam tentatum est. Tandem corpus universum intumuit et accedente laboriosa ac magna respiratione, postridie circa vigesimum primum a suppressione diem, mors ingruit. Vesica et renes sani erant, nisi quod hi aliquanto majores, illa autem libras continebat circiter duas urinae ejusmodi, qualem diximus. Sed et in ventris cavo humor stagnabat, urinam olens, caeterum limpidæ aquae similis, qui in vitreo vase asservatus, multa divulsa quasi urinarum contenta exhibuit. Igni autem impositus, primum turbidus est factus et vaccini seri consimilis, mox lactis ipsius, denique sic concrevit, ut ovi albumen prorsus referret: cujusmodi concretionem in nullo morbido humore, qui in corpore stagnaret, unquam antea VALSALVA viderat. In thorace pulmones quidem multum aëre distenti pleuraeque ad dorsum annexi: sani tamen fuerunt. Cordis ventriculus dexter polyposam concretionem mediocri magnitudine, sinister minorem continebat.”

Renes utrum aegrotaverint, non sine caussa rogabitur, nec analogia hujus casus cum Brightianis vos fugiet, urina licet pauca et lixiviosa, ut ventre contineri viderentur, qui in aliis per renes exeunt humores: praesertim ubi cum altera morbi historia comparetur, quam continuo tradam. » Adolescentulus hydropicus, per plures menses alvi fluxu detentus, urinam mittit limpidam, decolorem, nec acido nitrico, nec calore coëuntem. Tandem atrophicus et inanitus perit. Renes justo majores et ponderosiores, punctis albis, duris, decolore substantia corticali." En exemplum alterum vitii renum organici, quale BRIGHTIO describitur, absque urina coagulabili!

Verum antequam de his exemplis disseramus, ad alias nos convertamus aliorum observationes. MARTIN SOLON duas profert observationum classes: alteram morbi aut perfecta aut imperfecta sanatione, alteram ejusdem morte terminatam. In prioris seriei observationibus quinque ex catarrho vel rheumate manifesto natus erat hydrops et renum morbus; in ea, quae superest (obs. IV.) caussa non diserte memoratur, verum symptomata prodroma fuerant cephalalgia, nausea, alvi fluxus: reliquae expressas habebant renum inflammatorum notas, si unam excipiat XI, ac morbi complicati: hae pertinent ad alteram hujus sectionis partem; ad nephritidem etiam eamque ex lapsu in lumbos referre oportet obs. XVII. In altera clas-

se sive sectione duae priores observationes: numero sunt XVIII et XIX. symptomata obferunt morbi BRIGHTII: albuminuriam et hydropem, absque renum organica laesione. (Ipsi similem observationem fecimus in viro, qui hoc anno Academico in Nosocomium susceptus ex hydropo cum albuminuria periit). In obs. priori erat bronchitis chronica, in secunda rheumatismus articularis, endocarditis, haemoptysis. Obs. XX. exemplum obfert morbi cum vitio cordis compositi pariterque obs. XXI: in ea, quae sequitur, cum phthisi erat. In reliquis renum erat vel acuta, vel chronica phlegmasia.

Laesiones renum organicae ab hyperaemia usque ad totius substantiae renalis metamorphosin multos obferunt gradus ac varietates multas, ab aliis aliter propositas: quae ex iconibus BRIGHTII, RAYERI et MART. SOLON melius, quam ex descriptionibus cognoscere poteritis. Videtur morbus primo ac praecipue substantiam corticalem occupare: utrum exinde sequatur, quae viri experient. MARTIN SOLON conjectura est, eam renum partem, quae secernit, primario aegrotare, vehementer dubitabis, cogitantes praeclaras Jo. MULLERI de penitiori glandularum structura observationes. An ex renum involucris proficiscitur? An sanguinis morbus est? An ex diathesi ejus aut phlogistica, aut serosa succrescit? Quis medicorum nobis haec problemata solvet. Nos, qui de ipso morbo adhuc incerti sumus, quia non desunt observationes



illius praesentis, absente renum laesione hujusque detectae sine praeviis in aegro, dum vivebat, symptomatibus, nec constantem semper et ubivis notavimus horum morbique renalis rationem, ad-sensionem cohibere, quam temere adsentiri malumus: interim quaerentes, utrum therapeutice certiora nos doceat et dolentes, uti aliorum, ita BRIGHTII praesertim librum magis iconum splendore, quam describendi medendique artis praestantia excellere. Id ne temere dictum videatur, agite singula loca examinando percurramus.

Therapeiā BRIGHTII duas, eo auctore, complectebatur indicationes: altera curabat renis aegritudinem, altera ipsius avertebat sequelas. Hoc consilio depletiones sanguinis aut universales, aut topicas commendat; porro purgantia: crem. tart. jalappam, ol. ricini, diuretica, praecipue scillam cum extr. hyos-ciam. aut opio, et digitalem atque postquam conditio phlogistica praeterierat, balsamica, subinde tonica, adstringentia ex iisque chin. sulphur. et uvam ursi. Casus XVI, morbi curati primus, exemplum praebet curationis antiphlogisticae. Qui sequitur XVII. primum eodem modo tractatus, facto deinceps transitu subitaneo ad uvam ursi, cascarillam, chinin. sulphuric. acid. nitricum, interpositis solut crem. tart. pulv. purg. haustu sennae, linctū opiato, pilul. opiat. ol. ricin., ut mireris aegrotantem et morbo et medicationi tam variae tanque perversae fuisse parem.

Casus XVIII. minorem quidem obfert remediorum ingestorum diversitatem, nec tamen majorem curationis perspicuitatem. En remediorum catalogum eo quo praescripta sunt ordine: solut crem. tart. jalappae pulv. haust. ex ol. ricin. tinct. rhei. aq. menth. ven. sect. unc. viii. haust. ex sp. mind. aeth. nitr. acet. scillit. sp. armor. comp. infus. spartii scopar. pro potu, infus. junip. c. acet. potass. et sp. armor. comp. frictio c. linim. therebinth. ad lumbos, ol. ricini cum tinct. opii. infus. lini pro potu, cui deinde add. subcarb. sod., venaesectio, caet.

Casus XIX. curationis simplicioris magisque rationalis exemplar est, nimis tamen semper empiricae, nostro iudicio. Casus XX. perquam obscuram tradit curandi methodum, per acetat. pot. inf. rosar. cum sulphat. magnes. pilul. de hyosc. et ipecacuanh. haust. ex ol. ricin. mixt. ex aeth. nitr. et sp. mind. pulv. ipecac. decoct. uv. urs. et inf. rosar. pilul. hydrarg. pulv. conii et uv. urs. Nec magis perspicuus aut rationalis videtur casu XXI. traditus medendi modus, per sanguinis detractionem, pilul. scillit. c. mercur. digit. et cicut. mixt. camphor., cum sp. minder., iiscum sumenda; pulv. cicut. et uv. urs. liquor. antim. tartaris. cum aq. menth. balsamica. pilul. aloës c. myrrh. infus. senn. pilul. scilk. c. hyosc. solut. crem. tart. Ecquis vestrum mirabitur, hanc aegram non potuisse ex Nosocomio demitti, aut credet, ex tali medicaminum farragine legitimam cognosci posse medendi metho-

dum. Quocirca ex his casibus nos proficere posse desperantes alio nos transferamus, ut exinde doctiores redeamus.

MARTIN SOLON, qui Gallorum mos est, magis leni magisque simplici usus est genere medicinae, praecipue sub-antiphlogistica, diuretica, per sanguinis depletiones, decoct. graminis nitratum, digitalem. In obs. V. interveniente febre quartana et chlorosi, chin. sulphur. et martialibus cura fuit absoluta. In aliis scillitica praescripta, aut mercurialia: saepius pilulae ex ung. neapolitan. sapon. medic. et pulv. scillae; formula hercle parum eleganti, aut commendabili, sive compositionem chemicam attendamus, sive consilium therapeuticum, in morbo renum phlogistico, qualis ab auctore nephritidis nomine declarabatur. Pilulis subinde additum extract. thebaicum ac lumbis admotum emplastrum stibiatum. In obs. XVI. nephritidis chronicae sub usu pilul. drasticar. ex aloë g. gutta extr. helleb. et jalapp. resin. et rusticatione semotus hydrops est ac rediit sanitas.

Ecce feliciū sanationum historias! quas cuiusnam aut medendi methodo, aut generi remediorum tribuere oporteat, incertum est (\*). Quae cum

---

(\*) Nec multum doctiores nos rediisse ex lectione EDUARDI SEYMOUR (quem tanquam principem aliquem huius studii fontem indicat auctor libri chaotici: *Die medicinische Praxis der bewährtesten Aerzte unserer Zeit*, Berlin 1838.) ingenuè fateamur.

ita sint, hydrops BRIGHTII qualis tandem sit quoque tractandus genere medicinae, nos hactenus ignorare, fatemur. In longe plurimis casibus ex cutis laesa functione originem traxisse videtur: eo nomine ad morbos catarrhales, rheumaticos revocandus; ac saepe etiam subesse sanguinis dyscrasia serosa, eodem ex fonte repetunda, quae nonnullis cachexia serosa vocatur, qua sanguis ineptus est ad organa excitanda, cum alia, tum cerebrum hincque symptomata narcoseos et comatis venire, quae morbi exitum fatalem significant (\*). At quaenam sunt renum partes in hoc morbo? Qualis valetudinis renalis cum reliqui corporis valetudine ratio? An subest nephritis? an contra ex nervis laesis morbus proficiscitur? an vero ex sanguine humorumque morbo renum laedetur et secretio et nutritio ex seminio proprio?

Initio ubi congestio, hyperaemiam vocant, renalis est, lenior antiphlogistica laudatur methodus: verum quo vinculo haec theoria viri experient. MARTIN SOLON nectatur cum therapeia per diuretica, renes stimulantia, ab eodem facta, ignoro: quae certe remedia a prudentioribus medicis in renum congestione prudenter vitari ac reprobari vehementer solent. An purgantia revulsione, quam faciunt in canalem cibarium, utiliora forent? An

---

(\*) MARTIN SOLON, l. l. pag. 270 sqq.

hisce praestarent diaphoretica? (†) An tonica altero morbi tempore salubria ex iisque uva ursi, cort. peruv. martialia: haec quidem sanguinem corrigendi fine? An his adversa remedia alterantia? Hactenus therapeutices universalis praecepta sequi, quam unam reliquis praeponere sive medicinam, sive medendi methodum tutius videtur: donec magis adcurata hujus hydropis cognitio magisque simplex et rationalis curatio nobis suppeditaverit armorum, ad hunc hostem vario tempore feliciter oppugnandum, efficacium non quidem magnum illum, sed satis idoneum adparatum.

Hydropis caussa proxima in turbato quacunque ratione exhalationis ac resorbitionis aequilibrio ponenda est. Est, notante magno CAMPERO, vel roris interni copia major, vel absorbtio interna minor, vel minor perspiratio per pulmones et cutim, vel urinae secretio impedita, vel nimius atmosphaerae humor accusandus: vel omnes simul aut plures harum conditionum praesto sunt. Neque semper languere absorbitionem, immo perquam vigere interdum, ita ut ex aëre multum humoris trahat cutis, atque exinde veterum praxin per cutis inunctiones oleosas intelligi, quorundam virorum doctorum sententia est. Hoc quidem respectu cum

---

(†) Haec omnibus reliquis anteponit JONATHAN OSBORNE, morbum a refrigerio repetens et diuretica valdequam noxia reputans.

diabete hydropem comparaverunt RICHTERUS et FRANKIUS: ille cum spurio, hic cum vero, mellito. Ex HEWSONI sententia neque aucta exhalatione, neque absorbtione impedita morbi notio comprehenditur, sed ad secretionem perversam debet referri: cui etiam sententiae favet FRANKIUS, hydropem vocans nutrientium humorum e suo systemate sui-que officii desertionem.

Verum jam satis de hoc loco diximus, qui magis ad forum pathologicum, quam ad forum practicum pertinet quique diversimode explicatur, pro uti diversam hydropis speciem cogitent interpretes.

Præcægia ducunt a causis, natura, sede, symptomatibus. Nimirum causæ quo facilius amovendæ, eo fausta magis præsensio: qui a viscerum scirrho aliove vitio organico est, immedicabilis reputetur. Calidus frigidus melior: hic, qui chronicus, eo peior, quo vetustior. » Oportet enim (sunt verba ARETÆI de sign. et caus. morb. diuturn. II. cap. 1.) medicum hoc in morbo totum hominem permutare, quod per Jovem, neque Diis ipsis facile fuerit."

Febris lenta, calor urens, sitis intensa, cutis sicca, urina parca, foetens, ruffa, crassa, macies, sopor, delirium, meteorismus: mala. Ciborum appetitus, sitis absentia, cutis sana, urina pallidior, virium viscerumque integritas, bona.

Subinde sponte evacuantur aquæ: alvi fluxu, sudoribus, urinis, cute ad umbilicum, crura, rupta:

aut denique absorbtione. Sanationis spontaneae duo exempla scripto mandavit MEADIVS: alterum paracentesis naturalis: alterum aquarum resorbtionis spontaneae. Utrumque, sunt enim perdigna, quae cognoscantur, vobiscum communicabo (l. l. p. 93.)

» Mulier abdomine in immensum aqua repleto, me accersivit: morbum insanabilem esse denunciavi, neque enim superesse vires. At me fefellit opinio. Nam post paucos dies, audito illam adhuc vivere, revisi et rei novitate perculsus sum, conspiciens vasa duo humore plena, alterum duodecim fere libras, alterum sex continentia; quarum illae rupto aqualiculo prope umbilicum uno die, hae disruptione juxta eundem locum postridie facta, exierant: ita in biduum medicinam suam divisit natura. Cum aegram jam languidam et tantum non moribundam prehenderem, non alia auxilia, quam quae cordi utilia essent, proposui; jussis etiam adstantibus spiritu vinoso abdomen fovere simulque praedicens, fore ut propediem moreretur. At mulieri, ne mortuae quidem vix credendum est. Iterum falsus sum; et post menses aliquot incolumem morboque isto (in quem, quantum scire potui, nunquam denuo incidit) immunem adspexi, vulnera etiam sine ulla praeter eam, quam dixi, medicatione sponte coierant.

Finis longae hujus narrationis erit narratiuncula, ex qua manifestum fiet, naturam quandoque, modo etiam ab hoc, quem proxime descripsi, lon-

ge alio hujusmodi onere se levare. Mercatorem quendam ascite gravatum, una cum alio medico experientissimo curabam. Tentatis incassum usitatis remediis ad paracentesin, tanquam ad sacram anchoram, confugimus. Emissae itaque sunt humoris limpidi et tenuis librae circiter viginti. Post aliquot hebdomades de novo intumuit venter. Convenimus ideo mane chirurgum, abdomen denuo exinanituri. Subridens autem aeger, nulla se jam amplius egere curatione dixit; et nudato corpore, abdomen molle laxumque ostendit. Mirantibus et rogantibus, num quid ea nocte per quascunque vias effusum fuisset, respondit, neque per alvum, neque per renes, neque per sudorem sibi plus solito profluxisse. Per glandulas itaque et exiles meatus in peritoneo et membranis vicinis absorptus fuit totus ille humor. Ipse autem postea medici cujusdam empirici curae nimis imprudenter se commisit et ad praecavendum morbum valentissimis catharticeis usus, brevi post, exhaustis viribus, consumptus est. Vix ulla tamen humoris copia in aperto cadavere deprehensa."

Triplex est in omni hydrope consilium medendi: aquas evacuare, causas tollere, relapsum praevertere. Recte incipietis plerumque ab aquarum evacuatione; his enim in corpore stagnantibus, auxilia causis tollendis idonea corpori admoventi nequeunt, et corpus, aquarum mole oppressum, hoc onere levandum est. Interea tamen meminisse juvabit,



crebro primam et alteram indicationem posse ac debere conjungi, ita quidem, ut auxiliis evacuantibus copulentur auxilia ad caussas mali accommodata.

Evacuantur aquae arte chirurgica, vomitu, alvi purgatione, sudore, urina, dissipatione, seu absorptione.

Prima evacuandi ratio postea explicabitur, cum de singulis hydropis speciebus earumque therapeia verba fient: hujus etiam loci sunt vesicantia et moxa et ferrum candens, quae temere morboque vetustiori viribusque imbecillis ne admovete: quippe magnus est in hac valetudine metus gangraenae ulceraque hydropicorum, pridem monente HIPPOCRATE, difficulter sanescunt.

Vomitoria indicantur duntaxat, ubi gastrica coluvies, reliqua evacuantia incassum data vomitusque moveatur aquosus, quo hydrops aliquando sponte sanatus legitur. Inf. croci metall. adhibuit SYDENHAMUS, quae quidem audacia nostris hydropicis plerisque lethalis foret. Non tantum, ut tuto ac cum emolumento dari possint, integra esse debent viscera; verum nec nimia aquarum moles. Quamobrem tutius parca ac repetita dosi ea, quae corpus alterant, commovent, concutiantque leniter, praescribi, RICHTERUS auctor est (pag. 55 sq.) Nocuerunt vomitoria et adolescentulo et mulieri, quorum historias legite apud PORTALLIUM l. l. I. pag. 383 sq. ille in hydrothoracem: haec in gastritidem incidit.

Alvi purgatio convenit malo recenti, corpore robusto, per hydragoga, drastica: pulp. colocynth. g. guttam, cort. inter. samb. (SYDENHAMO laudatore) jalappam et mercur. dulc. sive cum ea conjunctum, sive ei praemisum. De quo medicinae genere SWIETENIUS » memini inter alios casus, inquit, me binis purgantibus dosibus sanasse hominem, qui universali anasarca laborabat, dum simul abdomen ascite tumeret: dederam ℥ii. jalapp. cum gr. iv. turbith. miner. pro dosi; felici adeo effectu, ut totus detumuerit et perfecte sanus foret: verum erat vir 30 annorum, robustus antea, semper sanus, qui aestuante sub sole iter faciens navi, ingentem cerevisiae tenuis copiam biberat et dein non tecto corpore, refrigerato subito post validum tonitru aëre, obdormiverat. In vetustiore jam morbo et ubi difficiliores hydropis caussae, non sperandus est felix adeo eventus."

Quamobrem in talibus dandis semper moniti memores esse oportet prudentissimi MEADII: » ubi fractae sunt vires, nocet vehemens per alvum purgatio et quo plus humoris ex intestinis ejicitur, eo major ipsius copia brevi in ventrem refluit." PORTALLIUS se tum inprimis cathartica utilia esse expertum testatur, cum tanquam diureticorum adjuvantibus illis uteretur: nullum enim hydropicum hoc modo sanatum fuisse, nisi postquam urinae libere fluere denuo inceperant: tum demum hydragoga praescripsisse, cum diureticis non profi-

ceret: quandoque cunctando diuresin vidisse concitatam, quo tempore diuretica deserere cumque purgantibus commutare sibi proposuisset. Eandem de drasticis medicorum illustrium sententiam esse, quae non tam debilitando nocent, quam irritando atque inflammando intestina ex eaque causa crebro perire hydropicos ac prae aliis robustos, ad phlogosin magis proclives. Quamobrem aut leniora cathartica: liq. terr. fol. tart. tart. solubilem, aut si haec non sufficerent, pilul. Bontii aut Bacheri tonicas saepenumero dedisse.

Sudoriferis utendum, ubi a rheumate, catarrho morbus sit repetendus, ubi cutis mollis, pulsus undosus, aut alvus copiosior, aut corporis cachexia serosa: secundum nonnullos in morbo Brightii incipiente. Hoc modo sanatorum hydropicorum exempla vid. apud DON. MONRO l. l. pag. 70 sqq.

Similia narrat FRANKIUS, laudans balnea tepida, thermas, sp. mind. pulv. Dover. flor. sulph., ubi a scabie suppressa, qui balneo tepido sanatum esse juvenem asciticum et principis Poloni filiam hydropicam testatur: hydropem vero ex podagra frigore retropulsa sudores spontaneos dissipasse.

Palmaria hydropis medicina, diuretica, ingentem complectitur remediorum disparium numerum: refrigerantia, excitantia, antispasmodica, anodyna, tonica. Inter refrigerantia reliquis antecellunt cremor tartari, laudatus a MENGHINIO, TISSOTO, STOLIO, FRANKIO, et nitrum ob specificum in renes

stimulum, nuper multis eneomiis celebratum et oxysaccharum et terra sol. tart. et tart. boraxatus et tart. tartarisatus.

Hisce calidiora sunt alcalia: ol. tart. per deliquium, cineres vegetabiles: ex quibus vinum medicatum concinnavit SYDENHAMUS; tum bulbus et extr. squillae marit. ejusve acetum et oxymel. eique ad fine oxym. colchicum, denique balsamica, spirituosae: juniperus, sp. terebinth. (quod remedii genus etiam regioni renali admoverunt) atque ex fonte diaetetico: allium, cepae, nasturtium, raphanus rusticanus, sinapi, petroselinum, chaerefolium, lactuca, caet. Inter topica: emplastr. cantharidum. Antispasmodicum sedans diureticum habetur in herb. digitali purpurea. Ex tonicis sunt: genista, ballota lanata ac latiori sensu pilulae Bacheri.

Antiquiorum medicorum per dissipationem curatio fiebat regimine calido, sicco, frictionibus siccis, oleosis, aromaticis, abstinencia a potu Cff. SWIETENIUS in *Comm. ad Aphor.* B. 1249. MEAD l. l. p. 83. et FRANK l. l. pag. 401. Hanc methodum recentiores jure reliquerunt: quippe magis ad humorum pathologiam, quam ad veram morbi indolem compositam. Priores, quos citavi, auctores nonnulla exempla citant sanationum. Verum de ipsa conferri merentur, quae scripsit medicus eruditus FRANC. MILMAN in *Animadv. de Natura Hydropis ejusque Curatione*, Lond. 1779.

Altera indicatio jubet causas tollere, quod fit

minuendo plethoram, habitum corporis emendando, spasmos solvendo, obstructiones reserando, circulationem moderando, cutis valetudinem corrigendo eaque admovendo, quae singulis aegrotantium conditionibus apta sint. Scilicet quot caussae hydropis tot medelae! In hydrope calido plethorico antiphlogistica convenit: per sanguinis depletiones, diuretica, nitrosa, refrigerantia. In hydrope frigido atonico roborantia, tonica. In hydrope spastico antispasmodica, opiata, digitalis. Ubi viscerum infarctus subsunt solventia, quae dicuntur, seu aperientia mitiora seu validiora aegris adcommodata. Ubi a rheumate, catarrho: diaphoretica, antirheumatica caet. Hanc si velitis therapeuticen rationalem cognoscere, PORTALLIUM adeatis et FRANKIUM, summos artis magistros, consilio, prudentia, sapientia maximis, hydropicorum aegritudinibus atque incommodis medentes; a quibus non tantum medicinam faciendi, verum etiam animum emendandi regundique artem discere poteritis: siquidem et ingeniorum et animorum nobis effigiem in scriptis suis reliquerunt.

Relapsum morbi praevertent curationes variae secundum morbi corporisque rationem. In plethoricis tenuis exactaque diaeta, in laxis atonicis victus et medicina roborans; post rheumaticum hydropem vestes e lana similiaque. Nam qualis morbi talis convalescentiae curatio. Cf. PORTAL. l. l. I. pag. 401 sqq.

*Lib. II. Pars I.*

23

Atque haec de hydropum familia universe dicta sunt. Reliquum est, ut de singulis speciebus verba faciamus: anasarca, hydropes abdominis, pectoris, capitis.

In anasarca omnis corporis habitus tumet, tumore pallido, frigido, non elastico, ab artubus inferioribus ut plurimum nascente, vespertino tempore praesertim conspicuo, ac pedetentim ad partes superiores: femora, abdomen, pectus, brachia adscendente. Tumoris hujus cutanei diagnosis his habetur, ab ARETAEO indicatis notis: sicubi digitum impegeris, locus cavus efficitur et multum temporis cavus perseverat. Hae foveae a digitorum impressione relictæ, tumoris indolem atonicam non elasticam manifestant. Vespertino tempore pedum oedema maxime conspicuum est, quia declivia loca petunt aquae eaque somni tempore derelinquunt.

Hac forma conspici solet hydrops plethoricus, hydrops gravidarum, hydrops a vitio cordis ab eaque incipi hydrops Brightii.

Universe facilius reliquis speciebus sanatur: remediis morbi naturae aptis: tum etiam crurum leni scarificatione, aut punctura.

Caeterum curatur frictionibus matutinis, siccis, aromaticis, aut spirituosius, lenioribus tamen, propter gangraenescentiam facilem: nocent, ubi valde tensae sint partes, aut inflammatoria morbi natura: cui quidem morbi naturae respondeant oportet remedia, sive antiphlogistica, refrigerantia, sive te-

nica, sive juncta hisce evacuantia: diaphoretica, purgantia, diuretica.

Scarificatio crurum vel antiquis jam usurpata supra talos ad malleolos internos, loca videl. decliviora instituitur, uno facto vulnuscule puncto usque ad cutis cellulosam. Ne nimius effluat humor, pedibus alte positis, siccis, non refrigeratis exeat ac vulnus aq. saturnina irroretur, ne fiat inflammatio ac gangraena. Cf. MEAD pag. 80.

Tumor scroti in pueris, ex refrigerio, curandus, auctore FRANKIO, fomentis siccis, aromaticis, fumigationibus ex saccharo carbonibus injecto ac feminalium usu (lib. I. pag. 420.)

Hydopes externi saepe praecedunt, comitantur, sequuntur internos aut cum iisdem alternant: nec tamen ignorare oportet, ita PORTALLIUS, in corporibus hydropicorum vel internas caveas dumtaxat vel externam cellulosam aquis abundare, nec semper simul internum, simul externum hydropem adesse, aut hunc illum praenotare.

Eodem auctore, corii et contextus mucosi structura hoc morbo mutatur, magis condensantur, duriores fiunt, immo cartilaginis instar: a quo, cum similia quae a semet ipso, a MORGAGNO etiam observata ferantur; hujus quoque testimonium adponam. (Epist. 38. art. 26.) est enim pluribus locis illustrandis peropportuno. » Vir quidam cum ascite, tum praesertim anasarca ingenti laborabat, quae eo videbatur major, quod cum emaciatam

faciem et reliquum caput non occuparet, membra caetera, si cum hac conferrentur et praecipue inferiora speciem monstrosissimae crassitudinis prae se ferebant. Mortuum anno, si recte hoc memini 1704. in Bononiensi incurabilium Nosocomio dissecui, magis ut anasarcae, quam ut ascitis naturam inquirerem.

Inquisivi autem; nam crura jam corrumpi incipiebant, in femoribus et in scroto. Femorum cuticula hic illic a subjecta aqua in vesiculas attollebatur, quarum aliqua erat pugni magnitudine. Adacto usque ad os cultro, cum sectiones inspicerem, adiposam membranam crassiorem factam, ejus autem Malpighianas cellulas aquosa pinguedine refertas deprehendi, vel potius aqua maxima ex parte, quae propter creberrimas interjectas cellularum, membranulas, gelatinam mentiebatur. Atque ut adiposa membrana sese propagat non modo inter musculos, sed inter fasciculos quoque fibrarum ex quibus muscoli compinguntur, ita in locis his omnibus eandem gelatinae speciem referebat. Nec alia mihi se obtulit species praetumidum scrotum incidenti. Cellulas enim inprimis quae darton efficiunt, quippe adiposae membranae continuatas, aqua distenderat. Aqua igitur ex his, illisque cunctis sectionibus prodibat et si velles, facile exprimi poterat; sed non tota; rima enim inter cellularum membranulas restitabat.

Itaque cum scalpellum ad abdomen transtuli,



etsi inter ejus tegumenta nullam fere aquam offendi, non tamen defluxisse tam cito per femorum et scroti sectiones credidi; sed potius ab ingenti, quae ventrem implebat et abdomen distendebat, aquarum copia, ex hujus integumentis detrusam, dum homo viveret, ad inferiores artus fuisse existimavi; aut si mavis, cum ab his porro ascensura esset, ob eandem, quae modo indicata est, integumentorum abdominis a subjectis aquis pressionem, inter ipsa non esse admissam. Ventris autem viscera quemadmodum se haberent; neque enim id mihi, ut paulo ante dixi, tunc proposueram, diligenter non adnotavi."

De curatione hujus hydropis speciei praeter auctores laudatos Cf. PORTAL l. l. II. pag. 14 sqq. qui cum crebro utiliter a vomituritione concitanda initiari, deinceps per diuretica atque cathartica continuari tandemque topicis terminari, praecipit. Haec autem: linimenta ex tinct. scill. digit. purpur. aliisque (sp. minder. his ipse adnumerandum cupio) in hydrope externo, integro systemate cutis absorbente, efficaciora esse, quam in hydrope interno: nisi externus ab interno ortus sit; tunc enim plus expectari a levi cutis punctura ad aquas evacuandas: nec tamen interim negligenda esse interna diuretica, cum iis conjuncta quae caussis opponi possint.

Ascites, hydrops abdominis cognoscitur: tumore ventris ex pelvi adscendente, usque ad praecor-

dia, aequabili ut plurimum, locum declivem maxime occupante, fluctuatione, facie, brachiis ac reliquis partibus gracilibus, pigritia, torpore, cute arida sicca, siti, urina parca, crassa, ruffa, sedimento rubro, rosaceo, dyspnoea; accedit tandem aut gangraena, aut febris hectica, ac comatosi aut delirantes pereunt. Non ita facilis semper hujus morbi diagnosis est: id quod errores testantur vel peritissimorum medicorum, in feminis praesertim difficulter vitandi. Nam saepe quae hydropicae se esse fingeant ac credebantur puellae, vivum hydropem pepererunt; saepe nuptae, gravidae cum esse videbantur, partum ediderunt aquosum. Rei difficultatem auget, quod saepius utrumque vitium nectitur, aut alterum alterius causa est. Accipite FRANKII viri experientissimi praecepta ac monita: (pag. 278.). » Multiplici observatione sumus convicti, vel hydropem, praecipue ascitem impraegnationis ipsius in multis esse phaenomenon, vel hydropicam mulierem, sub morbi principiiis haud infrequenter facilius, quam extra hunc morbum concipere. Multas saltem feminas manifeste utero gerentes in hydropem incidisse atque ab hoc ultimo, nonnisi foetu excluso, liberatas fuisse, haud paucas, evidente jam hydrope, utero facilius concepisse, experti sumus." FRANKIUS consentientem habet PORTALLIUM, duos citantem casus, qui ipsi contigerant quosque hoc loco referre lubet. » Initio praxeos meae, inquit, in consilium

vocatus sum cum aliis medicis celeberrimis apud matronam, quae a medico, qui ejus curam gerere solebat, reputabatur hydropica. Crura oedemate, tumebant morbusque ad ventrem adscendebat. Ipsa aegra sibi quinto aut sexto esse videbatur mense graviditatis ipsosque motus infantis sentire. Qui tactu explorarunt medici, gravidam esse credebant. Ipse autem facta exploratione dubitare me aiebam, ea tamen cum verecundia qua decebat medicum juniorem, a magnis in arte magistris dissentientem. Evenit ut praedixeram, praegnans non erat mulier: quae post diuturnum diureticorum et antiscorbuticorum usum convaluit atque deinceps plures peperit infantes. Judicium peritum, eventu probatum consecutae sunt multae gratulationes multumque superbus exsultavit animus: verum error in alio casu non minus notabili hanc meam brevi repressit audaciam. Uxor medici Parisiensis MORAND, Chirurgi celeberrimi filii, in matrimonio vixerat infoecundo usque ad 42. aetat. annum. quo catamenia tardari primum, supprimi dein coeperant: colore cutis flavo, turbata digestionem, ventris torminibus, oedemate crurum, pedum totiusque corporis habitus anasarca succrescente. Maritum consilio juvans meo non dubitabamus esse hydropem cumque urinae parcae essent, mox diuretica et hydragoga commendabamus ad earum fluxum concitandum; verum incassum omnia. Venter magis magisque tumebat in ejusque caveam effundi videbantur aquae.

Tertius medicus percelebris arcessitus, post multas quaestiones ac longum examen, non dubitavit, quin catameniorum suppressio atque obstructio quaecunque uteri et ovariorum anasarcam ac deinde ascitem creavisset, quam sibi videbatur cognoscere. Decrevimus paracentesin facere sicque aquis eductis viam parare ad alia, quae indicarentur remedia. Instabat tempus ad eam faciendam constitutum, cum ecce graves in regione hypogastrica exorti dolores brevique partus secutus est et infans mortuus exclusus, quem sex menses et dimidium vivendo attigisse dixisses. Copiosius fluentibus urinis et sudoribus intra paucos admodum dies hydrops ille sanatus est."

Universe ex hydrope citius, quam ex graviditate venter repleri, extendi, tumesceri solet atque etiam, praecipiente ARETAEO in corporis ad alterutrum latus conversionibus humor in locum declivem et tumorem facit et fluctuationem caeteraque symptomata hydropis notantur. (In hydrope saccato cystico inaequabilis tumor est minusque multo universus habitus functionesque laeduntur (\*)).

---

(\*) Cff. de eo MORGAGNUS Epist. 38. (qui horum hydropum signa a NUCKIO bene proposita profert art. 53 ibid.) FRANK et PORTAL ll. ll. Hic etsi functiones minus turbent nunquam securos esse medicos jubet, quia sive incremento teleri, sive ruptura humorumque in cava corporis effusione mors subitanea instat, (ll, pag. 192.)

Non raro aliarum partium observantur oedemata: partes tamen reliquae: facies, brachia, pectus, crura gracilescent propter defectum nutritionis. Tria potissimum symptomata huic morbo adsignavit SYDENHAMUS: dyspnoeam, urinae paucitatem, sitim intensam. Animi habitum hydropicorum egregie depinxit ARETAEUS » circa minima quaeque sollicitudo, vivendi cupiditas, tolerantia, non ex animi alacritate, sed ex ipsa morbi natura."

Universe hydrops ascites spectari debet, ita PORTALIUS, tanquam morbus periculosus adeo, ut pauci ex eo perfecte convalescant, etiam optima methodo curati. Numerus sanationum, sic pergit, longe profecto minor foret, si hydropes recidivos eosque lethales computarent, exciperent etiam, qui externas occuparent sedes. Is omnium facillime curabitur, qui sequitur inflammationes nulloque morbo chronico antecedente: verum tunc nulla mora interjecta cito aquae educendae sunt.

De curatione ascitis moniturus paracentesin memorare debeo. Quod quidem auxilii genus universe palliativum magis, quam therapeuticum dicere ac habere oportet. Id quod nec CELSUM latuit, qui: » neque enim sanat emissus humor, inquit, sed medicinae locum facit, quam intus inclusus impedit." Prompte institui debet, viribus integrisque visceribus: de qua cf. eximius medicus FOTHERGILL *of the use of tapping early in dropsies. Works*

pag. 364 sqq. (\*). Nititur haec per paracentesin methodus ipsa imitatione naturae, qua sponte rupto aliquo ventris loco aquas emissas novimus. Interdum paracentesis omnem morbum sustulisse legitur, cujus sequens exemplum narrat MEADIIUS : » Virgo sextemdecim annorum sensit sibi intumescere ventrem parvaque copia urinam reddi ; a quibuscunque remediis pejus habuit et post annum haud aliter ac gravidæ distendebatur abdomen. Eo tempore nupsit, spe proposita, maritum fore pro medico. At longe secus res evenit ; per annos tres increvit sensim hydrops, ita ut tandem ventris ruptio formidaretur. Cum dolor jam intolerabilis premeret, a me petiit, ut aquam manu chirurgi, quem in Nosocomio, eventu secundo hanc

---

(\*) Linea inter ossis ilei cristam et umbilicum media, aut centro inter haec costas spurias et spinam in latere sinistro, si scil. fluctuatio manifesta nullumque visceris vitii indicium, fiat. Cf. RICHTER *Elem. Chirurg.* Tom. V. pag. 139. Aquae educendae sunt acu triquetra, non lanceola, ut FRANKIO placuit, nisi gelatinosus humor spissusque fuerit. Semel et simul educendae sunt aquae, non partitis vicibus, ut antiquitus credebatur. Comprimendus tamen venter aut manu aut cingulo MONROI, ne ventris depletione subitanea fiat sanguinis a corde revulsio ac syncope ; cujus pressionis fasciationisque utilitas veteribus non ignota, a MEADIO denuo ostensa est ac praedicata l. l. pag. 89. Post aquaseductas in abdomen injectiones vinosas factas esse refert MONRO l. l. pag. 183. at infausto eventu : quare merito ab ipso et FRANKIO reprobantur.

medicinam fecisse audiverat; quo saltem levarentur cruciatus, educi curarem. Ego ne occidissem, quam servare non potui, viderer, in corpore macie jam paene confecto id sine maximo vitae periculo tentari non posse edixi. Misera tamen instare et precibus rogare, ne se desererem, assiduis tormentis et lenta morte consumendam. Cessi precibus victus et illa quam dixi via emissae sunt simul et semel humoris limpidi ac nullo modo foetidi librae sexaginta. Ex eo tempore indies auctae sunt vires morboque nunquam postea revertente, elapsis decem mensibus, filium robustum peperit; plurium etiam exinde foecunda parens."

Quamvis illud exemplo perquam raro fiat atque ut plurimum morbum levet dumtaxat ac symptomata mitiget vitamque diutius servet, vel hoc tamen nomine commendari meretur. Idem nobis testis sit MEADIUS, exemplum adducens mulieris, quo cognoscere simul poteritis quanta vis humorum hac via e corpore evacuata sit. » Illustris quaedam vidua, anno aetatis suae quinquagesimo primo in hydropem ascitem delapsa est. Emissus ex ventre humor; qui cum reflueret semper singulis mensibus, per annum unum educebatur ad mensuram librarum quadraginta quatuor. Anno insequente singulis etiam mensibus aqua emissa est ea quantitate, ut per quamque hebdomadem colligi libras duodecim compertum esset. Anno tertio minui coepit humorum quantitas, ita ut mense uno-

quoque librae tantum viginti quatuor effluerent. Quarto autem et quinto sextique septem mensibus aqua tricies educta, non ultra sedecim per singulas vices affluerunt. Et post novissimam emissionem languere coepit ac tabescere; difficultate etiam spiritus, ut in hydrope pectoris observamus, assidue fere premebatur et animo frequenter deficiebat: cum antehac per omnem morbi decursum, quoties intervalla essent emittendi humoris alacris et vivida congressibus amicorum, exercitationibus, quin et choreis sese recrearet. Cepit illam tandem vitae et curae taedium placidaque morte occubuit. Mirandum sane est, eo temporis spatio tantam humoris copiam ex corpore humano suppeditari potuisse, libras nimirum mille nongentas et viginti; quas in ipsis ovarum conceptaculis, quae recentiores medici ovaria adpellant, primum collectas fuisse opinor. At ipsa denique moriens testamento suo mandavit, ut ad futuram rei memoriam, summa eorum, quae memoravimus, Anglico sermone monumento suo inscriberetur." Certe tandiu vita sine hoc remedio servari non potuisset, sed suffocata periisset mulier.

Aquis emissis sustentandae sunt ac refocillandae vires vino et carniū juscūlo. Quae post paracentesin oboriuntur spasmi, tympanites, ventrisque tumor anodyna postulant, opiata, carminantibus juncta.



Hydrops pectoris, aliis hydrothorax morbus est difficilis admodum ac dubiae diagnosis. Ejus symptomata esse feruntur: dyspnoea, motu et decubitu supino, aut in latus sanum increscens, subitanea e primo somno excitatio cum metu suffocationis, tussis sicca, chronica, interdum cruenta, pulsus durus, vibrans, aut etiam intermittens, inaequalis (\*), manuum, pedum oedemata (quibus saepenumero pectus levatur), torpores, paralyses, urina parca, rubra, ut plurimum crassa ac lateritia. Cff. de iis PORTAL l. l. II. pag. 91 sq. qui praeterea oedema faciei, tumorem labiorum et sensum ponderis commemorat, nec non nostras DE HAEN, qui docte haec signa commentatus est.

Erunt autem alia haec symptomata, ubi aliam sedem morbus tenuerit: latera thoracis, mediastinum, pericardium, pulmones. Ruborem, livorem nasi et labiorum, quae notat CAMPERUS, magis ad vitia pectoris, cordis organica pertinere crediderim. HAENIUS more suo horum symptomatum censuram egit in *Rat. Med.* Tom. II. cap. 3. (Ed. Lugd. Bat.) citatque exemplum sexagenariae mulieris asciticae, in qua pectoris quidem nonnulla anxietas, ut in ascite consuevit, aderat, sed admodum exigua nullaue tussis. Nulla praeterea peculiaris de nocte anxietas, aut subitanea e somno excitatio.

---

(\*) Pulsuum fallaciae mentionem facit STOLLIUS l. l. V. pag. 83.

In dorsum quidem saepe incumbens visa aegra : frequenter autem etiam utrumvis in latus ; et alterum exemplum, in quo defuit manus oedema ; et hydropicae, quae urinam reddit pulcre coloratam limpidam cum sedimento fere acutorum bonorum ; et viri cardialgiis vexati, deinde asthmate, misturae neuroticae cedente. At, quod HAENIUM latuit, stethoscopium fortasse certiora dabit indicia.

Hydropem idiopathicum pulmonum morbum esse perquam rarum testatur LAENNEC ejusque unicum fere symptoma esse dyspnoeam, cui percussione additur sonus obscurus et stethoscopio absentia respirationis, praeterquam ad pulmonum radicem et aegophoniam (nec tamen, ubi major copia aquarum). Crebrum contra esse hydrothoracem sympathicum, qui morborum exitum tristem plerumque brevi tempore ante praedicere solet (\*). Signa isthaec LAENNECII si vel semper adessent, utrum morbum certo indicare possent, ipse affirmare veretur, subjungens, symptomata generalia morbique decursum sola posse distinguere hunc morbum a pleuritide chronica, nec deesse casus, in quibus haec distinctio non minus ardua foret in cadavere, quam in vivo homine : quemadmodum etiam oedema pulmonum aliquando difficulter a peripneumonia primo gradu discernitur. Caussam

---

(\*) Obiit ex hydrothorace FREDERICUS magnus, Borussiae Rex, cujus morbi historiam refert PINEL, *Nos. Philos.*

positam esse scitote in illius ex pleuritide chronica origine, quae in longe plurimis casibus ex recentiorum observatione medicorum detegitur: ut pulmonum hydropis vulgaris est ex chronica bronchitide ortus: qua de re cff. HASTINGS, SCHROEDER V. D. KOLK, una cum aegrotantium historiis ab aliis etiam relatis (\*). MORGAGNI Epist. 16. percurrentes videbitis, rem ita se habere atque intelligetis, cur prior auctorum laudatorum bronchitidem chronicam hydropis pectoris causam habeat frequentem, cur alter scribat: sectiones cadaverum se abunde docuisse, plerumque majora minorave inflammationis chronicae signa in membranis serosis adesse, quid significant tussis et sputa cruenta in multis et symptomata febrilia et exacerbationes nocturnae et pulsuum turbae (cum eodem vitio pericardium aegrotare soleat) cur adeo prosint parcae sanguinis depletiones, et FRANKIO aliisque auctoribus, diuretica refrigerantia, sedantia ac praecipue digitalis: cum multarum affectionum

---

(\*) Hydropem ex pulmonum aegritudine natum antea rarum, nunc crebrum esse, ex curatione pleuroperipneumoniae per tart. emet. contendit OSBORNE: quod num veritati consentaneum sit, nescio; vos tamen ignorare nolui, hoc maxime tempore, quo curatio isthaec, nullo facto discrimine, a quibusdam prae veteri praedicatur.

Caeterum causae hydrothoracis praecipuae esse feruntur: gravis pleuroperipneumonia, asthma, refrigerium, gibbositas, ulcera perperam clausa, scabies suppressa, caet.

pneumonicarum ultimus tandem eventus sit hydrothorax (\*).

Par sit de hydropericardia, aut hydrope pericardii judicium, qui ut pericarditis cum plenritide, sic crebro cum hydrothorace componitur. Is hydropsi idiopathicus LAENNECCIO, nec sine caussa, non minus rarus habetur ac idiopathicus hydrothorax illiusque quam fallaces notae sint, si velitis cognoscere, pervolvite anatomes practicae cultores, incipientes a MORGAGNO, desinentes in CORVISARTUM, LAENNECCIUM, HOPIUM, BOUILLAUDIUM: quorum posterior quisque proxime antecedentem ita commentatus est, ut sentiatis, quam exigua spes sit diagnoseos hujus morbi certae atque indubiae futurae.

Caeterum hydrothoracis et hydropericardiae curatio subantiphlogistica et diuretica refrigerans sit oportet. Paracentesis thoracis et pericardii anceps profecto remedium est. Illius duplicem observationem retulit FRANKIUS utramque in hydrothorace acuto factam: alteram morbi a pleuritide, a morbillis alteram. Hujus inter alios meminit BOUILLAUD ejusque incertam rationem ostendit.

Haec A. A.! de hoc morbi genere haecenus dicta

---

(\*) » Unica fere in hydrope pectoris ad salutem via superest diuresis, ut longinqua experientia edoctus sum," sic de hujus morbi curatione QUARINUS, *Animadv. Pract.* II, pag. 104.

sufficiant. Quae ut memoriae mandentur fideli, consecraria quaedam huic capiti subnectam.

1. Hydropes, sudorum internorum nomine dicendi, variarum valetudinum symptomata esse solent.
2. Quorum alii activi sunt, aut critici, post inflammationes serosas, cutaneas, cellulosas: catarrhos, rheumata; alii passivi, colliquativi, ex corporis infirmitate, declinantibus viribus.
3. Priorum curatio, ut morbi, ex quibus proveniunt, antiphlogistica, sub-antiphlogistica; anticatarrhalis, antirheumatica sit oportet in iisque quantocyus fieri possit, evacuandi sunt, etiam per paracentesin promptam, humores.
4. Posteriores cum diureticis requirunt tonica, uti testantur hydropes intermittentibus febribus supervenientes.
5. Ante omnia autem praevertere eos decet, quia semel nati difficulter tolluntur.
5. Eapropter caussarum scientia ac morborum legitima curatio plurimi facienda est.
7. Hae autem imprimis in cutis, renum, cordis, hepatis valetudine quaerantur, oportet.
8. Quae ut variae sunt, ita vario rite tractantur genere medicinae.
9. Neque ignorare decet, aquis eductis, morbum non esse sanatum.

10. Historiis sanationum et encomiis remediorum non fidendum est, nisi certior factus sis, hydropem non rediisse.
- 

#### DE PHTHISI PULMONALI.

Antiquitus communi nomine *tabes* dicebatur morbi genus, quo laeditur praesertim corporis nutritio cujusque tres discernebantur species. Una est, qua corpus non alitur et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur et nisi occurritur, tollit: atrophiam hanc Graeci nominant. Altera species est, quam Graeci *καχεξίαν* adpellant: ubi malus corporis habitus est ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Huic praeter tabem, illud quoque nonnunquam accedere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera summa cutis exaspereetur, vel aliquae corporis partes extumescant. Tertia est longeque periculosissima species, quam Graeci *φθίσην* nominaverunt. Oritur fere a capite: inde in pulmonem destillat. Ex hoc ulceratio accedit et febricula lenis fit, quae etiam cum quievit, tamen repetit. In ea quoque frequens tussis est et pus excreatur: interdum cruentum aliquid. Quidquid excreatum est, si in ignem impositum

est, mali odoris est. Itaque qui de morbo dubitant, hac nota utuntur.

Ex hisce CELSI verbis intelligitur, quid de hoc morbi genere universe statuerint veteres.

Quam veterum sententiam, ut solet, in Aphorismis suis secutus est magnus BOERHAAVIUS, sic morbum definiens: si ulcus pulmonem exederit ita, ut totus inde habitus corporis consumatur, phthisis pulmonalis aegrum afficere dicitur Aph. 1196. Itaque ea tabes, quae a pulmonum ulcere oritur, phthisis dicta est.

Deinceps tamen, utrum semper subsit pulmonum ulcus, dubitari coeptum est, praesertim a medicis Anglis, quibus crebra nascebatur morbum observandi opportunitas: WILLISIO, MORTONIO, MEADIO.

Ille diserte monet, se in plurium phthisicorum corporibus invenisse pulmones ab ulcere quovis immunes, sed tuberculis, aut lapidibus, aut materia sabulosa per totum consitos. MEADIUS, postquam animadverterat, illos maxime pulmonum exulcerationibus obnoxios esse, quos pueros aut juvenes strumae vexaverant, » memini olim, inquit, experientissimum medicum RADCLIVIIUM dicere solitum, phthises in nostris et frigidioribus regionibus esse plerumque strumosas. Saepissime igitur videmus in tabidis post mortem incisis pulmonem tuberculis, seu glandulis induratis obsitum, quae suppurantia pus expuerant. Ante hunc vero jam notaverat celeberrimus SYDENHAMI aemulus et ae-

qualis MORTONUS, se tubercula sive crudos et glandulosos tumores saepe in phthisicorum cadaveribus deprehendisse, cum caeterae pulmonum partes apostematibus et exulcerationibus essent obsitae. FREDERICUS HOFFMANNUS etiam Opp. Tom. I. pag. 399. Ed. Genev. hanc a tuberculis pulmonalibus phthiseos genesin adgnovit. » In defunctis, inquit, culter anatomicus sequentia detegit. Primo in omnium fere, qui phthisi decedunt, pulmonibus ingentes scirrhositates vel dura tubercula, quae partim pure scatent, partim instar steatomatum sebaceum concrementum recondunt, reperiuntur, de quo exempla prodita in *Miscell. Nat. Cur. Decad. II. Ann. III. Obs. 188. Act. Hafniens.* Pars I. A. 1673. nec non apud PEZOLDUM *Obs. 64. 74.* et HARDERUM *Obs. 46.* et T. III. pag. 285 Tubercula ista materia viscida repleta plerumque initium constituunt vomicarum, quae nil nisi diversae magnitudinis ulcera sunt, membrana ambiente cincta. Ejusmodi vomicae si adhuc minores sunt, tussi interdum ejiciuntur. Quodsi vero mole sua increscunt interiusque rumpuntur, abscessus inde fiunt et cavitates cum sputo purulento, copioso phlegmate mixto et hinc vera adest phthisis."

Quae attulit HOFFMANNUS loca HIPPOCRATIS et ARETAEI ad hunc morbum ut videtur referenda, circa ea notandum est, HIPPOCRATIS locum esse ex libro spurio *de internis affectionibus*, quod etiam



tangit citationes Cl. VAN DER KOLK e libris *de morbis*, pariter spuris; tum quæ alibi occurrit vox *pupata* quamque *tubercula* significare credunt, pro omni omnino tumore adhiberi. Cf. FOES. in *Coac.* 404. et in *Oecon.* in voce, ut minime perspicuus sit hujus vocis sensus. Locum vero ARETAEI, quem laudat HOFFMANNUS et HOFFMANNI ad exemplar Cl. VAN DER KOLK, par in citatione vitium admittens; citatur enim liber tertius: jam ARETAEUS duos scripsit libros, de signis et causis morborum acutorum et duos pariter de signis et causis morborum diuturnorum ac totidem de curatione tum acutorum tum diuturnorum morborum; locum igitur ARETAEI ab HOFFMANNO citatum pervolvens, in illius scriptis frustra quaesivi. Denique, quod opinatur Cl. SCHROEDER VAN DER KOLK, HIPPOCRATEM secuisse cadavera, id nullis quidem testimoniis historicis firmatur, immo horum temporum rationi prorsus repugnat. Sed haec hactenus dicta sufficiant, ut probem veterum et majorum anatomicam phthiseos pulmonalis cognitionem vel nullam fuisse, vel si seriore aetate cogitemus, mancā omnino et imperfectam.

A MORGAGNO anatomes practicae parente expectari jure poterat hujus problematis solutio. Verum ille, in reliquis morbis eorumque causis, et sedibus indagandis amplissimus et gravissimus auctor, hic perquam brevis est; ut rem magis perstrinxisse aut attigisse, quam explanasse videatur.

Caussam si quaeratis hujus brevitatis, ex illius ore accipite. » VALSALVA posteaquam juvenis in phthisis periculum venit, ut in ejus scriptum est vita, cadavera istiusmodi morbis absumptorum minus opinor quaesivit. Ego vero ut me tibi aperiā, illa fugi de industria adolescens et fugio vel senex, tunc ut mihi, nunc ut studiosae, quae me circumstat, juventuti prospiciam, cautius fortasse, quam opus sit; at tutius." Nolite tamen putare, VALSALVAM et MORGAGNUM rem prorsus intactam reliquisse, aut nullos secuisse phthisicos: immo apud hosce celeberrimos duumviros animadversiones quasdam reperietis recentiorum observatione confirmatas: primam pulmones fuisse repletos tuberculis, alteram ulcus et laesionem in superiore haesisse pulmonum parte, tertiam alias etiam glandulas interdum intumuisse et partium internarum omenti, mesenterii, peritonaei, intestinorum, uteri, vesicae felleae, urinariae superficies protuberantibus disjectisque passim corporibus fuisse inaequales; hancque phthisin, quemadmodum animadverterat pridem MORTONUS, praesertim cadere in scrofulosos, neque tamen glandulas esse bronchiales, quae tubercula faciant, ipsi videri. Quo magis doleo, contagionis metu infausto tantos viros ab hujus morbi investigatione, ea qua pollebant diligentia, fuisse deterritos: quod nisi factum fuisset, certe multa detexissent, quae posterā demum aetas in lucem protrahit.

Verum iter prosequuti ad eos properamus, quibus hanc valetudinem accuratius cognitam debemus, quorum ex numero fuerunt BAILLIE, LAENEC et MECKEL, de quibus itaque sermonem instituimus et primo quidem loco de eo, qui reliquis antecessit, BAILLIE.

Hoc auctore tubercula ex omnibus pulmonum morbis maxime communia sunt atque vulgaria vitia (*Anat. des krankh. Baues etc. aus dem Engl. von SOEEMMERRING pag. 39 sqq.*) Constant corpusculis rotundis, albis per substantiam pulmonalem dispersis. Formari videntur in textu celluloso pulmonum, neque ut multis placuit, ex glandularum vitio fiunt. Parenchyma cellulosum pulmonum non est naturae glandulosae atque in ea, qua glandulae mucosae in bronchiis existunt, parte interna nulla observata sunt tubercula. Initio minima sunt, nec superant magnitudine parvarum acuum capitula, concrescunt dein in tubercula majora, varia, saepius pisa magnitudine aequantia. Dissecta de alba, glabra, firma materie esse, intus crebro de pure concreto deprehenduntur hocque praecipue, ubi plura concreverunt. Ex supuratione tuberculorum plures abscessus in pulmonibus fiunt et circum ea pulmo interdum durior: crebro etiam naturalis, integer. Subinde plures abscessuli per pulmones dispersi, pus crassius recondentes, puri scrofuloso simile.

Quodsi in abscessus transcant tubercula, morbum

creant Angliae familiarem, phthisin pulmonalem. Et primae et senilis aetatis, magis tamen pubertatis morbus est. Secti pulmonis pars notabilis in materiam albidam, mollem liquefacta videtur; ut glandula scrofulosa, quae suppurari incipit. Dixeris, materiem scrofulosam in pulmonum parenchyma depositum, suppurationi proximam. Materies tuberculosa esse videtur diffusa, quae in tuberculis circumscripta est.

Vidit aliam tuberculorum pulmonalium speciem, valdequam raram. In hac tumor mollis est, quem facit materia fusca, glabra, pulmonum textui inhaerens. Horum tumorum reperit nullum suppuratum plerumque uvarum crispum (*Ribes grossularia* LINN.) magnitudine ad superficiem pulmonum reperiebantur: alii minores per pulmonum textum dispersi. Hi adspectu a tuberculis admodum differunt atque ex morbo parum, ut videtur cognito, proveniunt.

Itaque auctor in ea versatur opinione, tubercula isthaec, quamvis ad genus lymphaticorum non pertineant, tamen ex vitio nasci scrofuloso eaque suppurantia phthisin facere pulmonalem.

Eandem sententiam profitetur, qui de accurata hujus morbi cognitione optime meruit LAENNEC, inque plurimis medicum Anglum secutus est.

Prius autem, quam de hoc auctore ejusque observationibus videamus, MECKELIUS nobis commemorandus est, qui et in aliis partibus et in pul-

monibus et vidit tubercula et descripsit sub nomine scrofularum II, 11, pag. 399. quas synonymas cum tuberculis habet. Creberrima esse in hisce notat citatque testimonium phthisiologi BAYLE, e quinque hominibus ex pulmonis morbo morientibus quatuor mori ex phthisi tuberculosa (\*). Is quae de magnitudine, dispositione, concretionem notaverat BAILLIE, universe comprobans, adjicit majora tubercula in pulmonum radice et lobo superiori inveniri, initio dura esse, nec semper glabra, immo interdum multis foraminulis pertusa tum colliquescere, transire in vomicas, in bronchia hiare, crebrius sinistram pulmonem aegrotare, interdum utrumque et quidem magna parte, ut minima tandem sit spirationi apta, vasa contrahi, concreescere, ex phlogosi, ad tuberculorum superficiem enascente atque vasorum rupturae obsistente: ulcera pulmonalia subinde cicatrices ducere, aut superesse saccos vacuos, neque tuberculorum sedem esse lymphaticas glandulas, quae PORTALLII opinio, nec tamen, ut huic visum, glandulas bronchiales semper esse ab hoc vitio immunes: tubercula vero haerere in cellulosa pulmonali, ut plurimum circa annum 30. evolvi, vidisse tamen jam in infante bimestri inque trienni in utroque pulmone numerosa et permagna, quae ex valetu-

---

(\*) Ex hacce, auctore BAYLE,  $\frac{1}{3}$  pars hominum, qui ex chronicis pereunt, interimitur.

dine antea optima intra tres, aut quattuor septimanas videbantur nata.

LAENNEC, de quo jam dicendum est, aliorum observationes emendans, historiam anatomicam tuberculorum magno studio prosecutus est. Duae sunt tuberculorum formae: nunc corpuscula solitaria formant: nunc infiltraciones. Primo sub conspectu materiae griseae semidiaphanae, quae deinde flavescit, obscuratur et densior fit, tandem liquescit, emollitur et per bronchia expulsa cavernas relinquit, sive caveas, sub nomine ulcerum pulmonalium quasque nomine excavationum tuberculosarum designat.

Tubercula miliaria, *granulationes miliares, tuberculosae*, primo semipellucida, immo diaphana, incolora, increscunt per intus-susceptionem. Interim punctum flavo-fuscum, opacum evolvitur et a centro ad peripheriam profectum universum tuberculum occupat. Massa concreta adpellatur tuberculum crudum. Textus pulmonum circum tubercula sanus est et tubercula etiam recondunt ulcera intestinalia phthisicorum in glandulis et alibi. Infiltratio tuberculosa grisea, crebro circum excavationes tuberculosas facta cernitur, vix separata exstat: textus pulmonum infarctus aëri impervius est; mutatur infiltratio grisea in flavam. Infiltratio gelatiniformis eandem subiens metamorphosin, deinceps flavescit, emollescitur atque emollita evacuatur per bronchia vicina. Ubi ex-

cavatio evacuatur, ejus parietes investiuntur pseudo-membrana.

In eodem pulmone tubercula vario gradu evolutionis reperiuntur: praesertim ad lobos superiores pulmonis dextri, quo loco saltem primo nasci solent, tum eruptione secundaria inferiore loco, quemadmodum testantur varii gradus evolutionis.

Tubercula raro in solis pulmonibus adsunt, plerumque etiam in glandulis colli, mesenterii, visceribus ipsisque ossibus ac licet vulgo in phthisicis pulmo primus aegrotet, subinde tamen tubercula pulmonum eruptione secundaria creari videntur.

Atque haec doctrinae Laenneccianae de tuberculis et phthisis pulmonalis genesi summa est.

Ab hujus viri doctrina recedit diligens anatomes subtilioris cultor SCHROEDER VAN DER KOLK. Is naturam tuberculorum indagare cupiens, ea investiganda esse statuit in corporibus hominum ex alio morbo mortuorum eaque oculo armato conspecta lymphae coagulabilis pellucidae plena cerni docet, foco magis opaco, dein albescere idque etiam fieri, si pars pulmonis tuberculosa vini spiritu condatur, concreescere dein cellulas et obfuscari et indurescere et formam induere pulmonum structuram lobularem sequentem, neque horum lobulorum tuberculosorum vasa materiam arte infusam admittere. Ita proserpente malo ad plures usque lobulos, hosce vasis concretis quum ali

desinant, marcescere, emori et facta suppuratione tuberculum emolliri ac solvi penitus.

Iis effici perhibet, aliter licet sentientibus BAILLIO et LAENNECCIO, tubercula inflammatione creari. Horum autem tuberculorum sedem non esse glandulas pulmonales, sed fines caecos bronchorum sive vesiculas. Aliud vero esse genus tuberculorum, ex glandulis verosimiliter nascentium, valde exiguorum, calculosorum i. e. materie calcarum repletorum, miliarium, si glandulae propter inflammationem naturam fibrosam adeptae sint. Tuberculo suppurato fit vomica, quae vicinis cellulis pari vitio affectis, pedetentim augetur, usque dum phthisi conclamata exhaustus aeger malo succumbat, quod citius accidit junioribus, quam senioribus (pag. 74.)

Quodsi quaeritis, cur tanta pulmonis adeo vasculosi pars destrui possit, sine haemorrhagia, vasa etiam inflammari notetis et ex inflammatione claudii, per lympham plasticam a vasis vasorum exhalatam. Primo clauduntur minora, dein trunci hique trabecula faciunt, medias vomicas transeuntia; quae tandem ipsa moriuntur pure resoluta.

Pariter bronchi inflammantur, absorbentur inque vomicam hiant aperti: quod in ramo majori si fiat, per vomicam puris plenam decurrente, ob irritationem mucosae bronchialis tussis concitatur et pus copiosissime effunditur, quod ex abscessu seu vomica rupta fieri perperam arbitrantur. Ner-



vi quoque in societatem mali veniunt, qui phlogosi et suppuratione sua et tussim molestissimam et spasticas pectoris affectiones movere videntur, nec non sympathicas ventriculi aegritudines, quibus tantopere torqueri genus phthisicorum solet. Circulationem autem concretis pulmonum vasis cohibitam, pleurae costalis vasis sustentari, hisce sanguinem suscipientibus, auctoris conjectura est: qua in re tamen adsensionem cohibere, quam temere adsentiri malo.

Hisce uberius expositis, breviter reliquorum viscerum in corporibus phthisicorum vitia persequitur. Hepar in phthisicis praegrande esse, una cum aliis, eandem rem testantibus, monet: ego quidem non vidi. Contra glandulas meseraicas raro affectas invenit. Saepius vero intestina tenuia inflammata et ulcerata atque ulceratum etiam colon. Haec ulcera ex pustulis oriuntur exiguis, liquore repletis et ruptis: primoque villosam invadunt, musculosam dein, solo peritoneo integro et extus facta cicatrice. Quae ex ejusmodi ulcere proveniunt lymphatica et glandulae meseraicae materia alba tenaci tument ac turgent. Denique perversum intestini coli situm, quem in maniacis cerni animadverterat ESQUIROL, eundem in cadaveribus etiam phthisicorum notatum a sese testatur auctor; cujus rei causam tamen ipsum penitus latere, ingenue fatetur.

Is hactenus a nobis traditis subjungere oportet.

let nuperas ANDRALLII animadversiones, qui cum in nonnullis BROUSSAIISSUM secutus sit, de hujus etiam placitis dicemus.

. BROUSSAIS igitur, postquam docuerat, ab auctoribus nimium auctas esse phthiseos species, testatur se per triennium in cadaveribus phthisicorum semel tantum vidisse ulcus pulmonum sine tuberculis idque ex corpore peregrino atque haec referens exclamat: tubercula, semper tubercula, eandem rem unam, qua convenient universa!

. Tubercula isthaec a systemate lymphatico repetens, phlogoses lymphaticas vocat, in quas credit omnes pulmonum inflammationes posse transire, si causae non tollantur, aut prava fiat medicatio sive catarrhi, sive peripneumoniae, sive pleuritidis. Sunt tamen homines male conformati, corpore non rite evoluto, mobili, irritabili, quorum systema lymphaticum sive sua sponte alteratur, sive eorum stimulorum potestate saltem, quibus omnis homo etiam tranquille et sedate vivens exponitur. Ea autem thesis solas spectat regiones septentrionales aut temperatas. Frigus namque maxime his timendum atque hyberno tempore phthisis ipsos adoritur ac leve refrigerium tussim movet, quodsi hi in regionem calidam migraverunt, evitabunt. Ex cutis functione impedita atque catarrho non pendere morbum, testantur illi, quorum pulmo exutorii vices supplere vide-

tur quique per longam vitam perpetuis catarrhis afficiuntur.

Diathesis illa phthisica non est a pectore angusto, verum ab irritabilitate lymphaticorum, cum constitutione laxa et mobili. In hisce functio cutis facilius turbatur frigore, unde augetur actio organica pulmonum, primo capillarium sanguiferorum, nervorum (unde haemoptysis, phthiseos exordio) ac tandem ipsa lymphatica laeduntur inque massas tuberculosas transformantur, a tuberculis immunes magis fortes iisdem tamen etiam caussis subsistentibus affici possunt. Itaque homines habitu gracili, corpore molli, capillis flavis, vultu colorato, pulsu frequenti, celeri, amplo quique antea fuerant scrofulosi, magis expositi erunt tuberculis siccis, phthisi chronicae magisque latenti. Pectus angustum quidem auget metum, nec tollit tamen amplum (pag. 216.) Requiritur ad phthisin acutam diathesis lymphatica huiusque systematis proclivitas ad evolutionem simultaneam et promptam fasciculorum lymphaticorum et altero loco magna evolutio systematis sanguiferi, aetas vero ab anno 18—35.

Propria phthiseos varietas est nata ex tumore scirrroso et vitio lymphaticorum, quae circumdant principes ramos bronchiorum et mediastinum. In phthisicorum cadaveribus invenitur induratio rubra, ex phlogosi sanguinea et evolutio massarum scirrhorarum, caseiformium, pultacearum,

lardacearum, calcarearum, ossearum, quæ *per-* tinent ad vitium lymphaticorum et materies lardacea hujus pariter loci videtur; metamorphosis calcarea, cartilaginea, ossea in tuberculis debetur viribus chemicis libere agentibus. In aliis partibus: ventriculo, intestinis et glandulis mesentericis etiam concitantur phlogoses et phthises siccae atque chronicae provocant vitium tuberculosum universale in peritoneo, epiploo, hepate (*foie gras* ex metamorphosi lardacea) splene, systemate uropoietico, cerebri serosa.

Cum ea, quam proposui, theoria Broussaissiana conveniunt in multis ANDRALLII de tuberculis placita. Is quidem negat, sedem tuberculorum esse in genere lymphatico, affirmat vero ea esse producta inflammationis, qua secernitur tum in vesiculis pulmonalibus, tum in parenchymate celluloso interlobulari pulmonum pus sui generis sive materies tuberculosa, quae quamvis in lymphaticis fuerit reperta, uti duobus casibus probat, tamen in hisce non secernitur. Creatur igitur secretionem morbosa propter congestionem activam, quae in omni nutritione pariter ac inflammatione est (utriusque processus analogiam exemplo foetus et generationis pseudomembranarum indicat pag. 21 sq.) quacque quo major erit dispositio, eo minorem requireret actionem vasculosam: congestionem levem, si magna, inflammationem, si parva; quodsi nulla fuerit haec dispositio ne vel gravissima phlo-

gosis formabit tubercula. Ab hisce positis principiis sequentia ducit consectaria ANDRALLIUS.

1. Tubercula creantur secretionem morbosam.
2. Iis perperam tribuitur nomen contextus proprii.
3. Actio pathologica, quae praecedat hanc secretionem, est congestio sanguinis activa, qualis omnem secretionem praecedere solet.
4. Ea materies secerni potest, sive ad superficiem liberam bronchiorum, sive in parenchymate pulmonum celluloso.
5. Nondum demonstratum est, ganglia lymphatica pulmonum interdum esse sedem tuberculorum.
6. Hypothesi, quae in hoc systemate eorum sedem ponit, multa facta non favent.
7. Interdum vasa lymphatica pulmonum et aliarum partium ejusmodi materiei plena reperiuntur.
8. Granulationes miliares BAYLII non sunt tubercula nascentia.
9. Eae granulationes rubrae sunt et molles, priusquam griseae fuerint et durae.
10. Forma granulationum non manifestatur ante sectionem aut rupturam lobulorum pulmonalium.
11. Istae granulationes non sunt producta nova.

12. Constant particulis lobulorum pulmonalium, seorsum inflammatis.

Ab his placitis ita dissentiunt phthisiologi Francisci celeberrimi BAYLE et LOUIS, ut uterque inflammationem tanquam tuberculorum causam rejiciat eamque theoriam rerum testimoniis impugnet.

Minor ut videtis de rebus factis, quam de earum exegesi inter viros doctos dissensio est, aliis vitium proprium peculiare accusantibus, aliis inflammationem aut in lymphaticorum genere, aut in vesiculis, aut in parenchymate pulmonali sedem figentem. Nos nulli adhaerentes doctrinae neque veteri, neque novae, sed verum quaerentes, priusquam de morbi natura statuamus, omnem ejus historiam exarabimus atque tum ex illius reliquiis, tum ex ejus signis, praesagiis, remediis efficere conabimur, quae tandem sit ipsius natura.

Est in notandis morborum signis distinguendum inter ea, quae *pathognomonica* vocantur ac morborum characteres stabiles constituunt et inter ea, quae non ad morbum ipsum, sed ad corpus organicum, in quod morbus cadit, pertinent ideoque hominis aegri symptomata vocantur. Ea autem distinctio id difficultatis habet, in hoc praesertim de quo agitur morbo, chronico illo atque lente succrescente, quod signa ejus, praecipue ini-

tio, priusquam adoleverit, minus manifesta esse atque perspicua deprehendantur, cum tamen vel eo maxime tempore ipsum cognovisse nostra plurimum intersit, quoniam facilius nascens opprimi, quam adultus tolli potest.

Hanc ob rem ne praetermittatis quaerere, quibus aeger natus sit parentibus quasque antea expertus sit valetudines. Ita accepi saepius, parentum alterutrum obiisse in flore aetatis phthisicum, ipsumque aegrum crebra diuturnaue tussi fuisse afflictum. Quodsi observaveram cum habitu gracili, cute tenera, genis roseis, circumscripto rubore, capillis flavis, pectore angusto, collo procerro, humeris alatis, spiratione citatiori pulsuque frequenti, animoque mobili nulla mihi supererat circa diathesin phthisicam, id est circa proclivitatem in hunc morbum dubitatio. Ut haec constantis sunt observationis, teneatis tamen velim, non in omnibus haec signa cerni universa. Etenim crebro parentibus non phthisicis proles phthisica generatur, crebro ex phthisi pereunt, quibus nec flavi capilli, nec cutis erat florida tumque signa vel plura, vel nonnulla hypothesin facient aut magis, aut minus probabilem: quinimmo tantum abest, ut frequentes catarrhi v. c. certam aut justam praeberent phthiseos subnascentis aut futurae suspicionem, ut non desint homines longaevis semper fere tussientes.

Etiam signis phthiseos futurae dentium colorem

lacteum eundemque tristem a candido eburneoque splendore dentium sanorum mire abludentem adnumerat PETRUS CAMPERUS *Dissert.* Tom. I. p. 304 sqq. quod quidem signum eo majoris faciendum est a vobis, quo dentium pulcritudo et nitor rariores sunt in nostra regione dotes quoque facilius igitur animadvertitur; idemque etiam in scorbuticis notari, quos vix fieri phthisicos sique fiant, eorum dentes pedetentim albescere et lacteum colorem ducere, licet antea cariosi fuerint. Aliud signum nostras pariter notavit SCHROEDER VAN DER KOLK: oculos nempe protuberantes, splendidos, praecipue in juvenibus, haereditaria phthisi affectis. Utrumque signum saepius observavi, consideravi etiam saepius, praesertim postremum: magisque phthisicis myopibus, quam universis proprium esse crediderim. Quidquid sit, ut haec minime negligenda esse arbitror, ita plurimi aestimanda quae spirandi officinam spectant: spiritus brevior, anhelitus facilis, tussicula matutina, affectiones spasmodicae, quarum thorax primaria sedes: quas vidi hystericam passionem mentientes in puella phthisica, vox rauca vel clangosa, vel exilis, quibus accedunt cutis ardores, rubores fugaces ipsaque pectoris denique prava conformatio et habitus corporis tener ac gracilis.

Tandem haemoptysis crebro jam latentem in pulmonibus phlogosin prodit, si puberibus in phthisi inclinantibus eveniat, ex illa Coi senis observa-



tione: *ex sanguinis sputo, puris sputum*, quam quotidie observatione confirmatam cernimus. Hoc dubiis signis adnumerat LAENNEC: neque ego adeo constans vidi, ut pathognomonicum habeam. Novi haemoptoicos, qui phthisin effugerunt, novi phthisicos, qui per omnem morbi decursum non passi sunt haemoptoën, novi qui lethalem passi sunt, provento jam morbo. Illa tamen si fiat ea aetate, qua phthisis evolvitur ex eoque corpore, quod phthisicum habitum monstrat, tam certum habeo morbi nascentis indicium, ut nullum mihi de hac re dubium supersit, quamvis eo nondum perventum esse credam, ut de aegro servando sit desperandum. Illud hoc loco meminisse juvabit, in diagnostica arte semper symptomatum *syndromen* notandam esse atque signis utendum non singulis, sed universis; neque singula rite dijudicari, nisi conjunctorum rationem habeamus. Quam qui non servet legem, is nullius morbi certam notitiam acquirere poterit, aut huic oppositam invenire curationem.

Ad symptomata prodroma morbos etiam (?) refert celeb. ANDRAL et quidem inflammationem mucosae pulmonalis, haemoptysin, inflammationem parenchymatis pulmonum, aut pleurae. Illa aut laryngem, aut tracheam, aut bronchia tenet, ab eaque ordiri solent tubercula, quae tamen utrum nunquam praexistere, quemadmodum auctori placuit (Tom. IV. pag. 34 sq.) vehementer dubi-

to, neque vim capio argumentorum, quibus hanc thesin suam defendit.

Haemoptysin, quam repetitam licet non semper phthisis sequitur, non a tuberculis, quae LAENNECII opinio, verum a congestione (*apoplexia pulm.* LAENNEC) repetit, haemoptysin inferente et simul tuberculorum genesi in praedispositis praebente opportunitatem remque observatione probare conatur. Ex quo tamen casu rem probari posse, vix crederem (quamvis utrum vera sit explicatio non quaeram). Nihil enim inde constat, quam in eodem homine ex peritonitide chronica laborante atque haemoptysi extincto, simul in pulmonibus exstitisse et congestionem (apoplexiam pulmonalem) et tubercula et haec praeterea fuisse in peritoneo sique morbum ex iis quae lego, minime enim accurate descriptus est, interpretari liceat; crediderim, tubercula primo in peritoneo, deinde, eruptione secundaria, in pulmonibus fuisse nata: exemplo licet rariori, ex observatione celeb. LOUIS: minus raro secundum alios.

Tertio loco praecedere monet auctor, peripneumoniam praecipue lobularem inque hujus rei testimonium aegri ejusdam historiam profert. Verum neque haec historia, cui plurima desunt, aliud quid demonstrat, quam reperta esse in eodem pulmone tubercula et phlogosin, illa in uno loco sine ulla inflammatione separata cernebantur atque in hoc pariter casu praecesserat tuberculorum in ab-

domine genesis eam in pulmone ( obs. 4. pag. 43 :  
sqq. )

Thesin alio pariter casu firmare conatur: observatione phthiseos ex morbillis ortae. Spectat haec: observatio virum juvenem, cute tenera, candida, oculis caeruleis, ciliis longis, genis roseis, quem: animi affectus deprimentes, curae edaces, inedia: ante annum vexaverant. Miror vehementer, hisce: relatis potuisse auctorem adjicere: hic ut alibi nihil favere opinioni, tubercula in pulmone jam ante morbillos exstitisse, ( pag. 46 ) praesertim cum alio loco fateri coactus sit, tubercula non semper sequi veram inflammationem ( pag. 52. ) et ubi dispositio est ad tubercula majori gradu, vel levem aberrationem nutritionis iis creandis sufficere: hanc autem praedispositionem positam esse in prava conformatione thoracis, licet sine ea nascantur in: non dispositis, pulsu amplo, corpore robusto, quemadmodum testantur exempla complura, quae scripto mandarunt BAYLE et LOUIS ll. ll.

Symptomatum phthisicorum alia sunt propria, peculiaria tuberculis, alia sympathica, alia denique secundaria.

Propria signa sunt, quae pectus percutiendo, auscultando, ipsamque spirandi officinam ejusque functiones observando cognoscimus.

Percussio thoracis interdum nihil indicat, interdum sonum clariorem eo, quem pulmo sanus edit, sive cavea propter resoluta tubercula facta

sit, seu propter dilatatas vesiculas emphysema pulmonum existat, seu propter parietes pectoris ejusque musculos macie extenuatos. Sentitur etiam sonus, tinnitus metallicus, aut fremitus a digitis admotis, ubi caveas in pulmone creaverit abscessus. Sonum percussione obscurari atque obtundi et inaequalem fieri, si magna copia tuberculorum aggregata sit, in summo pulmone idque ad claviculam dextram, primo percipi, quoniam pulmo dexter et primo et maxime aegrotat, auctor est LAENNEC. Deest hoc signum tuberculis ad radicem pulmonum et glandulas bronchiales creatis, simul stethoscopio auditur bronchophonia diffusa infra claviculam in fossa infra-spinali et sub axilla. Potissimum vero tunc signa certa et manifesta stethoscopio auscultationeque audiuntur, quum facta sit vomica.

Ubi emolliri incipiunt tubercula, auditur strepitus dumque cavea evacuatur, respiratio fit cavernosa et bronchophonia cedit pectoriloquio imperfecto primum et intermittenti, deinde magis magisque manifesto, interim fremitus ille percussione cognoscitur in gracilioribus, quorum parietis thoracis sunt tenuiores et costae mobiliiores. Pectoriloquium eo magis perfectum est et manifestum, quo sonus vocis acutior: in feminis v. c. et junioribus et siquidem intermittit, saepius auscultanda vox est ac praesertim post excretionem minus facile auditur, ubi excavatio inae-

qualis, aut a pulmonum superficie remotior: ubi excavatio ingens et anfractuosa loco pectoriloquii auditur respiratio amphorina et tinnitus metallicus; cessat pectoriloquium, ubi excavatio tuberculosa in pleuram effunditur, quo tempore dolor pleuriticus acutus medico, quid factum fuerit, indicabit.

Itaque est ubi auscultatio tubercula neutiquam indicat, quamdiu cruda sunt, aut licet emollita, nondum caveas fecerunt, est ubi dubia signa praebet, qualia sunt strepitus, rhonchi plures et mutationes soni respiratorii et vocis: quae pariter a bronchis plenis materiae liquidae et peripneumonia nascitur; sola signa certa sunt pectoriloquium manifestum, una cum aucto spirandi sono ex impedita respiratione et circulatione pulmonali inter spirandum saepeque alternante cum strepitu. Haec signa certa factas demum cavernas comitantur, praecipue quum substantia pulmonum vicina durior est.

Quapropter solis signis, quam auscultatio praebet, non fidendum, nisi reliqua etiam symptomata iiscum consentiant: de quibus jam videndum.

Ea nempe, quae physica dicuntur signa, i. e. stethoscōpio et percussione pectoris percepta, expōsui. Jam reliqua interpretemur.

Symptomata morbi nati (nascentis morbi symptomata prius a nobis commemorata sunt) habentur: debilitas, macies, tussis, febris.

Plerumque incipit phthisis a tussicula sicca; quae diu perstat, quin tamen aliud symptoma ipsi jungatur. Saepius tamen sequitur expectoratio mucosa, ingens. Interdum a catarrho acuto, orditur, aut ab haemoptysi. Quocunque modo, inceperit, pedetentim expectoratio muci copiosa et febris continua existunt. Haec duas habere solet exacerbationes: alteram meridianam, aut pomeridianam, alteram nocturnam. Interdum sub typo tertianario simplici, duplici, quotidiano, intermittente prodit. Fiunt sudores ingentes matutini. Magis febricula est, quam febris manifesta: in feminis catamenia fluere desinunt, hancque amenorrhoeam phthiseos causam habet hominum vulgus. Quam primum febricula hectica corpus teneat, macies fit manifesta, saepenumero alvus liquida est: atque hae excretiones sive alvi, sive sudoris, sive sputorum, quo fuerint copiosiores, eo magis decrescit habitus. Cutis albescit et decoloratur, saltem colorem aegrum ducit, valetudinarium, pallidum, flavescens: brevi macies in verum marasmm transit, eamque offert speciem, quam ARETAEUS ad naturae veritatem expressit (*De caus. et sign. Chron. I, 8.*).

Hoc tempore stethoscopium indicat, caveam tuberculosam esse prorsus vacuam et morbus manifesto remitti videtur. Minuuntur sputa, febris, macies, verum post ejusmodi fallacem remissionem, recrudescit denuo sicque phthises nonnullae

chronicae in annos interdum trahuntur. Emendatur conditio aegri, ubi auditur rhonchus et respiratio cavernosa atque eruptio secundaria non fit, nisi postquam tubercula primo creata fuerint prorsus emollita: quodsi nulla fiat, raro licet exemplo, plena sequitur convalescentia; sin vero, quemadmodum fieri solet, eruptiones secundariae antea fiant, haec morbi remissio aut nulla erit, aut brevis admodum. Varios istos morbi eventus observationibus singulis illustravit LAENNECCIUS, quas hoc loco proferamus ad perficiendam hujus morbi historiam. Observatio 26. remittentis morbi exemplum praebet, observationes 25, 27 et 28. morbi sanati.

Mulier honesta juvenis Lutetiam Parisiorum venit, sui morbi remedia quaerens, quae in ea quam incolebat Galliae provincia frustra expectaverat. Cuncta monstrabat phthiseos pulmonalis signa: tussim crebram, sputa puriformia, summam maciem, febrim hecticam, sudores nocturnos. Plures glandulae lymphaticae colli erant durae et tumidae: hisce symptomatibus se junxerat ante paucos dies diarrhoea gravior. Praescribuntur nonnulla tonica adstringentia, balnea sulphurea, et lac asinum, quibus adhibitis duos menses vires, habitus et rubor in vultu rediere; evanuerat tussis, tumor glandularum cervicalium multum decreverat atque aegra domum reversa est, prospera ut videbatur, valetudine fruens. Hyemem bene

transegit, verum mense Aprili tussis omniaque phthiseos symptomata rediere, increvere atque aegra sub finem aetatis obiit.

- Ut hoc morbi remissionis, aut intermissionis exemplum est, ita sanationis est observ. 27.

Anglus annos natus 36, corpore satis robusto, temperamenti lymphatico-sanguinei, initio m. Septembris a. 1813. patitur haemoptysin sat gravem, quam sequebantur tussis sicca, expectoratio sputorum puriformium, febris hectica, dyspnoea, sudores nocturni, summusque marasmus. Medio Januario massam expectoravit tuberculosam parvae nucis magnitudine. Ineunte Febuario symptomata ita decreverunt, ut convalescere videretur. Mense Aprili perfecte sanus, ab eo inde tempore plurima itinera fecit, atque anno a morbo undecimo illibata fruebatur optimaque valetudine.

Observatio, quae sequitur 28, phthisin spectat ultimo gradu perfecte sanatam, aëris mutatione et habitatione ad littora maris; quae sanatio tam perfecta fuit, ut potuerit aeger causicus, ut munus ferebat, publice causam dicere absque ulla molestia nihilque ex morbo relictum sit, praeter tussiculam aëris vicissitudinibus praecipue molestam.

Quod autem revera sanatio ulcerum pulmonalium fieri possit, tum stethoscopium, tum corporum mortuorum docuit lustratio, quemadmodum exemplis pluribus demonstravit LAENNEC II. pag. 62 sqq.



De sputis dissensio est. Veteres hoc signum magni faciebant: negligunt fere recentiores. Criteri-  
teria mucii a pure etiamsi certa essent, capropter  
tamen non sufficerent, quoniam non tantum pus,  
sed materies tuberculosa discernenda foret, quae  
non facile discerni potest, auctore LAENNECCIO. Spe-  
ctarunt alii dotes physicas, alii analysi chemica  
usi sunt. Aqua marina explorabant sputa veteres,  
quaeque illa essent graviora, damnabant. Haec ex-  
plorandi ratio jam reprobatur a celebri antiquita-  
tis diagnostico ARETAEO. Nec certior est analysi  
chemica, quum mucus, pus et materies tubercu-  
losa in sputis misceri solent: in hujus dotibus che-  
micis perquirendis praecipuus labor collocandus  
esset. Intelligitis autem, quamdiu tubercula cru-  
da sunt, hocce criterium nullius fore usus, post-  
quam vero emollita excreantur, manifesta non de-  
erunt signa phthiseos. Idcirco adsentendum est  
ARETAEO, visum alio quovis sensu esse certiore  
atque ad omnem morbi faciem attendendum, quam  
cum reliquis signis collata sputa praesertim gru-  
mosa denotabunt. Interdum sputa crassissima vi-  
dimus plastica, grumosa, mali odoris, interdum  
parva, tenuia, saniosa, interdum mucosa ad mor-  
bi lethalis exitum, interdum nulla, aut parcissima  
tantum eaque catarrhalia, sive bronchialia, saepe-  
numero multum varia, ut secretio, quae mutabilis,  
ut vitae conditio omnis. Certe falleretur, qui a  
solis sputis diagnosin duceret.

Pariter atque in aliis rebus, iudicio opus est; nec numeranda tantum signa, sed comparanda inter se, ponderanda, dijudicanda. Quodsi cum reliquis affecti pectoris spirandique officinae symptomatibus expuatur materies grumosa, alba, subflava, opaca, oryzae coctae similis eaque granulata, phthiseos tuberculosae haud vanus metus suboritur. Ex solis autem ejusmodi sputis nulla certa conclusio, immo phthisin observarunt sine tussi, morbo pectoris abdominis aegritudine obscurato, id quod post BAYLE, LOUIS, alios, notabili casu ostendit ANDRAL, in quo tubercula intestinorum horumque et peritonaei phlogosis phthisin tuberculosam ita occultasse videntur, ut hujus levia tantem apparerent indicia, pag. 107.

Exempla hujus exceptionis, quae vel legimus; vel observavimus ipsi morbum abdominis tuberculosum spectabant. Subfuisse etiam capitis similem valetudinem testantur phthiseos cum mania alternantis casus, qualem etiam in monitis et praeceptis medicis (pag. 44 sqq.) scripto mandavit RICH. MEAD, dignissimum eum, quem hoc loco vobiscum communicem. Virgo annum agens 28. sputo sanguinis ex pulmone cum tussi perpetuo fere prorumpentis, vexabatur. Itaque missus est e brachio copia satis larga sanguis, altero quoque die, ad quinque aut sex vices. Minuebatur hinc, nec tamen cessabat malum; et transactis duobus mensibus, supervenit febris hectica, siti, calore et

nocturnis sudoribus comitata. cum summa macie viscidaeque ac tenacis materiae frequenti excretionem, quae ex faucium et pulmonum glandulis ferebatur, intermixtis hic illic puris flavi portunculis. Instabat jam vera phthisis et mors prae foribus adesse videbatur. Aegra igitur de animae salute sollicita esse coepit. Praesto erant sacerdotes, qui cum viam ad coelum munire deberent, asperam contra ac difficilem illam monstrabant. cum precibus, jejuniis animique angoribus calcandam; quasi nimirum vitae futurae felicitas infelicitatibus et aerumnis praesentis vitae tota esset redimenda. Quid tandem fit? Misellam sacris terroribus victam, brevi invasit religiosa dementia; nocte dieque oculis obversabantur daemonum species, flammae sulphureae et poenarum apud inferos aeternarum horrendae imagines. Ab hoc autem tempore evanescere indies coeperat, quae morbus antecedens, secum attulerat incommoda; decrescere calor febrilis, sputum sisti, minui sudores et habitus totus ita in meliorem verti, ut quo minus mens corpori regendo par erat, eo magis vires officiis vitae sufficere viderentur. At paucos post dies prorsus melancholica evasit. Morbus igitur exinanitionibus, prout vires ferre poterant et idoneis remediis ita oppugnabatur, ut sanitatis integrae spes aliqua ostenderetur. At proh dolor! postquam tres menses fere sunt elapsi, febre hectica cum pulmonis exulceratione reversa, tabe

confecta periit meliori fato, ut visa est, digna puella (\*).

Tussis et expectoratio magis bronchitidis sunt, quam phthiseos tuberculosae symptomata: quo mucosa pulmonalis minus affecta sit, eo minor tussis et excreatio. Sputorum maxima pars ex bronchiis secernitur. Tum demum sputa morbum denotabunt, quum tubercula jam emollita cum bronchiis majoribus communicant. Id uno ictu fieri, aut pedetentim observatur. In priori casu mors asphyctica instat, nisi prompte extus ejiciatur materies; in altero minor est periculi gradus et tuberculosa materia cum muco mixta exit. » Vir mediae aetatis symptomata patiebatur phthiseos nascentis. Uno ictu post vehementem tussim excreat ingentem copiam puris grumosi, quae in vias aërias congesta mortem intulit asphycticam (†). En ita dictam vomicam ruptam, cujus mechanismum optime explicuit vir Clar. VAN DER KOLK! Si subito supprimantur sputa, deficientibus viribus, brevi mors expectanda est.

Expelluntur cum sputis nonnumquam membranarum spuriarum ipsiusque pulmonis detriti fragmenta, in aliis calculi formae et compositionis va-

---

(\*) An hic organica, an dynamica cerebri affectio? Potius congestio ideoque dynamica fuisse videntur. Nec desunt exempla arachnitidum et cerebri organico morbo laesi.

(†) ANDRAL, Obs. VI. pag. 123 sqq.

riae plerumque e phosphate calcis quique ANDRAL-  
LO videntur partim esse fragmenta cartilaginum  
bronchialium in ossis substantiam mutatarum, par-  
tim tubercula indurata, petrefacta: Cl. VAN DER  
KOLK visa est morbosae glandularum mutatarum se-  
cretio. Caeterum neque foetor, nec sapor sputo-  
rum certi quid indicant.

Haemoptysis quae tum ex bronchis, tum ex pa-  
renchymate pulmonali, tum ex cavernis ulcerosis  
provenit: vix, quae vulgaris opinio, ex vasis ru-  
ptis aut erosio (\*) phthisin non facit, ut ferunt,  
nec certo praenotat, verum ut plurimum congestio-  
nis pulmonalis sequela est: quapropter mulieribus  
phthisicis praesertim tempore catameniorum repe-  
ti consuevit. Eo autem tempore, quo sputum san-  
guinis fit, jam existunt tubercula. Denique no-  
tandum, effundi interdum materiem tuberculosam  
in pleuram perforatam, unde funesta cito pleurae  
inflammatio concitatur. Caeterum neque ignorare  
oportet, plurima signa phthiseos esse posse ex ca-  
tarrho phthisin mentiente: id quod animadvertit  
LAENNEC, animadverterat jam prius BAYLE lib. I,  
pag. 164. De exemplis tamen quae profert ille  
disputari posset, utrum omnis abfuerit diathesis  
phthisica et tuberculorum nota.

Inter symptomata sympathica primo loco numq-

---

(\*) ANDRAL, pag. 166. semel tantum id notavit.  
*Lib. II. Pars I.*

randa febris, de qua antea vidimus, quamque facta suppuratione putridam, minus recte tamen vocat MORTONUS. Deesse subinde, etiamsi in pulmonibus existant cavernae, animadvertit ANDRAL: jure tamen dubitari posset, utrum non levior subfuerit, praecipue nocturno tempore, quod interdum observavi; nunquam vero omnem vidi abesse febrim, toto morbi decursu. Ex sudoribus matutinis terminari, sive remitti potius ea solet, qui fiunt ex capite potissimum, collo et pectore: quibus sudoribus febris hectica a phthisi manifestatur quosque a suppuratione repetunt. Certum est, hac facta aegrum admodum extenuari refectionis inopia, sanguinis tum penuria, tum dyscrasia.

Habet phthisis interdum decursum anomalum, sive tuberculorum prima eruptio fiat in aliis partibus: in canali cibario, ubi ab alvi fluxu incipit, sive glandulae lymphaticae, colli, mesenterii, aut bronchiales prius fuerint tuberculosae, sive inter alios morbos intercurrat: scorbutum, syphilidem, caet. sive lateat sub larva passionis hypochondriacae, aut catarrhi pulmonum.

Evolutionem et emollitionem tuberculorum aut subitanam, simultaneam, aut tardam separatam sequitur decursus morbi acutus vel chronicus. Acutae exemplum profert LAENNEC: puellae annorum 18. pulchritudinis eximiae, quam catarrhus acutus ut videbatur et gravis intra mensem sustulerat, quin tamen forma macie perierit. Recluso

thorace pulmones reperti sunt pleni tuberculorum emollitorum et supparis ferme magnitudinis. Chronicae phthiseos notabile pariter exemplum is, quem citavimus, auctor commemorat, viri, qui postquam per triginta annos recurrentes quovis triennio aut quadriennio phthiseos insultus erat passus, tandem aegrotandi et vivendi finem fecit, paullo antè obitum pectoriloquus summo gradu (pag. 171).

Haud raro pendet morbi acuties ex pleuritide, peripneumonia, pleuroperipneumonia, bronchitide accedentibus, quibus vel emollitio tuberculorum acceleratur, vel cohibetur, aut interrumpitur spirandi motus. Solet etiam accedere inflammatio intestinorum et ulceratio et aphtharum saepius repululantium in ore eruptio. Ulcera isthaec ad finem ilei et in coeco chronicam suscitant et sustinent diarrhoeam, quam colliquativam vocare ultimoque morbi stadio adsignare consueverunt.

Atque haec mala sunt, quae miserorum phthisicorum mortem praecipitant, quae ex ea parte fieri observatur, ex qua phthisis originem duxerat.

Adumbravi hujus morbi historiam: superest ut de praesagiis deque auxiliis exponam ac tandem tum de causis, tum de natura morbi disputem.

Praesagia maxime fida petimus a seminio, quod dicitur, aegrotantis conditione, symptomatibus.

Seminium illud phthisicum, quod cum in scrofulosis praesertim esse solet, tum maxime cernitur propria illa, quam antea descripsi, corporis et

pectoris fabricatione, tantam indicat in morbum huncce proclivitatem, ut hanc superandi vix ulla spes sit. Si igitur hanc architecturam phthisicam observetis, si audiat is patrem vel matrem ex phthisi occubuisse, infaustam edere prognosin oportet. Haereditaria phthisis, recte notante BENNETO, in *Theatro Tabidorum*, immedicabilis esse solet. Inter pessima signa ea habentur, quae proVecti morbi stadium denotant. Itaque si collapsus habitus et extenuatus, si macies manifesta vel imperitis, si sputa copiosa, crassa, purulenta, si sudores nocturni, matutini, si perpetua febricula: si quae colliquationis symptomata vocant, animadvertantur: diarrhoea, aphthae, capillorum defluvium, unguum incurvatio, oedema pedum, rem conclamatum esse sciatis. Quod si cupiatis inimitabili arte depictum legere, en ARETAEI descriptionem! » Nares acuminatae, graciles, malae exstantes et rubidae, oculi cavi, lucidi, micantes, tumida, excarnis, pallida, seu livida facies, buccarum tenuia dentibus inhaerentia, ut ridentibus similes sint: in omnibus denique cadaveris speciem referunt." Hisce adjungenda BENNETO commemorata prognostica. Si hectica per vices inaequales phthisicum diutius tenuerit, fatalem indagat eventum. Phthisici cibum avide adpetentes et exinde robur non acquirentes desperati. Si virginibus maturioribus, quibus sanguis menstruus non fluxerit, contigerit phthisis ejusque in pectoralia fit anadrome, dege-



neratio pessima, depeculatio repentina, eventus funestus. Si artis adminiculo sputum variegatum fit concolor, si a foedato optime depuratum, si ab inaequali optime subactum, si a salino insipidum, si a foetente inodorum, si denique facilius provenerit, sanitatis futurae indicio est (*Theatr. Tab. pag. 100.*)

Vulgo, neque immerito forsitan, phthisis pulmonalis insanibilis haberi solet. Sanari tamen posse, non tam artis, quam naturae beneficio, exemplis demonstravit LAENNEC. Scil. eo tempore, quo cavernae vomicarum vacuae cicatrices ducunt. Id autem raro fieri vel exinde intelligitis, quod ut eveniat, requiratur, ut nulla fiat eruptio secundaria nullaue alio loco tuberculorum tum evolutio, tum emollitio; quae certe rara obtingit phthisicis felicitas. Est enim in tuberculorum generatione, ut in carcinomate. Subest fere diathesis corporis communis: unde pluribus simul locis nascuntur tubercula, vel ab uno ad alium locum propagantur, ita ut materies isthaec heteroplastica perpetuo repullulet atque renascatur perque corporis partiumque stamina perfusa vitae motus sufflaminet.

Signa faustae sanationis sunt: post sputa materie tuberculosa gravia, sputa mucosa, tussis plurimum mitigata, apyrexia, nullus sudor, nec alvi fluxus, rediens cum viribus habitus corporisque torositas.

Quae jam de *prognosi* monuimus, sponte nos

ducunt ad curationem. Haec alia est prophylactica, alia therapeutica. Illa cum caussarum remotarum, haec cum proximae cognitione arctius nectitur.

Prophylactica curationis pars omnis versatur circa caussas remotas amovendas. Si ad geographicam phthiseos pulmonalis distributionem attendamus, videbimus eam praesertim in regionibus frigidis humidis esse endemicam, in regionibus calidioribus vix cerni, a tropicis ferme abesse.

Nonnullis dicuntur tubercula et intermittentes sibi invicem esse opposita; quod profecto nostra patria neutiquam probatur, in qua et intermittens febris endemica est et endemica pariter phthisis. Immo norunt omnes medici, febres intermittentes saepenumero evolvere latentem in pulmonibus diathesin tuberculosam. Quemadmodum igitur in hac parte ab opinione Viri Cl. SCHOENLEIN (Vol. III. pag. 110 sq.) dissentio, ita in altera ipsi adsentior, magnam esse morbi tuberculosi et morbi scrofulosi cognationem. Arbitratur LAENNEC, aërem maritimum phthisicis esse salutarem eosque, qui ad littora maris habitant, a phthisi immunes vivere. Equidem hanc thesin nimis generalem puto (\*). Verum est, itinera maritima

---

(\*) Sunt qui clima maritimum minus salubre habent, quae CLARKII opinio est ac quicquid boni ex navigatione percipi-

phthisicis prodesse, iis praesertim qui ex locis frigidis in calida migrant: idcirco navigationem commendabant veteres et medici Angli phthisicos in regiones calidas mittunt. An syphilis, abusus mercurii, inprimis sublimati tubercula creet, cum LAENNECCIO dubito, an evolvere possit, nequaquam dubito. Haemoptysin neque tubercula facere credo, neque a tuberculis concitari, etiamsi primo morbi tempore vulgo observetur, ex sanguinis in pulmones congestionem, facta plethora ad volumen, propter pulmonem puerilem pubertatis metamorphosin non rite subeuntem, arcto pectore reconditum, ac tuberculis forsitan infarctum. Pari modo atque ex turbata metamorphosi capitis et cerebri puer crebras patitur epistaxes. Quam inter epistaxes et haemoptyses adfinitatem tantam adgnovit STAHLIUS, ut quibus pueris narium haemorrhagia fieri solebat, iisdem juvenibus futuram haemoptysin praedixerit.

Animi pathemata deprimentia, quae dicuntur, magnam habere vim tuberculificam, similiter atque carcinomata creant atque reliqua vitia heteroplastica ex nisu formativo aegrotante, tum exemplo magnarum urbium, in quibus ex causis moralibus morbus frequens, tum coenobii mulie-

---

tur, ipsi exercitationi praecipue imputant, id quod prius contenderat GREGORY, quem citat CLARKIUS.

bris Lutetiae Parisiorum probatur exemplo, quod et abstinētia et religionis incusso metu, et perpetua animorum irritatione brevi tempore summam assequi sperabat sanctitatem: quo factum est, ut moniales brevi tempore perirent phthisicae, nisi prompte alio migrarent atque intra decennium altera aut tertia vice ipsum renovatum viderit ejus medicus LAENNEC (pag. II9 sq.)

In animalibus domesticis defectus exercitii et seclusio vim habent tuberculiferam. Quocirca motus moderatus in aprico sub climate amoeno, rusticatio, peregrinatio ab antiquis inde temporibus a medicis laudatae sunt. Veteres ad Aegyptum navigare cupiebant phthisicos, quos cum iter maritimum, tum loci calidioris habitatio juvabat, recentiores Angli praesertim tum Italiam meridionalem ac clima Romanum prae reliquis laudant, tum vero imprimis prae reliquis Maderae insulae. Certum est, nostri climatis vicissitudines male tolerare phthisicos et tum autumnii humido frigido, tum gelu hyberno, tum imbribus vernalibus praesertim flante Borea laedi plurimum. Nec minus certum, catarrhos crebro latentia tubercula excitare et pulmonum phlogoses: vel maturare eadem, vel infaus- tum morbi exitum accelerare. Eapropter ab aëre matutino, vespertino cavendum, corpusque iis vestibus, qui male calorem dimittunt, operiendum est. Etiam victus lautior stimulans vitandus at-

que alimentis blandis eupeptis euchymis utendum est.

De contagione dissentiunt. Videtur tamen ubi colliquationis signa comparent, minus recte negari atque phthisis eo modo nata omnium minimam spem relinquere.

Haereditaria quin sit, negari non potest. Parentes phthisici phthisicam prolem generant, quae haereditaria labes juventutis maxime tempore prodat, quamquam non desunt exempla tam infantum puerorumque, quam virorum senumque ex hoc morbo extinctorum. Ipse vidi et infantes puerosque que et senes phthisicos (\*). Puberes tamen ac praecipue puellae ex pulmone aegrotant, ut ideo hac aetate praesertim omnis pulmonum irritatio inque eos congestio: canendo, saltando, vociferando vitanda sit, quamvis modica et prudens exercitatio subinde pulmones roborando diathesin superasse legatur: cujus rei praeclarum exstat in M. TULLIO CICERONE exemplar. » Erat eo tempore, inquit, (Brutus, cap. 91.) in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue collum, qui habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum magna contentio. Eoque magis hoc eos, quibus eram

---

(\*) Senem 69. aet. anno corpore giganteo, postquam omnia phthiiseos tuberculosae stadia decurrerat, ipsa confectum occidisse vidi.

carus, commovebat, quod omnia sine remissione, sine varietate, vi summa vocis et totius corporis contentione dicebam. Itaque cum me et amici et medici hortarentur, ut caussas agere desisterem, quodvis potius periculum mihi adeundum, quam a sperata dicendi gloria discedendum putavi. Sed cum censerem, remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi, me et periculum vitare posse et temperatius dicere: ut consuetudinem dicendi mutarem, ea caussa mihi in Asiam proficiscendi fuit. Itaque cum essem biennium versatus in caussis et jam in foro celebratum meum nomen esset, Roma sum profectus. Recepi me biennio post, non modo exercitator, sed prope mutatus. Nam et contentio nimia vocis reciderat et quasi deferbuerat oratio lateribusque vires et corpori mediocris habitus accesserat."

Equitationem eodem fine commendaverat SYDENHAMUS, quod omnibus aliis remediis ei palmam praeripere dicitur. » Neque magis, inquit, hoc exercitii genus hypochondriacis prodest, quam tabidis phthisicisque, quorum nonnulli mihi sanguine juncti multum terrarum equo vectore peragrantes ex meo consilio, sanitati sunt restituti; cum certo sciam, me vel medicamentis quantivis pretii, aut alia methodo, quaecunque demum ea fuerit, nihil magis iisdem proficere potuisse, quam si multis verbis hortatus fueram, ut recte valerent. — Atque hoc multiplici experientia, quae vix me fe-

fellit unquam, didici: et licet equo vehi phthisicis praecipue conferat, tamen et itinera curru facta mirandos sanę effectus quandoque ediderunt." Dolendum utique non subjecisse diligenter perscriptas aegrotantium historias medicum praeclarum, ut quando profecerit, intelligeremus. Neque enim omnibus profuturum facile perspicitis, immo nonnullis mortem accelerasse animadvertit MORGAGNUS, haec subjungens, ut in caeteris morbis, ita in hoc quoque non omnia omnibus prodesse auxilia. Quod autem nunquam profecit, quis credet, qui candorem animi artisque peritiam in SYDENHAMO auctore et medico summas cognoverit. Profuit forsitan iis, qui ex abdomine magis, quam ex pulmone aegrotabant, sive tuberculis, sive neurosi, seu circulationis abdominalis perturbatione. Nam morbi historias, quod dolemus, SYDENHAMUS non addidit.

Uti equitationem (de qua Cf. STOLL, *Rad. Med.* I. pag. 210.) multis phthisicis utilem censeo, ita in loca calida ex terris frigidis migrationem quam plurimis saluberrimam fore arbitror et utilissima fere universis itinera maritima judico.

Haec tam veteres quam recentiores laudaverunt. » Si vera phthisis est, ita CELSUS lib. III. cap. 22. inter initia protinus occurrere necessarium est, neque facile enim hic morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, coeli mutatione sic, ut densius quam

id est, ex quo discedit aeger, petatur. Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus aetate firmissima oriatur, id est ab anno duodevigesimo usque ad annum quintum et trigesimum." Navigationem pariter commendarunt ARETAEUS, *De curat. diut. morb.* lib. I. cap. 8. et PLINIUS, *Hist. Nat.* Libr. XXVIII. cap. 4. et nuper praeter Anglos LAENNEC, qui ex omnibus remediis adversus phthisin adhibitis nullum esse efficacius contendit, quam coeli mutationem ac praecipue habitationem ad oras maritimas regionum temperatarum calidarum. » Sin navigationem aliqua res prohibet, lectica, inquit CELSUS, vel alio modo corpus movendum est: tum a negotiis abstinendum est omnibusque rebus, quae sollicitare animum possunt: somno indulgendum: cavendae destillationes (catarrhi) ne siquid cura levarit, exasperent; et ob id vitanda cruditas simulque et sol et frigus."

Ad haec praecepta Celsiana notetis velim, somno quidem indulgendum esse, ita ut mature cubitum eant aegrotantes, nec somnum tamen matutinum nimis protrahendum, ne matutinos sudores commoveant, in quos proclivia eorum corpora sunt. Quamobrem nec de plumis lectuli sint, nec stragulis multis corpus tegant. Etiam vitanda Venus est et matrimonia praematura et vini potio victusque ita regundus, ut validioris materiae cibis non vescantur. Praesertim autumnno primoque



vere cautos eos esse oportet. Hisce enim temporibus morbus fere succrescit. Alvus quoque si durior ut solet, oleribus, fructibus maturis, aut lenioribus eccoproticis sollicitanda et si in pulmones congestio fiat, aut sanguinem spuunt, parcis et repetitis sanguinis depletionibus, semicupiis, epispasticis rubefacientibus a pectore avocandus sanguis. Praeterea nocent mentis gravior exercitatio, studia invita, ut ajunt, Minerva, animique perturbatio, curae edaces, fabularum eroticarum, Romanensium lectio, magnarum urbium habitatio, telluris patriae desiderium. Quae ut nocent, ita prosunt contraria hisce, animi praecipue tranquillitas, securitas, alacritas, rusticatio, dulce familiarium et amicorum consortium, ut non magis corporis, quam animi regimine ejus curatio prophylactica contineatur.

Posset etiam moveri quaestio, utrum in phthisin proclivibus quaedam adhibenda sit curatio prophylactica, qua praecidatur ortus tuberculorum. Verum hoc si fieri posset, altera esset dirimenda controversia, quomodo oriantur et quam habeant genesin. Illud quidem effici hactenus nequit. Inflammationem esse, quae creet tubercula, multis visum est (et quidem Cl. BROUSSAIS, SCHROEDER VAN DER KOLK, ANDRAL, CRUVEILHIER) aliis vero proprium heteroplasiae sive nutritionis morbosae productum habetur tuberculum, ut scirrhus, ut fungus sunt. (Horum e numero sunt MECKEL, BAILLIE,

LAENNEC, LORINSER, GENDRIN, LOUIS). Quodsi ea hypothesis probanda sit, ex qua omnium facillime facta intelligantur, certe ultima illa majori veritatis specie sese commendat, quam prior. Nam sive ad sedem tuberculorum: in summo pulmone, a peripneumoniae sede diversam, sive ad habitum illum peculiarem phthisicum haereditate propagatum, sive ad morbi decursum proprium, sive ad eruptiones secundarias, seu denique ad curationis eventum animum advertamus, inflammationis notione minime comprehendi rem omnem, videbimus.

Præusquam erumpit phthisis, jam in pectore latent tubercula. Haemoptysis, bronchitis, laryngitis, catarrhi, tussis, vel indicia sunt tuberculorum spirandi organa irritantium indeque nati morbi vasculosi, vel morbi complicati symptomata. Haec compescere curatione antiphlogistica principes in arte viri et jure merito jubent. Parcae at repetitæ sanguinis detractiones, revellentia a pectore et derivantia, diaeta tenuis, stricta, rerum irritantium evitatio: en summam auxiliorum prophylacticorum! Et sane omni opera congestio et phlogosis a pulmonibus arcenda est. Quis tamen hac sola methodo sanari posse phthisin pulmonalem affirmaverit? Assentior quidem lubens STOLLIO, medico certe praeclaro dicenti, qui frequentes parvasque sanguinis missiones instituerunt, accuratorem phthiseos ex haemoptysi inflammatoria natae notionem habuisse videntur, ac ipsorum a

quibus damnabantur, adversarii. Venaesectiones morbo et viribus aegri respondentes, decocta herbarum et radicum emollientium, emulsa et victus mere vegetabilis in sananda phthisi purulenta insignium reliqui pulmonis inflammationi juncta omnibus aliis remediis palman praeripiunt. Vereor tamen, quamvis alios viderim hanc methodum adhibentes, quamvis ipse adhibuerim, cum medico quodam aequali gloriari pulmonum phlegmasias strenue debellando phthisin longe rarissimam fore, quaecunque fuerit hominum in eam proclivitas. O quam vellem, posse tam simplici modo morbum tollere, ex quo major pars hominum in ipso aetatis flore occidit! Quoties vidi vel repetitas sanguinis detractiones, aliaque remedia hujus census adhibita, morbo inde ne vel minimum mitescente! Idque non mihi soli evenisse, verum etiam magnis medicis: LAENNECCIO aliisque reperio. Quocirca vix a me impetrare possum, ut morbum hunc ineram ac simplicem pulmonum phlogosin habeam. Tunc praesertim salubris erit haec medendi ratio, quum vel phlogosis, vel congestio activa morbo se junxerit: quod ut in ea aetate, qua phthisis nasci solet eoque anni tempore crebro fieri comprehendimus, crebro etiam, in principio maxime, ea uti multum proderit. Nam quum subphlogistica in hisce corporibus irritabilibus esse solet diathesis: plethora scil. ad vasa et vires et sanguinis in cavum pectoris angustius congestio, parcae et re-

petitae adhibendae sunt venaesectiones, viribus et inflammationis gradui adcommodatae, topicae per hirudines sanguinis depletiones, purgationes antiphlogisticae leniores, fructus recentes, succi vegetabiles expressi: cucumerum, dauci, hederæ terrestris, arboreae. Quibus omnibus cordis et vasorum synergeia et renisus vitalis peregrino tuberculorum stimulo suscitatus in organo maxime vasculoso iustis finibus coërcetur et febriculae inflammatoriae motus hecticici sedantur.

Verum hisce non tollitur morbus: tantum protrahitur vita et mors retardatur.

Laudarunt alii cauteria et exutoria, veteribus jam adhibita. » Si vehementior noxa est, ita Celsus III. 22, ac neque febricula neque tussis quiescit tenuarique corpus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad maninam utramque; item sub imis ossibus scapularum quas ὠμοπλάτας Graeci vocant, sic ne sanescere sinas ulcera, nisi tussis finita fuerit, cui per se quoque medendum esse manifestum est."

Cauterio actuali alii deinceps potentiale anteposuerunt, alii illo quidem, sed leniori: moxa scilicet, uti sunt: alii sola vesicatoria perpetua, fonticulos, setacea, unguentum stibiatum adhibuere. Communi haec cuncta auxilia nituntur principio, faciendi scilicet metastasin versus loca tutiora, aut si mavelitis excitanda inflammatione et ulceratione vicaria an-

tagonistica, quod ut spe successus probabilis effici possit, requiritur, ut stimulus ille externus interno stimulo vincendo par sit atque ita morbus extus avocetur. Haec methodus duobus praesertim in casibus mihi videtur commendabilis. Alter est, ubi mucosa laryngea, trachealis, bronchialis aegrotet, propter sympathiam cum cute; alter est, ubi pleuroperipneumonia aut pleuritis in empyema transierit: quo utroque in casu ipse hujus methodi saluberrimos eventus expertus sum. Quibus posset subjungi tertius, ubi complicatio rheumatica fuerit. CL. SCHROEDER VAN DER KOLK observationem refert, qua usus moxae saluberrimus in phthisi probatur. LAENNECCIO non tam felici esse contigit. Is huic auxilio minus favet eoque utendum esse arbitratur, ubi aut suppressa fuerit ulceratio, aut cutis vitium: fortasse etiam in complicatione rheumatica, qualis fuisse videtur casus, quem notavit CL. SCHROEDER VAN DER KOLK.

Hisce affines sunt fonticuli et setacea, de quibus cum LAENNECCIO cogor fateri, ea in phthisi pulmonali mihi non multum profuisse: quamvis in laryngitide et catarrho chronico plurimum inde emolumenti viderim: in provecto morbo etiam nocere tum irritatione, tum ulceratione, quam faciunt.

LAENNEC duo posuerat consilia medendi: alterum praepediendi eruptionem secundariam tuberculorum, alterum promovendi emollitionem, evacuationem aut absorptionem eorum, quae existunt. Ad

prius exsequendum laudantur parcae at repetitae sanguinis depletiones, universales, topicae, regimen antiphlogisticum, cauteria et exutoria: de quibus remediis diximus. Ad alteram salina, expectorantia, balsamica, aëris peculiaris inspiratio, suffitus, habitatio in stabulis, navigatio, loci mutatio, migratio in regiones salubriores, calidiores, mitiores ex coelo frigido, humido, mutabili. Ex quibus auxiliis migrationem in terras salubres, calidiores, maritimas et navigationem optimum censet LAENNEC (pag. 187 sq. l. l.) tantique faciunt Angliae medici, ut quotannis magnum numerum phthisicorum in Galliam mittant meridiorem, aut Italiam: quod certe si mature, id est ab ipso morbi principio posset adhiberi, longe pluribus proficuum foret, quam nunc deprehenditur (\*). De locis autem ipsis non convenit inter medicos; Aegyptum aliis anteponebant veteres. A recentioribus alio tempore alia loca prae aliis seligebantur, ut mos ferebat. Nec tamen quaecvis quibusvis idonea reputanda sunt, neque omnibus eadem placuerunt. Idcirco dolemus, non satis perquisivisse singula medicos deque iis praecepisse. Hodie insulam Maderensem et urbem Romam plurimum celebrant. In FINKII Geographia medica urbs Italiae Nizza laudatur, Tom. I.

---

(\*) De omni hac methodo Cf. J. CLARK, *The influence of climate in the prevention and cure of chronic diseases. Sec. Edit.* Lond. 1830, inprimis pag. 301 sqq.

pag. 63. ( de Montepessulano, quam non laudat Cf. Tom. II, pag. 42 sq. de Madera insula e Canariensibus Tom. I, pag. 265 sq. )

Neque tamen omnibus convenit e longinquis terris salutem petere multumque incerti hoc etiam remedium habet, si cogitemus varios casus rerumque discrimina, quibus peregrinatores objiciuntur. Eapropter de aliis quoque auxiliis cogitaverunt. Talia sunt inspiratio aëris medicati, habitatio in stabulis: quae tamen partim multa incommoda habent, partim adeo incerta sunt, ut vix commendari mereantur. Halitus balsamicos et suffitus, suffimigia balsamica similiaque non tantum inutilia, aut non proficua, verum manifesto nociva in phthisi pulmonali judicamus. Et sane quid juvabit pulmones, tuberculorum stimulo irritatos, novo stimulo irritare. Prodesse forsitan possent in blennorrhoea pulmonum aut catarrho chronico, in tussi et haemoptysi scorbutica, cui pilulas picis et aquam piceam feliciter opposui, verum in phthisi pulmonali tuberculosa prodesse nunquam poterunt.

In phthisi abundamus remediis vel inutilibus, vel manifesto nocivis: quare magis adhuc, quam in ullo alio morbo ea lustrare oportet. Etenim in sylvæ medica plura prostant medicamina, quae medicorum spem fallunt, multis quamvis multorum encomiis celebrata. Quod partim inde repeto, quod singulos casus non rite distinguunt, qui commendant, partim quod multi ad scribendum ani-

mum adpellunt, priusquam artis habeant usum; partim quod vulgus medicorum medicamina praescribit more magis et imitandi studio, quam consilio et ratione ductum.

Ita video, lac, praesertim lac asinum phthisicis omnibus fere commendatum, quamvis vix ullum viderim phthisicum, qui hoc alimento aliquamdiu vesceretur, quin ab eo abstinendum esset. Certe si posset lac sugere phthisicus recens ex uberibus nutricis sanae, aura vitali et calore praeditum, nullus dubito, quin prodesset. Quo autem utuntur, humor est vita orbatus, difficilis concoctionis, praesertim si ut fit alio simul ciborum genere vescantur, aut labes tuberculosa jam ad abdomen et intestina pertinuerit; nam qui lacte utuntur tenelli, utuntur calido, vitali neque ullo alio utuntur alimento. Quandoquidem nutricem adhibere non semper decet, praestaret lacte uti asinae sanae, bonis, nec opimis tamen pascuis nutritae eoque recens mulso, calente, jam solo, jam cum aqua salubri, aut in nostra patria, in qua optima haberi nequit, cum aqua Selterana temperato, nec nimis provento morbo, ita ut praeter hoc vix alio ciborum genere vescerentur, neque ulterius protraheretur haec diaeta, quae dicitur lactea, quam aegrotanti homini placeret, isque et bene adpeteret et bene ferret et bene coqueret.

Quo tempore fructus maturos tellus profert, hisce uti proderit, praesertim juvenibus, sanguineis, ir-



ritabilibus, habitu corporis florido, haemoptoico, quibus etiam succus cucumerum et dauci similiaque temperantia, *refrigerantia* vocant, conveniunt, phlegmaticis, senioribus, lymphaticis nocitura: quibus nutriens magis victus, validioris materiae, cibus e carnibus teneris eorumque juribus et oleribus, potus ex cerevisia tenui, aut ex vino dulci cum aqua conferet. Nihil magis nocet, quam omnes indiscriminatim phthisicos *farinaceis* implere, quae multi nec amant, nec ferunt, iisque tantum idonea sunt, quorum cum mobili genere vasorum ventriculus et intestina integra sunt. Caeterum aër rusticanus urbano, maritimus rusticano praestat: saluberrimus temperatus, calidior, nec mutabilis, nec tenuis, montosus, cauteque intermissionis tempore, quod in hyemem et aestatem incidit, corpus alendum est: hyeme plenius, aestate parcius atque omnis diaetetica haec curationis pars aegrotanti non minus, quam morbo, quo tenetur, adcommodari debet.

Quae antiphthisica adpellatur medicina, ea tum antiphlogistica est, tum nutriens: ut si medicina ex PLATONIS sententia subtractione et additione constet, in hoc morbo utraque simul tum ea quae demat de corpore, tum ea quae corpori addat, uti videatur. Antiphlogistica curationis parte renisum vasorum, symptomata inflammatoria activa, haemoptysin, febrim vasculosam debellare conantur: altera nutriente maciem corrigere et cor-

poris tabem. Quodsi morbus inflammatorius est, ut multis habetur, antiphlogistica curatio erit eadem therapeutica: sin minus et haec et altera jure adpellabitur symptomata, necessaria sane et utilis suo loco et tempore, minime tamen morbo vincendo apta.

Quaeritur, utrum quaedam sive methodus, seu medicina possit inveniri non tantum quae eruptionem secundariam tuberculorum praepediat, verum quae praepediat eruptionem primariam omnemque tuberculorum in pulmonibus genesin. Qua de re cogitanti saepenumero mihi visum est, ex scrofulosi non penitus sanata praesertim tuberculisationem pulmonalem esse repetendam. Habitus enim ille haemoptoicus et phthisicus, idem ille est ac scrofulae propriae, quae dicitur, impedita scil. corporis ex statu infantili in puerilem et juvenilem metamorphosis, qua organa chylopoietica et lymphatica praecellunt organis vitalibus et generi vasorum, abdomen pectori, systema nerveum systemati ossium et musculorum. Haec evolutio, metamorphosis, incrementum totius vitae institutione: gymnastice praesertim et victu animali ac salubri vitae genere in aprico promovenda, neque cerebro instituendo, evolvendo impendendum tempus est, quod pectori maxime et musculis instituendis debetur. Scilicet uti prima aetate abdomen pectori praevallet, sic altera pectus et vasa et musculi robur acquirunt. Abdomini et cerebro curandis tantum tem-

poris impenditur, ut nihil pectori supersit. Igitur assiduo motu in aprico exerceant corpora sua pueri puellaeque, nec farinaceo aut vegetabili, sed animali praecipue victu ad corporis vires et laborem adcommodato alantur: curetur diaeta et medicina morbus ille scrofulosus, inprimis vero diaeta, nec dubito, quin numerus phthisicorum in dies decrescat. Sin vero nec victu, nec medicina scrofulosis sanetur penitus, pubertatis tempore in morbum pulmonum ex morbo abdominis incidunt vitiisque sede tantum mutato, phthisis sequitur, eo crebrior hac aetate, quia nec variolis habitus totus commutatur, nec debitum corpori vitae genere, victu, labore, motu ingeneratur robur.

Quaeritur porro, utrum ex fonte therapeutico etiam remedia peti possint, quae tuberculorum genesin impedian. Haec si quae sint, ex eo erunt genere, quae *antiplastica* dicuntur, id est processui plastico adversa atque absorbtionem motumque decompositionis adjuvantia, quemadmodum e regno minerali: mercurius, stibium, baryta, murias ammoniae, potassa, ex regno vegetabili: cicuta, aqua laurocerasi, jodium.

Horum nullum magis efficax est, quam quod primo loco posuimus: *mercurius* ejusque cum sulphure aurato antimonii connubium, quale exstat in pulvere Plummeri, ex aequalibus utriusque partibus facto cumque saccharo mixto, cui saepenumero utiliter additur cicuta, ita ut horum cujusque gra-

num dimidium, vel integrum bis de die praebeatur. Hisce pulveribus diu utantur et abstineant interim ab acidis quibusvis caveantque auram frigidam, ne cutis perspiratio cohibeatur. Istud remedium, ex omnibus antiscrofulosis praestantissimum, quemadmodum strumas solvit, incitando absorptionem lymphaticorum, quin profuturum sit plurimum, nequaquam dubito, dummodo diu et prudenter adhibeatur et simul fonticulo cutis sustineatur ulceratio. Suppar fere remedium in muriate ammoniac, sive sale ammoniaco habetur ad coërcendam vitam plasticam luxuriantem, tum quoque adhibendum, quum congestio pulmonum et diathesis haemoptoica usum mercurii minus tutum faciant. Ingratus sapor quia multos offendit, pilularum forma cum aequali parte extr. glyzyrrh. glabrae recte propinabitur. Sicque larga dosi, ad drachmam dimidiam, quovis die per menses integros tuto adhiberi posse, didici. Quando haemoptysis et congestionis pulmonalis activae indicia sunt, sive digitalis cum hoc remedio utiliter copulatur, sive haec sola datur, adhibitis etiam sanguinis depletionibus et revellentibus derivantibusque remediis et hirudinibus ad femora, aut anum admotis, quando amenorrhoea aut fluxus haemorrhoidum steterit; in priori casu etiam venae-sectio in pede, in utroque rubefacientia, epispastica, pediluvia juvabunt. Digitalis purpurea quemadmodum absorptionem incitat, sic cohibet circu-

lationem. Praestat tamen ejus usum subinde intermittere quoniam diu postquam datum est, et cerebrum et cor et ventriculum male afficere visa est cumque eo tanquam veneno caute admodum est mercandum. Post pulveris recentis pauca grana plures septimanas continuas signa capitis et oculorum irritatorum observavi in puella haemoptoica, depletionibus tantum topicis et regimine stricto antiphlogistico compescenda. Pulmonis quidem tabem arcere nobis contigit, superstite tamen diathesi haereditaria. Nitrum eapropter minus bene ferunt, quia tussim movet; etiamsi reliquis dotibus commendandum sit: magisque etiam ventriculo et intestinis obest, quam quod diu adhibitum ferant phthisici.

Uti in tuberculis crudis i. e. duris necdum emollitis Plummeri formula et sal ammoniacum, ita cicuta virosa (*conium maculatum*) etiam jure merito celebratur, sive cum aliis junctum: cum mercurio, antimonio, aut sapone, sive solum, forma pilularum. Quodsi urgeant symptomata spastica et nervorum erethismus et tussis et anxietas, utiliter cicutae extractum solvitur aqua laurocerasi, dum phlegmaticae corporis temperiei magis, murias barytae convenire videtur, quod auxilium non omnibus tutum, arctioribus quam reliqua limitibus circumscribitur.

Haec tuberculis crudis sive nascentibus; seu natis opponenda remedia; emollitis, tussis lenienda

demulcentibus, pectoralibus, mucilagineis: g. arab. rad. saleb., pulv. gummoso, quorum solutioni recte additur aqua laurocerasi; vires sustentandae alimento facilis solutionis, lacte, ovi vitellis, carniū jusculis, farinosis: decoct. albo similibusque. Alvi fluxus moderandus iisdem medicaminibus, praesertim sol. saleb.; similem demulcentem curationem aphthae postulant. Sudores compescere et hecticam febriculam mitigare dicuntur acida mineralia, claretum refrigerans, sacch. saturni. Hujus vis venenata prudentem requirit artificem, ne colicam moveat, aut obsit intestinis nervisque. Balsamica, tonica, adstringentia pauci sunt qui ferant iique fere, quorum pulmo et thorax minus, quam intestina et abdomen aegrotant.

In tuberculis abdominalibus et febre mesenterica cort. peruv. lich. island. stip. dulcam. rad. polyg. am. phellandr. aq. semina utilia ac salubria expertus sum; in vera phthisi florida quam vocant. nunquam. Ab hisce igitur caveatis quaeso et teneatis, omnem phthisin ultimo morbi tempore esse contagiosam.

Habetis meam de phthisi pulmonali ejusque curatione sententiam, in quam cum alios perlegendo, tum ipse observando veni. Hac ita utamini, ut vestra etiam industria vestroque studio in hoc tanto malo et melius cognoscendo et felicius curando proficiam.

## DE URINAE VITIIS UNIVERSE.

Urinae vitia, quatenus ex partium ipsam secermentium, excernentium morbis creantur, multum obscuritatis habent, etsi nuper virorum doctorum industria in iis perquirendis magnum laborem collocavit. Nos priscum morem secuti observationes consulemus, initio facto a Morgagnianis, quae Epistolis ejus tribus 40, 41 et 42. maxime continentur. In harum pluribus accusandum vitium calculosum, in aliis morbus vesicae, aut prostatae, aut renum, aut ureterum, aut intestinorum (ileus) aut mechanica impedimenta, ex corporibus peregrinis in urethram illapsis, aut intrusis, aut urethrae ipsius ex blennorrhagiis superstes angustia, quae partim ad vesicae renumque calculum, partim ad morbos mucosos, partim ad luem veneream spectant. Quocirca de his verbulo eritis admonendi, postquam utrumque morbum magis habueritis cognitum, ne nimis divagetur oratio remque per se obscuram ordinis vitium reddat obscuriorem.



## DE CALCULO RENUM ET VESICAE.

Ferre nullus est corporis locus, ubi interdum non reperta sunt concrementa dura, calculosa. Nam in glandula pineali, ad dentes, sub lingua, in organis salivalibus, in pulmonibus, corde, ductu thoracico, intestinis, visceribus abdominalibus, mesenterio, glandula prostata, ad articulos, in cute calculosa fuisse corpora, medicorum testantur observationes. Cff. K. SPRENGEL, *Pathol.* III. pag. 170 sqq. et RICHTERUS, *Spec. Therap.* IV. pag. 484 sqq. Nullibi tamen crebrius, quam in renibus et vesica, in quibus renum et vesicae calculum creant: id quod facile intelliget, quicumque cogitaverit, his partibus secerni continerique urinas, omnium humorum corporis nostri maximam habentes particularum terrestrium, salinarum copiam, unde levi negotio concrementa ista calculosa formari possunt. Horum calculorum renalium, vesicalium ingens est, nec facile definienda diversitas, sive magnitudinem, formam, colorem spectes, seu pondus, duritiem, structuram. Nam alii sunt aequales, glabri: alii asperi, rudes; alii albi, alii brunci, variegati; referunt alii parvitate arenam, alii omnem renum pelvim aut vesicae caveam replent; alii leves sunt, fragiles, alii ponderosi, durissimi et structuram quod spectat aut compositio-



nem chemicam, eorum duodecim, ab aliis quindécim jam enumeratae sunt species, adeo ut in his quoque summa cernatur naturae varietas.

Bene tamen nobiscum actum est, quod in tanta varietate non desideremus naturae simplicitatem quodque ut in aliis rebus perspicuitatem pepererit scientia.

Nimirum quamvis varia sit calculorum compositio, tamen eorum cum viro doct. PROUT placet quatuor genera summa distinguere et quatuor unde existunt diatheses: uricam, oxalicam, cysticam, phosphaticam, prouti ex acido urico ejusque compositis, oxalate calcis, oxydo cystico et phosphatibus constent: quorum duo priora ad renes, posteriora ad vesicam referunt: altera in renibus, altera in vesica creari existimantur: phosphata vero rarius calculum integrum formare, verum ad nucleum aliorum sive calculorum, sive corporum in vesicam illapsorum deponi: ut diathesis phosphatica secundaria potissimum esse eamque praecedere diathesis urica, aut oxalica videatur. Scilicet calculi plerumque in renibus primum creati per ureteres in vesicam descendunt ibique strato phosphatico induuntur.

Eorum species si velitis cognoscere, inspicite tabulas pictas additasque libro ALEXANDRI MARCET, qui inscribitur *an Essay on the chemical History and medical Treatment of calculous Disorders, Second Edit.* Lond. 1819.

Chemicum Suecum SCHEELE primum fuisse se-

runt, qui calculos ex acido urico sive lithico componi detexit. Sic prima posuit doctrinae de calculis hisce fundamenta. Perperam tamen opinatus est, ex hoc solo principio omnia creari concrementa urinae, quorum vix dimidiam partem constituunt. Post hunc in Gallia VAUCQUELYN et FOURCROY, in Anglia WOLLASTON horum historiam naturalem compleverunt: et hic quidem detectis quatuor novis speciebus calculorum urinariorum: quamvis de eo ne mentionem quidem fecerit FOURCROY, cujus scripta post inventa Wollastoniana prodire quemque ea propter nisi plagiatus, saltem laesae honestatis atque candoris nomine accusat MARCET. Is principia in calculis urinariis ab hisce philosophis chemicis detecta notat haecce: acidum uricum, phosphas calcis, phosphas ammoniaco-magnesiae, oxalas calcis, oxydum cysticum, quibus addendam esse monet materiam animalem copia varia nectentem ac conglutinantem quasi reliqua: eorum vero species sub hisce titulis recenset I. calculum lithicum (s. uricum) II. calculum ex phosphate calcis, III. calculum ex phosphato ammoniaco-magnesiae. IV. calculum fusibilem ex duobus antecedentibus factum V. calculum cysticum: ex oxydo cystico VII. calculum compositum stratosum VIII. calculum compositum mixtum IX. calculum glandulae prostatae. Calculus ex acido urico, quem repraesentat Tabula MARCETI VI. fig. 1, 2, 3 et 4. solubilis aliquatenus aqua calida, prorsus vero alcalibus est, quibus etiam solvuntur

calculi ex urate ammoniacae. Calculi phosphatici ex phosphate calcis, albi, grisei, aut pallide fusci, quorum minus vulgari exemplo speciem simplicem a WOLLASTONO descriptam repraesentat fig. 7. Tab. VIII. MARCET, solvuntur acid. muriatico ac nitrico. Calculus triplex ex phosph. ammoniaco-magnesiæ Tab. VII. fig. 5. cernitur; is plerisque acidis decomponitur: vulgo autem aliorum calculorum partem efficit; vix aut nunquam solus existit. Calculi fusibilis, post uricum maxime omnium vulgaris, speciem adumbrat fig. 1. Tab. VII. MARCET. Componitur ex duobus praecedentibus, sive ex phosphate triplici et phosphate calcis. Calculus oxalicus delineatus fig. 4. Tab. VII. nec semper obscuri coloris (qui a sanguine forsitan inmixto auctore MARCET uti docet hujus Tab. VIII. fig. 6,) vix cognitus, aut solvendus reagentibus, quibus reliqui; nec semper ejusdem formae, uti nec ejusdem coloris. Calculus de oxydo cystico, a WOLLASTONO detectus ac descriptus, depingitur Tab. VIII. fig. 1 et 2. ibid. facileque solvitur tum acidis, tum alcalibus (\*). Calculi denique mixti varias habent pro varia structura dotes. Delineantur Tab. VI. fig. 4. Tab. VII. fig. 3 et 5. ibid. (\*).

---

(\*) Tres hujus calculi casus ab ALEXANDRO MARCET scripto mandatos reperio, in quibus cunctis calculi in renibus reperti sunt: cavete igitur, ne nomen vos fallat, vesicales duntaxat credentes, qui renales sunt.

(†) De duobus novis calculorum generibus xanthico et

Saepe numero color et superficies calculorum quendam dabit conjecturae de eorum chemica natura locum, ut bruneo-fusci, superficie laeves, subinde tamen tanquam granulis adpersi, ex acido lithico esse, albi aut albo-grisei facileque frangendi, ex phosphate terrestri, obscure colorati, aut nigri, duri, tuberculosi ex oxalate calcis, inaequales, crystallorum adinstar, punctisque splendentibus ex phosphate ammoniaco-magnesia videantur: quamvis MARCETUS, characteres illos notans, simul a colore non certum peti posse criterium nos adhortetur, quem a muco cruento aliisque pravis humoribus in vesica secretis ducere possunt: nec formam magis constantem esse alio loco doceat, calculorum moriformium exemplo, ab horum fructuum similitudine interdum et pallore et glabritie deflectentes. Quae cum ita sint, et serra dividere eos et reagentibus decomponere oportebit, nec nimis religiose servare. Quamobrem queritur jure suo, quem prius laudabam, MARCET ac dolet, tanquam thesauros recondi in Musaeis anatomicis inutiles. Vel sola horum calculorum sectio, ut multi mixti sunt, sic tam ortum, quam compositionem et variorum principiorum adpositionem demonstrabit, id quod citatae vos docebunt MARCETI tabulae.

---

fibroso ei dictis Cf. MARCET lib. I. Cap. IV. pag. 103 sqq. nec non A. COOPER, lib. I. pag. 369 sq. hic ex fibrina sanguinis esse videtur.

De ipsorum analysi nonnulla etiam adnotavit recentiorum chemicorum laboribus amplificanda. Denique computavit longe plurimos calculos esse ex acido urico, ex phosphatibus et moriformes, eo quidem ordine, quo enumeravimus.

Creantur calculi illi ex urina sana aut morbosa, ad nucleum tanquam centrum lithogeneos. Ejusmodi nucleus calculi futuri fieri potest mucus, pituita, sanguinis coagulum, corpora peregrina: acus, spicae, ipsa quoque urinae praecipitata, verbo quidquid renibus, aut vesica continetur heterogeneum; quorum quidem multa exempla proferunt, praeter MORGAGNUM, nostrates DENYS, VAN SWIETEN alique recentiores rei medicae scriptores. Ad talem nucleum adponuntur continuo particulae, formantur strata ut plurimum, quorum extima in calculis vesicae solent esse phosphatica. Hanc lithogenesisin, me iudice, bene periteque illustravit nostras pariter PETRUS CAMPERUS et contra magnum ALBINUM defendit nunquam ex minoribus calculis majores fieri, sed quemvis calculum habere nucleum tantummodo unicum, qui orbibus adpositis increscit atque interdum figura mutatur ex aspero levis factus, aequalis, glaber, unde irritatio minor, quae tamen non semper ex aspero calculo est. Universe autem versus nucleum esse solet durissimus calculus magisque fragilis versus peripheriam, ex strato forsitan phosphatico superaddito. Verum operae pretium est

referre CAMPERI de ea cogitationes. Is cum legerat ALBINUM scribentem calculi nucleum ex congerie parvulorum calculorum in unum conjunctorum, et coagmentatorum constare eandemque noverrat ALGHISI Itali opinionem, ipse vero parvos lapillos mingeret; terrore percussus imminentis morbi saevissimi, cujus nulla certa esse sciebat remedia, summo studio perquisivit quotquot nancisci potuit calculos eosque medios secuit viditque cunctos unum duntaxat nucleum habere sicque a metu suo liberatus est. Inde tamen nec opinato in novos conjectus est angores, calculo reperto, qui ex duobus calculis brunneis, alba materia tanquam conglutinatis, factus videbatur. Hoc exemplum, inquit, ne cuncta mea argumenta subverteret metuebam; donec calculus per longitudinem sectus nucleum monstrabat, parte media extenuatum, unde colli calculique bipartiti species nata est.

Ad calculos disponunt aetas prima, aut ultima, sexus virilis, rheumatismus, arthritis, praesertim accedente humido frigido, victu animali, abusu vini, decubitu in lumbis, laesionibus et morbis ossium. Nempe tam puerorum morbus, quam senum est, virorum magis, quam feminarum: frigidarum ac humidarum magis, quam calidarum regionum: nec raro haereditarium est ac gentilitium hoc malum. Verum haec omnia non satis explicant, cur numerus calculosorum ubivis terrarum hac hominum aetate longe minor sit, quam fuerat antea: quod vel

ex insigni numero lithotomorum, quorum in unica urbe Amstelodamensi plusquam viginti exeunte seculo 17. et ineunte sec. 18. extiterunt, nec non ex numero sectionum 1827. ab uno RAVIO, viro cl. factarum (quorum 1527. felici eventu) efficitur. Rem patriae nostrae ratione explanare conatus est Doct. SCHULTENS, qui haec, quae memoravi, retulit, in *Diss. de caussis imminutae in Republ. Batava morbi calculosi frequentiae*, quae prodiit in hac Academia A. 1802. a mutato vitae regimine repetens, a potionum tepidarum: infus. theae aliarum usu, a victu minus animali, nec salito, a spirituosis, diureticis praecipue, qualis juniperi spiritus est; cerevisiam vero culpa vacare ostendens. Quae profecto rei interpretatio magna sese veri specie commendat eoque magis, quo facilius ad alias etiam aliarum regionum incolas haec a mutato victu vitaeque genere aetiologia transferri potest, in quibus idem est a medicis artem facientibus observatum.

Calculus renum cognoscitur dolore lumborum ad regionem renalem obtuso, mictu cruento post motum corporis vehementiorem, materia arenosa saepius emissa, quibus subinde accedunt vomitus sympathicus, cruris stupor, testiculi retractio, atrophia. Nec tamen ubi haec symptomata desunt, continuo putabitis, nullum esse in renibus calculum. Pleni sunt libri medicorum observationum calculorum renalium repertorum, qui nullas sui ob-

tulerant notas. Unum citabo Jo. HEURNII, viri clarissimum, quem manu OTHONIS filii conscriptum typis vulgandum curavit Cl. ED. SANDIFORT (*Obs. Anat. Pathol.* I. cap. VI.) » Jo. HEURNIUS integra sanitate toto vitae tempore usus est, ad 56. usque aetatis annum: semel tantum in Italia paucissimis diebus febri conflictatus fuit, quam ilico larga venaesectio solvit. Colico dolore statim affligebatur, si calida siccaque copiosius assumeret, quare sibi a pipere, caepis, raphano et id genus eduleis studiose cavebat. Variolis non laboravit, ideoque perpetuo sibi metuens ab externo irritamento, non libenter hoc morbo detentos adibat. Anno autem aetatis suae 56, Christi 1598. Feb. 8. cum solemniori Rectorali convivio interesset ibique biberet mustum Rhenanum faeculentum, crudum et austerrimum (nam cum nunquam ulla indicia, aut praecursoria calculi percepisset, nec ullius visceris infirmitate affligeretur, non erat in delectu dapum, aut potus praepostere curiosus, sed communibus alimentis gaudebat) repente percepit sibi urinae reddendae facultatem inhibitam: domum igitur recedens plenariam percepit ischuriam, adeo ut ne urinae quidem guttam excernere posset, nisi tandem post longa molimina enematum, pharmacorum et fomentorum. Urinam postea quidem reddidit, sed non nisi cum cruciatu et guttatim pag. 28 sqq. Nam Rhenani musti substantiae tenuitas et austerrae qualitatis abstergens violentia calculos, qui hactenus in renum



latebris quiete resederant, omnes simul commovit et uno agmine cum flumine descendens urinae in vesicae cloacam protrusit: ubi tum ob vesicae sphincterem, ab eadem acerba et adstringente qualitate constrictum, tum septem calculorum aequalis magnitudinis concursu ad vesicae cervicem perenne tormentum dysuriae et stranguriae passus est. Donec paulatim hac tormenti immanitate attritus anno aetatis 58. Christ. 1602. de nocte diei 29 Maji, incidit in symptomaticam lethalem febrem quotidianam, cum tertiana conjunctam, quae in tertianam puram abiit, subinde quidem minus violenta fuit, mox vero acrius insurrexit, fomite mali perpetuo superstitae ac tandem in hecticam degeneravit, sicut lenta hac dolorum carnificina emaciatus placide et tranquille in Christo obierit Aug. 11, qui erat Saturni mane paulo ante sextae mediam eodem fere, quo natus momento. Post mortem in ejus vesica septem reperti sunt calculi forma et magnitudine nucis juglandis majoris, coloris cineritii, omnes aequalis magnitudinis et ponderis; nam quilibet pendit drachmas duas grana duo et semigranum, ita ut septem quatuordecim drachmas expleant et grana septemdecim cum dimidio." Ne tantum antiquiorum auctorum testimonia proferam, inspicite quaeso, si liber ad manus sit, Tab. I. ALEX. MARCET, renis calculorum copia turgentis et notate, aegrum periisse ex hydrothorace, neque ullum ostendisse signum, quod

morbi officinae urinarum vel levem suspicionem, movere potuisset: simul vero mementote, similia his renum esse inflammatorum symptomata, rem bene animadvertente eodem artis professore peritissimo.

Quodsi descendant calculi per ureteres, dolores movere atrocissimos colicis persimiles, dysuriam atque ischuriam, medici animadverterunt: neque his etiam nimium fidendum est signis, cum aliquando calculus emittatur, sine ullo doloris aut molestiae atque incommodi sensu. Vulgo tamen doloris est acuti, punctorii perceptio, haemorrhagia, aut muci spissi, puriformis, cruenti excretio, hisce humoribus ad fundum vasis, quo urinae excipiuntur, cadentibus atque haerentibus.

Vesicae calculum indicant: pruritus ad caput penis (unde manustupratio ac penis hypertrophia) stranguria, tenesmus, dolor in reddenda urina ante et post ipsius emissionem, urina parca, alba, sedimento mucoso, crasso, multo, graveolente: digitus per anum inmissus, catheter in corpus durum impingens. Haec signa quam infida sint, pridem jam docuerat peritissimus inter nostrates Chirurgus, Scilicet ab aliis esse posse partium ibi sitarum: prostatae, vesicae vitiis ipsumque catheterem subinde attingere calculum non posse in vesicae plica, sacco, aut cystide inclusum, immo vesica indurata calculorum habere notas absque calculo. Rem vobis ostendere poterit sequens exemplum

relatum a celeberrimi RAVII discipulo JACOBO DENYS:  
civitatis Leidensis ordinario chirurgo. » Vigena-  
rius quidam ante aliquot annos alio ex oppido me  
conveniebat, ut sectione calculo liberaretur. Inve-  
ni explorans tot calculi signa, qualia unquam, imo  
perinaeum non tantum extuberabat, sed premens  
illud distincte sentiebam calculum, ipse etiam cl.  
OOSTERDYK SCHACHT ope instrumenti magnum du-  
rumque sensit in vesica calculum. Calculosus hic  
eodem tempore molestiis itineris, descensu calcu-  
li, doloreque adeo debilis erat, ut operationem  
aliquot dies differre, donec convalesceret parum  
consultum duceremus. Tempus constitutum cum  
adesset et spectatores convenissent, mihi, dum  
mensae imponerem, dicebat: hoc die me secundo  
calculo non liberabis, calculus enim iter facit,  
quorsum saepius ambulat. Credebam ipsum, dum  
momentum urgeret, expavescere, ut saepius eo  
tempore miseri solent. Catheterem itaque in vesi-  
cam in misi, huc illuc movi. Clarissimus etiam Oos-  
TERDYK SCHACHT tentando indagabat, sed calculi  
ne speciem quidem inveniebamus. Mirabamur, prae-  
cipue quia antea tam distincte intus et extus cal-  
culum senseramus. Jussi ut mensa resurgeret et  
cum cathetere per aedes ambularet, ut experire-  
mur, num calculus iterum descenderet, sed omnes  
motus erant irriti, adeo ut spectatores abire de-  
buerint egoque ipsum non secuerim; quum li-  
thotomiam, nisi sentiamus calculum et nunquam

conjecturis confisi instituere non soleamus. Calculus narrabat, se vespera praecedente, calculum ad posteriora juxta intestinum delabentem sensitisse, ut saepius acciderat, illumque ibidem loci quandoque hebdomadas binas tresve commorari, quo tempore parum incommodi patiebatur. Audeo itaque adserere, nullum ibidem loci calculum fuisse, quando catheter in vesica erat; unde concludo, alibi saccum vel cavitatem in vesica fuisse, in quam secedens calculus sese potuerat abscondere. Aliquot adhuc hebdomadas miser hic Leidae commorabatur, ut redeunte calculo sectione liberaretur, sed quum hoc non accideret, decessit, neque unquam audiui, quid de illo factum fuerit."

Ex hisce omnibus liquet, quanta opus sit prudentia in horum etiam diagnosi in eamque cadere imprimis Gaubianum illud: » quo quis diutius in arte cum cura elaboraverit, eo circumspectius de morborum natura pronuntiare solet."

Minus fausta universe hujus morbi praesensio, praesertim in adultis recte habetur. Est enim morbus magnas habens diuturnasque miseras, qui raro praeterquam in pueris ipsa aetate tolletur, cujusque praesertim diathesis calculosa si praesto sit, ne ipsa quidem extractio calculi constans levamen promittit. Optimi calculi parvi, propter expulsionem faciliorem. Arthritis morbum minuit, emendat, levat; periculum auget complicatio morbi verminosi,

dentitionis, passionis hypochondriacae, hystericæ. Raræ prostant observationes calculi renalis, vesicalis, per abscessum expulsi: unde tamen ulcus fistulosum superesse solet. Denique nulla habet ars medica certa indubique ad calculos solvendo auxilia. Quæ cum ita sint, ecquis vestrum mirabitur, infaustam a medicis dici haberique hujus morbi præsensioem.

Curatio sive palliativa est, sive therapeutica. Illa symptomata mitigat, habitum relaxat, dolores lenit ac præsertim sub paroxysmo nephritico ac colica sæviante, indicatur. Haec calculum solvit, expellit, extrahit, novam lithiasin præcavet. Illa perficitur diaeta tenui, potu aqueo, mucilagineo, demulcente, fomentis, cataplasmatibus, clysteribus laxantibus, oleosis, anodynis, opiatiss. Huc faciunt usus aquæ multæ, tepidæ, Selteranæ cum lacte, seri lactis, decoct. althææ, emuls. amygdal. sem. cannab. sat. solut. g. arab., similia. Alvo strictiori ol. ricini adhibere, balnea, fomenta, cataplasmata lumbis, perinaeo, pubi admove, clysteres oleosos, demulcentes, parca copia, repetitis vicibus injicere juvat, quibus, ubi magnus subsit spasmus, syr. diacod. papav. alb. ipsumque opium addere oportet. Si quando inflammatoria fuerit conditio, venaesectio, hirudines proderunt: sin gastrica, eccoproticis utendum est. Terebinthinam, laudante licet MACBRIDIO, non commendarem.

Therapeutica ad calculum auxilia sunt lithontri-

ptica, lithotritia, lithotomia, sive potius cystotomia. Nempe aut reagentibus chemicis decomponere calculum conatur ars medica, aut frangere ipsum, aut extrahere. Quae calculum decomponere ac solve-  
re creduntur, lithontriptica ad duo genera referunt ad alcalina nimirum et acida. De his a multis dubitatum est, quorum alii theoreticis, alii practi-  
cis usi sunt argumentis. Theoretica nunc mittentes, de practicis videamus. Primo autem de remediis ipsis exponamus. Ad alcalia pertinent: calx, potassa, soda, sapones, cujus loci est remedium, sive arcanum Johannaë Stephani, ex ovorum testis et sapone, magna copia, quo quidem remedio intestinorum frangitur tonus et habitus inducitur scorbuticus: rem exemplo monstrante HUXHAMO, de febb. cap. 5. Opp. Vol. II. pag. 54 sqq. Aquam calcis laudavit WHYTT, alique cum jure car-  
nium, alii cum lacte. *Hist. Morbi* vid. ap. HÆMIUM *Rat. Med.* I. pag. 137 sq. saponem et aq. calc. adhibuit THILENIUS. (RICHTER l. l.) Alkali causticum fixum, sive lixivium saponariorum, ex earnis vitulinae juscule exhibitum constituit arcanum Chittickianum, de quo, qui refert, MACBRI-  
NIUS, non omnes diuturniorem talis alcaliini caus-  
tici usum aut desiderare, aut ferre, adposuit. :  
Hisce longe mitior est aq. mephit. alcal. Fal-  
konneri: ex potassa acido carbonico perfecte sa-  
turata et aq. soluta (1 dr. — 11 ad aq. libram per diem). Laudarunt alii carbon. sodae, quod remedii

genus minus tamen efficax, ut videtur, quam carb. potassae. Alcalia adhibenda, si ex acido urico (quod crebro fit) aut urate ammoniae calculi sint: quod quomodo noscatur, indicavit RICHTER. IV. pag. 531. et PROUTUS. Hic, si urina abundet acido urico, calculum ex phosphatibus esse, sin multam materiam colorantem extractivam contineat, ex uratibus fore, conjicit. FOURCROY vero injicere jubet solutiones alcalinas, vel acidas dilutas in vesicam easque cum urinis expulsas explorare jubet.

Ex acidis praecipue laudantur: gas acidum carbonicum, quod multis encomiis celebravit PERCIVAL (Essays II. pag. 102 sqq.) et unde usus aquae mineralis Selteranae, Fachingensis, in calculo adeo praedicatus, (addito utiliter carb. potass.) Acid. muriat. gtt. x—xxx. aqua dilutum, dosin augendo, commendant FOURCROY, RICHTERUS, alij (IV, pag. 546.) Haec, ubi ex phosphatibus sunt calculi. Qui ex oxalate calcis sunt, acido nitrico diluto solvuntur.

Tum alcalia, tum acida in vesicam injiciuntur, si hoc loco calculus haereat; quorum illa tamen minus, quam haec vesicam offendunt; quod vero non ita obest, quia etiam maxime diluta calculum phosphaticum solvunt. De quibus injectionibus copiose disputavit RICHTERUS (pag. 530 sqq.). Saporem lenem habere voluit, nec ardorem, aut tenesmum vesicae provocare utque calculi compositio innotescat, urinam investigare, calculosque aut arc-

nulas ipsasque injectiones expulsas. Lithiasin haereditariam ut plurimum ex diathesi urica aut urate ammoniae esse: quamobrem ab alcalibus esse incipiendum, ejusdem auctoris conjectura est. Ubi injectiones fiant, simul interna ejusdem naturae praebeantur medicamina oportet, immo haec externis praemittantur ac semper post injectiones factas eluatur aqua tepida vesica.

Denique si universi corporis habitum spectes, alcalina, ubi pituitosa est corporis conditio, acida, ubi scorbutica, conveniunt. Quae praeter haec feruntur tum resolventia, quae vocant: mel, serum lactis, extracta amaricantia, terra foliata tartari: quorum prius PRINGLIO magni existamabatur: reliqua haemorrhoidariis salubria: tum liq. lithontripticus Looffi, ex muriate calc. aqua soluta, auctore RICHTERO, efficax auxilii genus: tum denique tonica adstringentia, inter quae primum locum occupant folia arbut. urvae ursi, praedicante HAENIO nostro *Rat. Med.* I. cap. 21, cap. 26. folia Persicorum minorum profecto virium sunt: balsamica denique minime innocentia, aut tuta mihi habentur. Chirurgica auxilia, nec ipsa tamen certa aut periculi expertia, lithotritiam hâcque magis universe exploratam cystotomiam, aut temerariam magis nephrotomiam, qui cognoscere cupiant, magnorum in ante virorum scripta consulant.

Nos antequam hunc locum mittamus, agite aliorum conquiramus de lithontripticis testimonia. Pri-



mum sit summi inter Italos Anatomici MASCAGNI suae ipsius curationis historiam narrantis. Ex aliquot retro annis, inquit, gravem patiebar lumborum dolorem atque subinde arenulas flavas cum urinis emittebam. Primo aqua minerali carbonica, deinde usus sum carb. potassae. Cum m. Septembr. a. 1799. vitam agere sedentariam cogerer, graves experiebar dolores nephriticos atque cum urina multa lapillos emingebam rubicundos, crystallinos, fundum petentes. In ventriculo percipiebam acorem abundantem, fructu saporem afficientem: in urinis acidum lithicum detegebam sicque cognita materiae arenosae natura, decrevi, adhibere carbon. potassae reique eventum exspectare. Primo die drachma circiter usus sum, dimidia parte mane, vespere altera: coenavi autem hora pomeriadana prima. Postridie duabus, die tertio tribus drachmis usus sum atque sic dies decem continuavi, ex vehiculo unciar. xx. aquae. Ante inceptam hanc curationem acido abundabant urinae et chartam caeruleam inmissam rubro colore tingebant. Brevi affici inde urinas animadverti, ut altero jam die minus mutaretur chartae inmissae color, tertioque nihil omnino: indicio acidi lithici jamjam saturati. Simul remittebant dolores renum, neque exibant arenulae. Tandem cessavit prorsus dolor urinae minus colorata principio abundabat alcalino. Deinceps ab usu remedii cum abstinerem, per plures menses a

morbo calculoso liberatus sum, qui quoties postea revertebatur, ejusdem remedii parem expertus sum fortunam. Nunc vero a biennio inde, quanquam alcali non adhibui, morbus tamen nullo indicio se manifestavit.

Haec profecto sanatio, tam perspicue a MASGAGNO tradita, medicinae in urinas mutandas efficacitatem testatur maximam. Similia testimonia citavit MARCET, (pag. 157 sqq.) nec mihi met ipsi defuit opportunitas experiundi salubritatem solut. carb. potass. in aq. faching. Verum ut haec minus dubia est, ita incertior longe actio acidorum, quam si exemplo probatam aveatis cognoscere, ea aegrotantis historiam ex Monographia ALEXANDRI MARCET petitam! » Vir honestus ex urbe Birmingham Londinum venit, consulendi medicos gratia, laborans ex vesica et urethra, quas partes habebat graviter irritatas, cum crebra mingendi necessitate et copiosa materiae albae, sabulosae excretionem, mixtae particulis lucentibus crystallinis, ad octo aut decem grana, quoties urinas emittebat. Praescriptum est a medicis acid. muriat. dosi gtt. 5. sufficienter diluti, ter quaterve de die: atque intra paucos dies symptomata declinabant urinaeque demittere coeperunt acid. lithicum, sub specie hypostaseos rubrae. Duos menses continuos eodem modo morbus curatus est, quo tempore nil calculosi excretum, praeterquam paucillum acidi lithici: jam plurimum emendata aegrotantis vale-

tudine, urinae ab omni esse sedimento calculoso liberae perrexerunt."

Hactenus ALEX. MARCET. Complevit autem eam historiam Chirurgorum hac aetate facile princeps ASTLEY COOPER. Etenim quin idem ille sit, cujus casus narratur in hujus Opere Chirurg. nuper edito Tom. I. pag. 370, nullus dubito. » Vir doct. BAILLIE (idem ille ipseque COOPERUS a MARCETO nominantur) et ego curabamus virum honestum ex urbe Birmingham, qui secernebat magnam copiam phosphatis triplicis, quae in urinis sub specie crystallorum alborum cernebatur: dedimus ei acid. muriat. atque cessavit secretio phosphatis triplicis, verum acid. uricum aequae copiose provenit: deinde alcalia data et phosphas triplex denovo conspicuum: tandem post plures demum menses diaetae et constitutionis ejus universalis curatione sanatus est."

Docet hic notabilis casus ex una lithiasi in alteram incidisse aegrum ac tum demum rite curatum esse, quum vitae genus mutaverat. Verum non possum, quin vobiscum communicem, quae eodem hoc loco a viro candido in hanc per lithontripica curandi methodum notata invenio.

Aegrotantem curandum habebam (sic ille) in Nosocomio, calculum in vesica gerentem, in quem facta sunt experimenta ad solvendum calculum menstruis chemicis, per injectiones etiam in vesicam factas. Aliquo abhinc tempore virum compel-

laus: heus, ajebam an amici mei medici calculum solverunt? Tum ille: neutiquam respondit omnesque injectiones praetermisi, uno opio excepto, unde multum levaminis percipio. Aegro mortuo repertus est in vesica calculus.

Verum, ita pergit COOPERUS, quamvis calculus in vesica solvi nequeat, hujus irritabilitas eo usque per alcalia minui potest, ut aeger morbo ferendo suppar fiat.

Archithalassus DOUGLAS ex calculo aeger atque exploratus portionem calculi dejecit, quem ad analysin misi amico meo MARCET, qui repperit de oxalate calcis hunc esse factum: quapropter acida praebui, sed incassum: inde sumsit carbonat. sod. dr.  $\beta$ . quater de die ex aqua. Post menses aliquot in consilium vocatis ducis Portlandiae cubiculum intranti EVERARDUS HOME mihi dixit: COOPERE quomodo solvisti calculum archihalassi DOUGLAS, cui respondi: equidem nunquam solvi calculum in vita. Verum, ita HOMIUS, praedicat aliquam, quam ei praescripsisti medicinam. Itaque peto aedes Archithalassi: qui vidisti me, inquit, aegrum, ad levissimum motum ineptum: ex quo autem sodam sunsi quo volo eo redeoque, immo saltarem, siquidem opus esset. Interim haerebat semper in vesica calculus, verum soda ejus sensum obtunderat, ut sine gravi incommodo morbum tolerare posset."

Duabus hisce aegrotantium historiis tertiam sub-

jungam HAENII nostri, circa usum foliorum uvae ursi, palliativum illum. » Hujus anni 19 Aprilis, XI. annorum puer deferebatur in Nosocomium. Parentes testabantur a quadriennio ab illinc elapso filium diu noctuque in urina reddenda immanibus torqueri doloribus; guttatim illam prodire; collectam vero tum mucosam esse, tum pallidam, tum foetidissimam. Quin et puerum binos calculos pisi minoris magnitudine quondam excrevisse.

Cathetere explorantes, calculum omnes manifesto percepimus, audivimus. Puerum in Nosocomio detinere volui, licet quovis momento acriter ejulans, ac pavementum furibundi instar, pedibus assiduo quatienq, molestus sane socius caeteris aegrotantibus esset. Bis de die media drachma pulveris uvae ursinae dabatur et paregoricum vespertinum. Juvamen intra quatrimum adeo magnum fuit, ut dolores vix ultra adessent, ut lotium diutius retineret, ut demum quibuscunque careret calculi symptomatibus.

Factum hinc ut elapso mensis spatio Nosocomii claustrum pertaesum, paternas repetiverit aedes. Ac primo quidem tempore bene habuit; sed Junio mense, sive regimine pravo, sive medicinae neglectu, sive quod evanesceret paululum prae consuetudine ejusdem efficacia, dolores caeteraque symptomata recruderunt. Horum certior factus, Nosocomio inferendum jussi. Suadent interea alij lithotomum consulerent. Quo ad operationem ne-

cessaria praeparante, rem interea eo direxi, ut operatio differretur, donec prius dosis remedii auctioris effectus explorassem. Ter die dedi mediam pulveris drachmam et quotiescunque sive die, sive nocte ferociores ingruerent dolores, liberale paregoricum. Decoctum hordei mellitum potui fuit. Profecto vix triduum elabitur, quin iterum omnes dolores exsulent urinamque commode, ut homo sanissimus, retineat, emingat. Nihilominus iterum calculi in vesica praesentiam catheter declaravit. Quindecim diebus elapsis repetiit domum, ubi sanissime vixit ad finem Augusti. Tunc negligens remedii suaeque sponte vivens in antiquas delabitur miserias. Suscepimus eum tertio et cum priore methodo minus quam olim levaretur, curavi per aliquot dies oleum lini in vesicam injici mane et sero. Unde demum egregie se habet, iniectione minime egens et pulveres solummodo sumens. — Urina ejus quae foetida, pallida ac tenaci muco referta ipsi solebat prodire, ante urvae ursinae usum, omni deinceps muco caruit."

Ea historia, cui reliquae persimiles, docemur, uvam ursi egregium esse in talibus affectibus palliativum, nequaquam vero morbo persanando idoneum.

Verum neque hoc neque alia efficaciora ei mereri poterunt, nisi victu vitaeque regimine consonantibus. Et victus quidem euchymus, eupeptus sit oportet, nec tamen nimium de cibo animali

paratus ideoque non azoto neque acidis neque vino abundans. Prius experimento in cane facto demonstravit MAGENDIE, qui cum solo vegetabili vesceretur cibo, urinam habuit acido urico et phosphorico omni carentem; tum observatione mercatoris, qui opibus abundans calculosus iisque rursus privatus a calculo liber vixit, quinquies et fortunarum et valetudinis vicissitudines passus: alterum in se ipse expertus est PETRUS CAMPERUS, quoties vino rubro. uteretur ex lithiasi aegrotans, vinum album cum potaret, mali molestiis atque incommodis carens (\*).

Num uti quatuor sunt genera calculorum, horum quique suis creantur causis? Equidem ita esse opinor. Verum desidero legitimum observationum numerum, unde certa haberi possit inductio, quemadmodum utrum calculis singulis singularum aegrotantium incolae hominumque aetates magis pateant, hactenus ignoramus pluraque alia historiae naturalis calculorum loca nondum satis sunt cognita.

An calculi phosphatici ex rhachitide, osteomalacia ossiumque laesionibus atque aetate puerili crebriores? Certe urinas in hac conditione corporis materia phosphatica abundare ejusque magnam vehere copiam, observatum est.

---

(\*) De omni hoc loco probabiliter disputavit GUALTHERUS REYNOUD SCHULTENS in Diss. sup. laud.

An calculi urici senum magis et arthriticorum eorumque, qui victu animali vinoque et vini spiritu abutuntur? An victus vitaeque genus tam gentium universe, quam hominum singulorum varia calculorum genera creant? Hujus loci est, quod circa incolas Majorcae insulae sibi a viro celeberrimo ORFILA relatum refert vir celeberr. MAGENDIE: quorum diaeta animalis, incitans, aromatica, vinosa, spirituosa cum sit, urinae acido lithico saturatae saepe calculos vehunt, ex quibus vehementes patiuntur nephralgias aliarumque partium ad urinarum officinam pertinentium dolores.

Eapropter ex victu praesertim vitaeque genere morbi calculosi origines repeterem in eoque corrigendo praecipuam ponerem curationis partem: aliam quae medicamentis fit, secundariam existimans priorisque auxiliatricem: quod ideo notandum, ne in medicamentis, ut fit, summam spem atque fiduciam nostram collocantes, alimenta perperam negligamus.

De lithotomia sive cystotomia potius deque nuper inventa lithotritia dicere nil attinet: eas enim ad chirurgiam oportet referre. Verum hoc non reticendum est, chirurgica isthaec auxilia non magis certam promittere sanationem, quam pharmaceutica, quandoquidem plena sunt chirurgorum scripta observationum calculi, post sectionem renovati et renum calculis refertorum; vesicae denique omnisque apparatus uropoietici aegrotantis:



quamobrem si extrahendus sit calculus, nec nimis diu differendam esse extractionem, nec praetermittenda interim et therapeutica et diaetetica morbi remedia existimo, ut potiatur medicus primario omnis curationis fine, qui perfecta morbi sanatione continetur.

Atque haec breviter de morbi hujus genere dicta sunt, qui ut rarior esse inter mortales coepit, ita vobis etiam ut nec crebro eum habeatis curandum, ex animi sententia opto.

Interim exstare exempla calculi naturae viribus expulsi, notari a vobis meretur: quorum unum, ex TULPIO est, hoc loco referam.

» Catharina Pannemaker agens annum octuagesimum nonum, ubi integrum triennium tulisset animose in vesica urinaria calculum ponderantem tres uncias cum duabus drachmis, enixa fuit tandem felicissime lapideum hunc foetum cum duobus conchyliis foris itidem lapidea crusta obductis. Ausa fortassis ipsa plus sponte, quam in tali aetate aggressus fuisset ne exercitatissimus quidem lithotomus.

Sed fuit virago, praeter aetatem vegela et tanta virium constantia, ut tulerit non tantum fortiter longum hoc calculi tormentum: sed sustinuerit etiam deinceps non minus animose molestam illam effluentis lotii incontinentiam, quae solet sequi vesicam tanto molimine distensam. Prodiens quotidie in publicum et frequentans non minus con-

ciones sacras, ac si nihil vitii fuisset perpressa. Ut cum stupore nobiscum vidit exercitatissimus nostrae reipublicae medicus Jacobus Barra quicum vetulae huic medicinam fecimus (lib. III. cap. 8.) Huic supparia subjicere mictus lapidosi exempla placet ejusdem auctoris (lib. II. cap. 47.) » Anus septuagenaria, defatigata aliquamdiu a febre ac dolore lumborum, minxit tandem, unico impetu, quasi relaxatis renum repagulis trecentos amplius calculos. Quem eundem numerum licuit quoque videre in uxore cujusdam praefecti societatis Indiae occidentalis: quae displosis utique tot tormentis vixit deinceps, expers omnis belli."

---

#### DE DIABETE.

» Cujus rei non est certa notitia, ejus opinio certum remedium reperire non potest." Ab his CELSI verbis, quae suae de Diabete mellito commentationi praeposuit vir doct. AUG. WILH. VON STOSCH, nostrum de hoc morbo sermonem auspicabimur. Sane in nullum medicinae practicae locum magis ea verba conveniunt, quam in hunc ipsum. Nam quot de eo scriptores consuletis, tot invenietis hypotheses totque iis hypothesis annexa remedia. Quocirca rem vobiscum perquirere fert animus, ut si certam ejus notitiam nobis

comparare non possumus, ab opinionum saltem et remedium incertorum fraude nos tutos praestemus.

Ex veterum scriptorum numero, qui diabetem depinxere, ARETAEUS est. » Is, mirus quidem affectus est diabetes, inquit, neque inter homines admodum frequens. Est autem carnis membrorumque in urinam colliquatio. Per assuetas autem vias, renes scilicet et vesicam, humor profluit. Neque enim cessant unquam mingere, sed veluti cum aperiuntur rivi, continua fit effusio. Morbus hic longo tempore naturaliter inhaeret longoque tempore procreatur. Sed ubi jam consummata sit ejus constitutio, homo non diu superest: nam cita colliquatio est et festina mors. Eodem hoc sensu ab aliis hydrops ad matulam dictus est.

Ex recentioribus de ipso auctoribus laudant WILLISIIUM, LISTERUM, MORTONUM, tum recentissimos ROLLO, VENABLES, VON STOSCH, quibus addere oportet Jo. PETR. FRANKIUM. Hactenus partim adstringentibus, partim opiatibus praesertim contra morbum pugnatum est: donec medicus Anglus Jo. ROLLO, strenuus chemiae pneumaticae vindex, tum victum animale, tum alcalia laudavit. Quam therapeiam, ut intelligatis, scire oportet, duplicem distingui diabetem: alterum spurium, alterum verum. In spurio magnum quidem esse urinarum profluvium, verum illud non multum alienatarum; in vero, sive potius mellito, urinas esse minus co-

pia, quam dotibus alienatas atque principium saccharinum habere, carere contra principio urico.

Rem jam indicaverat WILLISIUS his quidem verbis: » Quot autem plerique authores potum aut parum aut nihil immutatum reddi asserunt, a vero longissime distat: quoniam urina in omnibus (quos unquam me novisse contigit et credo ita in universis habere) tum a potu ingesto, tum a quovis humore in corpore nostro gigni solito, plurimum differens, quasi melle aut saccharo imbuta mire dulcescebat."

Quod indicaverat WILLISIUS, detexit recentiorum chemicorum industria: principium scilicet saccharinum, quemadmodum cum virorum doctorum NICOLAS et QUEUDEVILLE, tum aliorum analyses probarunt.

Haec cum humorum in naturam vegetabilem inclinationem ostendere viderentur, ea nata est praxis viri doct. ROLLO, qua per victum exquisite animale atque hepar sulphuris, praecipue sulphuretum ammoniae huic vitio conabatur mederi. Eam praxin cum ipse, tum alii post ipsum nonnullis curationum exemplis aut demonstrare, aut illustrare saltem studuerunt. Quae exempla magis mitigati, quam sanati morbi exempla sunt. Nam primo diu admodum in hoc genere medicinae erat perennandum, secundo vel tum etiam levissimus error diaetae morbum renovabat, tertio aegrotantes vix ulli sunt, qui in hoc victu perrexerunt, hisque nequa-

quam fuit innocens: siquidem plures a diabete liberati in scorbutum inciderunt.

Aegrorum hoc pacto curatorum agmen ducit militum dux MEREDITH, cujus curatio aliis medicis exemplo fuit, quod sibi imitandum proponerent. Is intra 24 horas circiter 24 libras urinae coloris substraminei, odoris non urinosi sed violacei, saporis perquam dulcis mingeat. Vehementer sitiebat: sedecim circiter libras potabat: lingua albida erat et humida, os mucosum, sputatio salivae subdulcis, adpetitus varius, interdum ingens et tempore alieno: cutis arida, pulsus debilis nec multum frequens, facies tumida: symptomata dyspepsiae atque arthritidis. Ex triginta sex unciiis urinae per evaporationem eductae sunt unciae tres et drachina una extracti saccharini. Huic morbo, quem ex ventriculi aegritudine et defectu adsimilationis repetit vir doctissimus, medendum esse censuit victu animali et sulphureto potassae, cui deinde sulphuretum ammoniae substitutum est. Jam tertio die dimidiam duntaxat urinarum copiam minxit et dimidiam pariter hausit potulenti copiam et post quindecim dies quatuor duntaxat libras urinae mingeat, non dulcis, verum rubrae, arenosae, sedimento lateritio. Aegrolantis diarium secuti observabitis, pedetentim urinarum et copiam et dotes ad naturae modum rediisse ac morbum post duos menses fuisse sanatum. Haec quidem epitome est hujus curationis percelebris. Nam nimis profecto

longa narratio est, quam quae omnis tradatur. Ab hac autem si discesseris, vix alterum huic simile invenies fortunatae artis exemplum.

: In altera historia praetoris militaris imperfecta fuit curatio, propter aegrum minus obsequentem pariterque in tertia: in quarta propter aegrum inopem: quinta sutoris propter aegri abitum manca et imperfecta: sexta militis propter aegri fraudem successu caruit. Reliquae curationes partim infelices fuerunt, partim dubiae: nec defuerunt exempla creatae diatheseos phlogisticae ex victu animali, uti aliorum observatio scorbuticam dyscrasiam ex eo natam testatur.

: Cernitis, deficere rerum testimonia, quibus ea praxis vim legis auctoritatemque jure sibi adroget.

: Igitur alia quaeramus certiora, neque ratiocinia nos morentur: nam ubi rerum testimonia adsunt, non opus est verbis.

: Eminent inter reliqua morbi auxilia *phosphas ferri*, quod proposuit ROBERTUS VENABLES, qui nuper de morbi curatione scripsit. Is casus profert octodecim numero. Prior casus parvulae est, cui remedium profuit quidem: tamen demum convaleuit pulveribus Doveri, amaris, ac balneis marinis adhibitis. Casus alter parvulae rhachiticae lethalis fuit. Casus tertius febrilis antiphlogistica methodo feliciter curatus est. In quarto varia medicamina adhibita: tonica, diaphoretica, cathartica, balnea, ut quibus salutem tribuas, nescias.

Casus quintus suppar variae methodi exemplar est et sextus et septimus et octavus, cui magis utilia antiscrofulosa simul praescripta et nonus, in quo cum phosphate ferri conjuncta rheum et columbo ac vespere datus pulvis Doveri et nonus pari composito tractatus genere medicinae. Hae infantum ac puerorum diabeticorum historiae. Sequuntur adultorum: rustici (casus 11.) cui salubrior e sarsapar. et amaricantibus medicina, militis (casus 12.) venaesectione miraculi adinstar sanati, nautae (casus 13.) cui profuit sane phosphas ferri, nec tamen solum; nec omnem morbum sustulisse legitur, naviarchae, cui etiam profuit, nec tamen, an ex eo convaluerit, an interierit, sciri potuit: mulieris (casus 15.) quae mortua est: hortulani. (casus 16.) cujus historia ultima parte deest. et curatio simul antiphlogistica, simul tonica fuit: mulieris maritatae (casus 17.) cui martiale ventriculus aegre ferre videbatur; alterius mulieris, cujus morbo medebatur phosphas zinci cum antispasmodicis.

Quae computantes testimonia, nullum esse quod phosphatis ferri virtutem medicatam certo atque perspicue demonstret, aut probet, tenebitis.

Vir doct. von Stosch suae commentationi tres tantummodo morbi historias addidit. Aegrum priorem mors subitanea sustulit; alteram, cui primo camphoram, deinde tonica praescripserant medici; pleuritis rheumatica interemit, priusquam sanationem tempus confirmaverat. Tertiam a diabete non

mellito liberaverunt inf. quass. c. rheo et laudan. liq. Syd. quamvis utrum reversus sit urinarum fluxus, quo tempore editus est liber, sciri non potuerit. Antiquiorum scriptorum observationes MORTONI, BURSERII, FRANKII consulens: a MORTONO dietam lacteam, conserv. ros. rubr. bol. Armen. G. Arab. G. Tragac etc. nec non aquas minerales chalybeatas reperio adhibitas et tribus aegrotantium historiis probatas: prior juvenis est, altera senis hujus patris, tertia infantis, omnibus eadem hac methodo sanatis. BURSERIUS seni diabetico (erat autem generis spurii) longiorem lactis usum, adjecta chinae tinctura praescripsit; FRANKIUS denique in ipso diabete mellito, inquit, in quo nec alumen, nec tinctura cantharidum, nec pulvis Doveri cum camphora, nec cort. Peruviani cum simaruba decoctum, nec demum myrrha cum sale martis, auxilii quid praestiterant, ab asae foetidae cum extr. myrrhae aquoso et valeriana usu conspicuum urinarum decrementum ac tandem a cupro ammoniacali, bis indie a grano dimidio ad granum integrum porrecto, perfectam valetudinem, quam lautior simul victus confirmavit, obtinuimus.

Anatome pathologica circa hujus morbi naturam nihil certi docuit, nihil virorum celeberrimorum sententiae discrepantes, nihil praescripta a medicis remedia, nihil caussarum remotarum examen. Quae cum ita sint, vos siquis curandus vobis tradatur diabeticus, therapeuticen sequimini



universalem, tanquam filum Ariadnes in hoc praereos medicae labyrintho.

---

## ENURESIS.

Enuresis, incontinentia urinae triplicis generis est, RICHTERO auctore: vel semper guttatim sine sensu excernitur urina: vel tantus est ad mingendum stimulus, ut praeter voluntatem exeat: vel noctu tantum in somno effluit. Prioris generis caussa est atonia aut paralysis sphincteris ex partu, cystotomia, calculo, senio, ulcere, vitio congenito, ex morbo denique cum paralysi, narcosi, delirio: apoplexia, laesione spinae caet. Alterius generis spasmus est, a stimulo propter vermes, haemorrhoides, refrigerium, arthritidem, catamenia, calculum, ani fistulam. Tertii generis puerorum est pigrorum, profunde dormientium, somniantium; quorum trium generum curatio ad causas dirigatur oportet. In genere primo antiparalytica per actu frigida, adstringentia, incitantia, mechanica topica ipsique morbo, cujus symptoma est, adversa. In genere secundo antispasmodica, stimulos peculiare corrigentia, morbum principem curantia, sedantia. In tertio per auxilia diaetetica, psychica, physica, de quibus singulis Cf.

RICHTER in *Comp. Chirurgiae* IV. cap. 17. nec non DESAULT, HOWSHIP ll. ll.

Quoad causas in aliis alias haec FRANKIUS praecepit. » Interdum unius ejusdemque familiae proles ad unam omnes hoc vitio, non semper sine labis congenitae, scrofulosae, arthriticae dispositionis suspicione laborant. Sic omnes parentum a podagra vexatorum filios ad pubertatis usque tempus, enuresi nocturna, quaecunque demum subministrarentur auxilia, pertinaciter afflictos fuisse novimus. Vix menstrua filiae proruperant, cum sponte ac praeter opinionem hic morbus dispareret, sed brevem post moram, haec ipsa spasmodicum in asthma, licet corporis eleganti firmoque habitu gauderet, conjecta et herpetibus hinc inde ad cutem notata est. A rheumatico, catarrhali vesicae affectu, a chronica hujus visceris phlogosi, a sanguinis menstrui, haemorrhoidalis has ad partes congestionem et interdum a solo cum partibus aliis consensu hujus alvei sensibilitas et mictionis frequentioris necessitas non raro increscunt.

A spasma vesicae vel abdominalium musculorum violento urinas cum impetu expelli, epilepticorum exemplo comprobatur."

Enuresis autem, ita cl. STRINGAR, FRANKIUM hoc loco secutus, sive prorsus nolentibus, sive vix admonitis, sive parum sentientibus accidat, morbus valde molestus et foedus est, aegrotantes a societate humana excludens, non solum vestimenta in-

quinans, sed etiam cutim vicinam genitalium et femorum, intertrigine, phlogosi, ulceribus afficiens.”

Is de vitiis structuræ adsiduum urinae stillicidium inducentibus verba faciens citat MORGAGNUM, *Epist.* 39. art. 33. et *Epist.* 42, art. 36. qui tamen uterque locus, siquid recte video, magis ad urinarum retentionem, quam ad enuresin spectat. De priori illud diserte ipse indicat MORGAGNUS. Verum mulieris aegrae historiam, quae scitu certe perdigna est, continuo subjiciam. » Mulier annis ut videbatur quadraginta non multo minor, jam ante annum profluvio sanguinis ex genitalibus laboraverat. Hoc uterinus fluor exceperat: quo colore aut odore incertum; illud certum, cum acerbissimis hypogastrii et huic subjectarum partium nocturnis praesertim doloribus fuisse conjunctum et cum tumore, in quem unum coaluisse dicebat tubercula quaedam disjecta, olim in medio hypogastrio percipienda.

Erat nunc is tumor in ea ipsa sede, eo tamen usque adscendens, ut ab umbilico vix duobus distaret, transversis digitis, proportionem latus, adeo prominens extrorsum, ut vel minus in oculos incurreret, subrotundus, aequalis si tangeres et renitens. Adsiduum accesserat urinae stillicidium, dolor spasmodicus ad guttur, nausea et vomitus aliquando, macies, febris. Quibus malis omnibus sic debilitata et fracta sub initium a. 1741. venit in Nosocomium Patavinum, ut intra sex septemve

dies defecerit, nemine dubitante, quin ex cancro uteri tumore discessisset. Et cancer quidem uterum ex parte eroserat, sed tumor ad ipsum non attinebat, ut per dissectionem inveni et magnae doctorum ac studiosorum juvenum coronae ostendi. Ventre enim patefacto, continuo adparuit, vesicam urina distentam; id quod nemo, jugiter lotio, ut dictum est destillante, inducere in animum potuisset; magnum illum tumorem fuisse. Coaluerat illa anteriore facie alte supra pubem cum ventris parietibus: et si anterioris ejusdem faciei ac summi fundi non modicum spatium exciperes, suos reliquos parietes omnes ex dura albaque substantia digiti crassitudine habebat, ut urina educta perspeximus, cujus magnam vim continebat non lixiviosae, non crassae, non graveolentis, sed ferme aquosae. Intima vesicae facies sana erat, tenuibus dumtaxat et raris sanguiferis vasculis distincta nonnullis locis; ut vesicae orificium, ad quod saepe conferta esse solent, iis vasculis omnino careret. Ab ejus orificii lateribus singulis singula intra vesicam prominebant alba corpora abnormis figurae, pollicis apicem aequantia, producta ex substantia urethram ambiente, quae substantia hic erat tota facta crassior et dura et alba, quo colore ipsa quoque intus erat urethra.

Porro tota illa ureterum pars, quae inter vesicae membranas traducitur, magis quam solet, in-

tra vesicam prominebat donec in oscula desineret consuetis ampliora: valdeque dilatati erant toti ureteres, quorum erat alter lotio, alter aëre quasi plenus. Sed et renum, sanorum alioquin et pelves et pelvium tubuli erant dilatati."

Alter locus (*Epist.* 42. art. 36.) est de prostata glandula hypertrophica, urethrae initia comprehendente urinaeque exitum impediende, ulcere autem facto effusoque pure, dysuriae subsequente urinae stillicidio; de quo loco anceps haereo, num ad enuresin referam eoque magis, quum in citato FANTONI exemplo post diuturnam a vesicae calculo dysuriam examen anatomicum partium, amplissimos ureteres, vesicae contra, ipsius ob nimiam membranarum contractionem, parvulam capacitatem dissecantibus ostendit. Praeclare ejusmodi observationes interpretatus est eximius inter Francos Chirurgus DESAULT, qui contendit: enuresin praesertim infantum morbum esse, minus adultorum, vix senum." Videri poterit, sic pergit, haec opinio erronea iis, qui crebras audiunt senum de urinarum incontinentia querelas, nescientibus, ejusmodi aegros saepius credere, quia exuberant urinae, enuresin esse: dum tale stillicidium retentionis ipsius symptoma est.

Sunt vel chirurgi ab hoc errore non liberi, nec intelligentes, stillicidium esse posse cum retentione hujusque esse sequelam, ut est in atonia, aut paralyti vesicae. Nempe fibris hujus partis dis-

tentis in urinas renitentibus hisque per urethram effluentibus, donec sphincteris vis retentrix in aequilibrio fuerit cum vi vesicae expultrice. Subinde urinae perpetuo exeunt, propter vesicam prorsus atonicam factam; tunc enim hoc cavum semper plenum recipere non posse urinam per ureteres affluentem, quin ei suppar copia per urethram exeat.

Enuresin nocturnam, qualis infantum et puerorum est, non omnino praeter arbitrium fieri, ingeniosa hypothesi probavit Jo. HowSHIP l. l. p. 202 sq. Pars II. cap. 1. atque exinde feliciter ejus sanandae methodum per auxilia psychica explicuit. Talibus tamen remediis minus quam diaeteticis confidit FRANKIUS, quemadmodum haec ejus verba testantur: » infantes sub nocturnis insomniis in se ipsos mingentes, ad coenam tum potu copioso, tum cibis qui urinae copiam adaugent, abstineant; ut lotium quo lectulum petunt tempore, avertantur; ac hora nunc ista, nunc illa, ex somno longiori, ut vesicam exonerent, evigilentur. Nec minae, nec verbera, nisi ratio et pudor, aut aetas major id faciant, habituali huic vitio medentur. Si forsitan universalis debilitas, cum nimia vesicae sensibilitate conjuncta videatur, tunc chinae decoctum ac caetera roborantia atque si per consensum vesica stimulari videatur, nunc opium, nunc illa quae longinquae irritationis causam debellent, in usum trahenda sunt."

De reliquis adversus foedum hoc vitium remediis tum supra diximus tum plenius dicere vetat instituti ratio: quandoquidem universalia praecepta therapeutica ab iis, quos memoravimus, auctoribus tradita legitimo observationum numero non nituntur ideoque de singulis remediis nihil dicere probabiliter possum: de nonnullis vix audeo dicere: de tinct. cantharidum exempli causa, aut remediis mechanicis, quorum usus nequaquam tutus est ideoque medicis junioribus minus commendandus. Si ex calculo enuresis, is extrahendus; si ex vitio nata organico, vulgo neque immerito insanabilis habetur. » Interim Genuensis nobis exemplum juvenis notum est, ita FRANKIUS, cui vesicae abscessus cum recto intestino sat aperte communicans vel solius auxilio naturae sanatus est."

---

#### DE ISCHURIA (\*)

Dysuria, stranguria, ischuria rectius morborum symptomata, quam morbi adpellanda (de quorum notione ac significatione Cff. *Init. Discipl. Pathol.* §. 658 sqq.) eapropter hoc loco commemoranda

---

(\*) Cum hoc capite conf. proxime sequens de *Syphilide*.

sunt, quia non facilis est medela, nisi origines in aliis alias cognoverimus ac distinxerimus.

Duae priores a tertia gradu potissimum distant, ita ut dysuria et stanguria leviores, omnium vero gravissima sit ischuria: qua voce comprehendunt duo diversa genera affectionum: cum urinarum suppressionem, quae *notha*, tum urinarum retentionem, quae *vera ischuria* dicitur. Eam distinctionem jure merito plurimi fecit praeclarus medicus chirurgus DESAULT: minus antiquiores interque eos anatores practicae auctores BONETUS et MORGAGNUS in singulis observarunt; quod ab hujus praesertim subtili accurataque doctrina haud expectaveritis, facile tamen condonabitis, aegrotantium legentes, quas protulit ipse, historias, quarum plures sunt, multas simul urinarum vias laesas monstrantes.

Suppressio est, ubi nihil urinae secernitur: unde deficiens ad mingendum stimulus, nullus vesicae tumor nullaque inmisso cathetere urina detracta. Notat MORGAGNUS, nec VALSALVAE, nec sibi contigisse, ut mortuorum ob suppressas vitio renum urinas corpora inciderent idque nec mirum, cum renes et ureteres gemini sint, ut si forte uno in latere deficiat, eorum officium in altero suppleatur. Neque enim quod multi credunt, semper verum esse otiante renum alterutro, alterum quoque simul otari. Constare contra, multo rarius accidere, ut renum et ureterum, quippe ge-



minorum vitio urina supprimatur, quam vesicae et urethrae, quae unae sunt.

Itaque praevidetis, quae hoc titulo a MORGAGNO proferuntur, aegrotantium historias retentionis magis fore, quam suppressionis urinarum exempla et eas legentes, ita se rem habere comperietis.

Supprimuntur urinae ex renum inflammatione, congestione, calculo aut nervorum affectione sive erethica, sive paralytica. Lustrantes quae apud BONETUM prostant exempla, ea fere ad renum calculos adtinere videbitis: longe plurima tamen non tam suppressionis, quam quidem retentionis exempla sunt. Suppressionis calculosae ea esse solent, quae prius renum calculo adscripsimus (pag. 435.) symptomata. Nolite tamen existimare, ubi haec deprehenduntur, continuo calculum latentem denotari. Iudicii temeritatem manifestaret fortasse anatome, uti evenit in duabus hisce WILLISII observationibus. » Rara est observatio anatomica super cadavere reverendissimi Episcopi Castrensis, nuper facta. Cum illustrissimus ille dominus diu calculosus demum a suppressione urinae diuturna fatum obierat, mox praesumebant omnes, lethi causam fuisse ureteres a lapide, aut materia sabulosa penitus obstructos: nulla omnino in ductibus istis obstructio aut lotii impedimenta deprehendi poterant. Similem huic observationem anatomicam haud pridem a se factam retulit mihi vir doct. LOWER, ubi nimirum ischuria lethalis

nulla prorsus circa vias urinarias sui vestigia reliquerat."

Videtis, in priori observatione *ureteres* scribi; qui tamen si revera lethi causa fuissent, non suppressio haec, verum retentio fuisset vocanda: quam utramque, uti hoc loco, ita alias crebro confundit BONETUS, cujus Sepulchreto, suppressionis sub titulo, observationes illae insertae sunt. Nec credite, ubi calculus etiam major renum pelvim teneat, continuo urinas supprimi. Nam vel ad latera calculi diffluere, vel per ipsum foramine pertusum transire memoriae proditum est. Hoc sequenti vos doceat exemplo EUSTACHIUS probatissimus de renibus auctor: » superioribus annis quidam altero rene doluit cruciatusque adeo auctus est, ut misellus brevi vitam cum morte commutaret: hunc calculo minime laborare constanter affirmabant medici, quia neque urina suppressa unquam fuerat, neque tenuis seu turbida, aut sabulosa unquam apparuerat. Omnibus solus ego repugnabam, arbitratus, alterum renem officio suo probe fungi, alterum penitus obstructum nihil penitus lotii transmittere. Contentionem diremit sectio, quae aliter se habere, quam nos opinaremur patefecit, lapidem nimirum magnum et oblongum cruciatus et interitus causam fuisse, qui cum esset medius perforatus, quo minus urina exiret, impedire non poterat."

Quo minus vero ab altera parte credatis, sedem

semper exacte posse definiri, haec impedit relatio MORGAGNI: » Quendam urinae et partium huic inservientium vitio laborare, erat omnibus manifestum. Sed cum de renibus, aut de regione horum nihil aut vix quereretur; contra iis ad vesicam doloribus cruciabatur, ut quinque aut sex non infimi subsellii medici morbi sedem in vesica esse non dubitarent, mortui dissectio nihil quidquam mali in vesica; magnos autem ramososque calculos in renibus ostendit."

Suppressionem a nervis ex hysterica passione graphice descripsit SYDENHAMUS. » Quandoque hoc malum, inquit, in alterutrum ex renibus incurans, atrocissimo, quem illic parit dolore, paroxysmum nephriticum omnino mentitur idque non solum doloris genere locoque quo saevit, sed et adscitis vomitionibus immanioribus, tum etiam nonnunquam ex eo, quod dolor per ureterum ductus propagetur. Ita ut aegre admodum dignosci queat, utrum haec symptomata ab incluso calculo, an vero ab affectu aliquo hysterico enascantur; nisi forte casus aliquis acerbior aegrae animum paulo antequam corripereetur discrucians, aut materiae viridis per vomitum rejectio, symptomata ista adfectioni potius hystericae, quam calculosae tribuenda esse docuerint. Sed neque vesica ab hoc pseudo-symptomate atque e mentito adfectu immunis est, cum non tantum ipsa ab eo doleat, sed et urina supprimatur perinde ac si calculus eam ob-

strueret, qui tamen nullus est. Rarissime autem cernitur postrema haec species vesicam attingens, quae vero renum calculum imitatur, non ita raro. Utraque eas solet invadere feminas, quarum vires repetitis saepe paroxysmis hystericis jam fractae sunt et sanitas corporis detrita."

Ischuria vera, sive urinarum retentio aut renalis est et ureterica, aut vesicalis, aut urethralis, quibus nonnulli quartam speciem a praeputio adnumerant.

Renalis et ureterica: in pelvi renum, in ureterum ductu, inprimis a calculo sunt, vias illas obstruente: neque ureterica haec scire, ut bene praecipit probatissimus de Chirurgia scriptor DESAULT, nisi post mortem cognoscitur. Eam quidem suspicari quandoque licet, cumque liceret, ars medica ejus amovendae vix certa promitteret auxilia, nisi vel faecibus in recto vel calculo vesicae ad orificium ureteris subsistente hae viae impedirentur, eodem auctore monente. Pleni sunt medicorum anatomicorum libri observationum hujus speciei retentionis, immo permultas, quae urinae suppressioni adscribuntur, huic ipsi rectius adscripsissent auctores. Talis casus fuit Joh. Sperlingii Professoris Wittenbergensis et Monachi, cui male datus cantharidum pulvis ventriculum et vesicam exulceravit et Magdalenae Nicolae apud TULPIUM nostrum, cui pariter ac Sperlingio, cum ureteribus renes calculo obturati et aliorum, tam puerorum,

quam virorum ac mulierum, quorum omnium meminit BONETUS: neque hercle mira res est, calculis in ureterum alterutro haerentibus, in rene quoque ejusdem lateris haerere.

MORGAGNI observationes pleraeque ischuriae vesicalis sunt. Quocirca continuo ad hanc transibimus. Est affectio puerorum maxime, gravidarum, senum: illis ex calculo aut spasmo, his ex vesicae paralyti, catarrho, prostatae vitio; gravidis ab utero tum quarto tum ultimo graviditatis mense vesicam premente, subinde etiam ab eodem gravido retrorsum verso. Pueri calculosi mala lithotomi arte occisi exemplum legitur apud MORGAGNUM *Epist.* 42. art. 8. Morbi complicati historia est Andreae Cortinii renum, vesicae, prostatae morbo calculoso confecti. Solius vesicae aegrotantis in adolescente exemplum exstat *ibid.* art. 15. Sequuntur puellarum sceleratarum: quarum unam exempli loco proferam. » Adolescentulae rusticae ossea crinalis acus eodem quo prioribus modo in vesicam attracta, etsi dolores molestiasque creabat multas, non antea tamen facti confessionem expressit, quam calculo acui adnato, intolerabili cruciatu affecta est. Tunc denique cum inspiceretur, acus mucro, urethra prope infimam vaginae sedem pertusa, intra hujus cavum prominens repertus est. Visum Mariano, si non nihil secundum longitudinem urethra incidetur, acumen illud in uréthram posse retrahi sic-

que acu et calculo in directum statulis tentari, an hunc fragilem fortasse, desquamando sensim et dextere ad cam redigere tenuitatem liceret, ut cum acu eximeretur. Repugnantia aliorum factum est, ut nulla re tentata, suae sorti misera puella relinqueretur. Ut tempus sic calculus quoque et cruciatus augebantur obturatoque jam propemodum toto vesicae orificio, vix paucae eaeque graveolentes urinae exhibant. Sic febribus quoque accedentibus tandem vitae infelicitis factus est finis. Ventre aperto pus in hujus pelvi conspectum est creditumque a renibus, qui suppurati erant effusum. Vesicae sphacelo correptae inerat calculus pyri forma; nam quo magis a capitulo et superiore acus parte descendebat, eo magis se extenuabat.

Hae ut juniorum, sic seniorum prostatae vitia et vesicae catarrhus, quibus urinarum ex vesica in urethram via intercipitur. Utrumque non infrequenter cum vesicae calculo consociatur, altero alterum malum trahente unitisque corporis perniciem inferentibus. Rei exemplar ob oculos posuit CRUVEILHIERIUS ea, qua excellit ejus anatome, graphica arte. (*Livr. 17. pl. 2.* quacum Cf. BAILLIE *Series of Engravings fascic VIII. Tab. 3.* priori profecto non inferior eique, ut ovum ovo similis.) A prostatae hypertrophia morbus initium sumit, sequitur urinarum in vesica retentio, vesicae irritatio, inflammatio, hypertrophia, calculique ad

nucleum quemcunque formatio. Haec series maiorum, quibus senum plurimorum vita extinguitur. Exemplo sit haec VALSALVAE observatio (MORGAGNI Epist. 41. art. 6.) » Vir annorum septuaginta, cum diuturna mingendi difficultate laborasset, ut nonnisi catheteris ope urinam redderet, aucto indies morbo, in Bononiensi Nosocomio S. Mariae de Vita decumbere coactus est. Ibi dum a lithotomo per catheterem urinae exitus, sed incassum quaerebatur, subsecuta laboriosa respiratione, cum stertore mortuus est. Vesicae urinariae fibrae adeo creverant, ut cordis lacertos figura et magnitudine referrent. Prostatae glandulae excrescentia ad pyri formam, vix ullum transitum permittens, ex assiduo catheteris impetu phlogosin in ima parte conceperat. Ventriculus cordis dexter polyposae concretionis inchoamentum ostendit.”

In omnibus hisce aegrotantium historiis par morbi progressio parem admittit interpretationem. Nempe ex prostatae scirrho natum urinae excernendae obstaculum tunicam musculosam in contractiones ciet validiores, unde auctum fibrarum robur nec non ab urinae retentae stimulo mucosae internae irritatio, inflammatio chronica, hypertrophia denique.

Catarrhum vesicae optime descripsit nostras Jo. GRASHUIS hunc quidem in modum: » lotii e vesica excretio molesta multis stipata symptomatibus saepe occurrit. Morbus totalem quandoque per

aliquod tempus urinae suppressionem efficit, cum perpetua ad mingendum incitatione, dolore ardentissimo et vix tolerabili, ita ut vicesies, vel et pluries saepenumero naturae ad excernendum conatibus, frustraneis licet, una hora obedire cogatur aegrotus; donec tandem magna cum vi, muci vel pituitae viscosae copia quadam ex urethra prorumpente, urinae pars in vesica contenta secuta fuerit. Brevi dein tempore, aliquando citius, quandoque etiam majori cum intervallo suppressio redit, vel urina tantum guttatim exit. Et quod emittitur lotium crudum est, foetet ut plurimum et licet homogeneous liquor primo aspectu videatur, simulac frigefactus fuerit, ad fundum matulae vel vitri uroscopi, pituitam magna copia deponit, viscidam valde et fundo vasis, effusa urina, tenaciter adhaerentem. Aliquando hicce mucus in ramenta vel fragmenta divisus, pituitae crassae ex naribus excussae, vel sputis tenacibus exscreando, ex aspera arteria ejectis non dissimilis est.

Quandoque etiam striae sanguinolentae ipsi sunt intermixtae; imo quidem merus sanguis post eum simul cum urina exit. In quibusdam etiam frequens dolor ad lumbos se extendit, unde aegri nephritide laborare dicuntur. Miserrimi hi cruciatus aliquando per annos durant, pro tempore intermittentes, sed postea non minori cum vehementia redeuntes, aegrotos debiles et emaciatos



reddunt. Etsi morbus non plane intermittat, est tamen modo remissior, modo acerbior; immo et raro licet, muci praedicti ingentes excretiones per annos sine magno dolore aegrum tolerasse novi. Urina etiam intermissionis tempore ut plurimum aliquid muci, plus minus viscosi intermixtum habet et saepe foetet, praecipue instante paroxysmo suppressionis, vel stranguriae eoque magis quo minus libere evacuari potest; remanente tunc semper quantitate aliqua, mora putredinem contrahente. Morbus homines invadit a calculo liberos, senes frequentius, rarius juvenes, vel qui mediae sunt aetatis."

Ne cum hac morbi forma confundatis cystitidem ex calculo ulcerosam, hunc apponam ex Morgagno Epist. 42. art. 15. morbi casum. » Adolescens annos viginti praetergressus a longo jam tempore iis vesicae doloribus praesertim cum mingeret, cruciabatur, ut sine ejulatu urinam reddere non posset. Purulenta haec erat, accesserant macies, febris et reliqua mala, quae fere vesicae lapidem comitantur et quibus tandem in hoc Nosocomio decumbens ante finem anni 1742. absumtus est. Vesica crassa exulcerata et ex parte scirrhusa revera lapidem continebat, subasperum, transversos digitos tres longum, duos cum dimidio latum, qua erat latissimus; ad formam autem accedebat ovalem, utrinque depressam: eique multus lentus cruentusque alicubi mucus circum adhae-

rebat. Pure autem et urina pleni erant renes et ureteres; imo hi tam distenti, ut ilei intestini diametrum aequarent."

Nec tamen semper accusate laesiones organicas, immo dynamicas etiam cogitate affectiones, stricturas spasticas, nervorum resolutiones, alias. Rem vobis doceat haec observatio editoris Monographiae Chopartianae FEL. PASCAL, quae virum spectat, ex ischuria aegrum, pulsu parvo, contracto, spiratione gravi, suspiriosa, vultu rubro, lingua sicca, siti magna, vesica supra pubim tumore oblongo tumente. Octo abhinc diebus hi paroxysmi retentionis urinarum inceperant, ordientes ab aegritudine, sensu horripilationis ex regione lumborum corpus universum invadentis, testiculis retractis ac dolentibus, pene semi-erecto, perpetuo ast inani ad mingendum nisu: paroxysmo post horas declinante pedetentim, sat cito tamen: urinis defluentibus primo guttatim inde pleniore rivo, nulla neque ardoris, nec pruritus sensatione, coloris saturati; malo saepius eodem interdum die redeunte: nunc autem ter hoc anno tales ischuriae paroxysmi hunc aegrum cruciaverant. Frustranea fuere ad urinas evacuandas tentamina, subsistente ad tertiam superiorem urethrae partem instrumento: quo loco esse videbatur obex. Post multas et repetitas quaestiones, tandem confessus est aeger, ex manustupratione in morbum incidisse et nunc et antea. Itaque ad spasmum solvendum

perinaeo admotae hirudines ac fomentis ex oxycrato dataque potione gummosa posteroque die balneis et exercitiis adhibitis emendatoque pravo more, perfectam constantemque valetudinem aegrotus recuperavit.

Huic opposita ischuriae caussa est vesicae paralysis, ex apoplexia medullaeque spinalis commotione: nec non altera organica: ex scirrho uteri, recti, vesicae; quarum quae ex uteri scirrho et carcinomate est, prae aliis crebra a medicis observatur.

Ischuria ex vitio urethrae blennorrhagiam urethralem repetitam sequi solet, praesertim neglectam illam, aut male curatam.

Hujus igitur urethralis ischuriae longe frequentissima caussa est strictura urethrae, consentientibus cum Francis Anglis de chirurgia auctoribus: hujusque ipsius caussa inflammatio est, sive blennorrhagia urethrae. Nam spasmus, qui solius superioris urethrae partis esse potest, atque philosopho percelebri ROUSSEAU vanum injecit calculi metum, ex rarissimis est morbi casibus: carunculae vero, in quas antiquiores mali culpam rejicere consueverant, eo pauciores factae sunt, quo accuratiori examini subjecta res est. Morbi historiam dedit hancce eximius auctor DUCAMP, quem plerique compilarunt. » Fluunt urinae rivulo tenui, bipartito, contorto, lento cum levi punctione ponderisque sensu et pruritu. Inde augetur cum difficultate mingendi cupiditas: accedunt dolores, tre-

mores tandemque in crura mingunt; deinceps guttatim exeunt parcissimaeque urinae summoque molimine ac praeter arbitrium elabitur lotium, aut ex vesica repletissima refluit: denique derepente transit in gravem perfectamque ischuriam: cui nisi medetur ars, inflammatio, sphacelus, ruptura succedunt: haec mala comitantur symptomata febrilia: levasse subinde, nec sustulisse tamen sudores urinosi feruntur.

Retentio urinarum ex praeputio arcto aut imperforato tam ex vitio congenito, quam ex hujus ulceratione, commemoratur ab experientissimis chirurgis DESAULT et CHOPART II. II.

Habetis expositas praecipuas ischuriae diversitates; quas omnes si explicare vellem, dies profecto et latera deficerent: explicatas autem invenietis in numerosis nuper etiam de hoc argumento editis medicorum chirurgorum scriptis.

Nos ut ex hisce ambagibus tandem inveniamus exitum, ad curationem tradendam festinamus; prognosin enim variam suppedietabit accurata originum caussarumque cognitio, uti speciminis loco ischuriae vesicalis respectu indagatum reperietis a clarissimo chirurgiae professore CHOPART, lib. II. pag. 186 sq. Nec minus varia est curatio antiphlogistica, antispasmodica, antiparalytica, chirurgica, alia.

Prior antiphlogistica curatio ei quam optime medebitur, quae a plethora est ac phlogosi ischu-

ria, sive *notha* illa seu *vera*. Altera antispasmodica, ei quae a spasmo est, cum alia, tum sedans saepius. Calculosae quae conveniat curatio, antea vidimus. Prostatae vitio si phlogisticum, antiphlogistica, si hypertrophicum scirrhosum, antiplastica respondent; vesicae catarrho, quae blennorrhoeis opponenda sunt remedia: ex antiquiorum de morbo hypothesi adstringentia tonica: ex recentiorum praecipue sal ammoniacum. Urethrae stricturas majores cereolis, aequales cauteriis sanari voluerunt: an recte, an secus, judicabunt posteri: certe cujusque methodi ut sua beneficia, sic sua incommoda suaque pericula sunt, et utraque haud vulgarem requirit medici chirurgi et peritiam et dexteritatem.

Nonnulla therapeutices universalis loca perstrinxit CHOPART. Praestat tamen, singulas aegrotantium historias apud probatissimos de hujus officinae morbis auctores pervolvere, secundum rationem temporum: quam generalioribus illis immorari. Quo facto videbitis, artem indies magis emendatam magisque perfectam eamque ab aequalibus nostris tum in Anglia, tum in Gallia potissimum magno studio ac laudabili profecto industria excultam.

Haec, quae docui, ut exemplo probem, citabo decimam tertiam excellentis medici chirurgi DUCAMPI observationem, qua tradita finem dicendi faciam.

*Lib. II. Pars I.*

31

Senex sexagenarius, qui juvenis plures perpes-  
sus erat blennorrhagias, ante paucos annos vesica  
et urethra doluit urinasque minxit pituitosas, am-  
moniacales. Noctu saepius urinas emittere coac-  
tus plures consuluit medicos, qui ipsum ex catar-  
rho vesicae aegrotare perhibuerunt, quem inimi-  
cum ferendum esse ac diaeta leniendum mollique  
medicina. DUCAMPO rem perquirenti visum est, ex  
fluxu blennorrhagico habituali latere urethrae stri-  
cturas et exploratione compertum, ita esse ac sus-  
picatus erat: cognito per ceram inmissam obice  
eoque per cauterium admotum deleta, urina facili  
plenoque rivo exiit: deinde altero obice pari ra-  
tione destructo atque urethrae canali per candelam  
aut cereolum dilatato atque unguento mercuriali  
per crassiorem cereolum quotidie ad vesicae  
collum translato, blennorrhoea stetit et aeger non-  
nisi semel noctu urinam emisit: saepius dumtaxat,  
dum cubitum iret, aut e somno evigilaret sicque  
curatus convaluit.

Hac historia docemur, sunt auctoris ipsam com-  
mentantis verba, numquam omittendam esse ure-  
thrae explorationem in iis, qui ex catarrho vesi-  
cae aegrotant ac si quem offendamus obicem, hunc  
actutum esse delendum: id quod semper aegro pro-  
futurum est.

En exemplum catarrhi vesicae ex strictura ure-  
thrae eaque sublata sanatae!

---

DE SYPHILIDE, SIVE LUE VENEREA.

Exeunte seculo decimo quinto morbus in Europa exortus est, incognitus antea, neque a veteribus descriptus incertaeque prorsus originis, symptomatum atrocitate, contagionis potentia, periculi magnitudine, indolis pertinacia, vultus foeditate cum nullo alio comparandus.

Morbum Gallicum hunc, syphilidem, luem veneream nuncupaverunt: cujus qualis fuerit primis illis temporibus facies cognoscere si velitis, ecce HIERONYMI FRACASTORII Veronensis, auctoris probatissimi descriptionem!

» Principio igitur quum is apud nos apparuisset, hae fere notae conspiciebantur in illo morbo. Oriebatur in quibusdam sine ulla ab alio concepta contagione: in quibusdam (quae maxima pars erat) e contage excipiebatur, verum non ex omni contactu, neque prompte, sed tum solum, quum duo corpora contactu mutuo plurimum incaluissent, quod praecipue in coitu eveniebat, quo maxima mortalium pars infecta fuit. Visi tamen infantes nonnulli fuerunt, qui e suctu lactis a matre, aut nutrice infecta consimiliter affecti sint. Fomittem autem non relinquebat ea contagio, aut nonnisi maxima quadam occasione neque ad distans etiam sese propagabat. Sed neque statim manifestabatur, verum certo tempore delitescebat, interdum

quidem per mensem, interdum per duos saepe et per quatuor menses. Interea tamen signa nonnulla aderant conceptae labis: animum tristitia quaedam detinebat, corpus lassitudo, pallor faciem. Tandem quod in majori parte inerat, ulcuscula quaedam circa pudenda oriebantur, iis non dissimilia, quae solent ex fatigatione contingere, quam cariem vocant, sed natura longe impar, nam haec et emori contumax erat et victa una parte alia regerminabat, immortalis propagine. Post haec crustosae quaedam pustulae per cutem erumpebant, in quibusdam quidem a calvaria incipientes (quod ut plurimum erat) in quibusdam in aliis locis, parvae primum eae apparebant, mox augebantur paulatim ad magnitudinem cooperculi glandis et similitudinem etiam, iis non absimiles, quae in pueris achores vocantur. Differentiae earum nonnullae visebantur, quibusdam parvae et sicciore, quibusdam majores et pinguiore, nonnullis lividae, aliis exalbidae leviter pallentes, aliis duriores et subrubentes.

Omnes autem paucis diebus aperiebantur ac mucore quodam mucilagineo foedo manabant, nec dici potest, quantus ille mucor perpetuo effluebat, quanta sordities. Exulceratae deinde exedebant, more eorum ulcerum, quae phagadaenica appellantur, atque interdum non solas carnes, sed et ossa etiam ipsa inficiebant. Quibus autem circa superiora vigeat malum, iis destillationes pravae contingebant, quo modo palatum, modo gargareo-



nem, modo fauces et tonsillas erodebant. Labia quibusdam consumpta sunt, quibusdam nasus, quibusdam oculi, quibusdam pudenda tota. Adhaec autem magna ex parte gummositates quaedam per membra exerescebant magna deformitate. Nam saepe ovi, saepe panis magnitudinem aequabant, quibus apertis mucor suberat albus, mucilagineus. Tenax is callus maxime in brachiis et cruribus accidebat, qui interdum ulcerabatur, interdum integer usque ad mortem perseverabat. Praeter praedicta omnia, quasi parva illa forent, ingentes lacertorum dolores accedebant, saepe cum ipsis pustulis, interdum ante, nonnunquam post, et ipsi quidem diuturni, quibus nihil crudelius aderat. Affligebant praecipue noctu. Dolor autem non proprie in juncturis inerat, sed circa lacertos ipsos et nervos. Verum quibusdam nihilominus sine dolore ullo oriebantur pustulae; quibusdam sine pustulis dolores: major pars utrisque affligebatur. Interea languebant membra omnia, macies corpus detinebat, nullum aderat desiderium cibi, nullus somnus, sed moeror et iracundia assidua et amor decubitus; facies et crura turgebant. Quandoque et febricula quaedam concomitabatur, sed raro. Dolebat quibusdam caput. Dolor is erat diuturnus et nullis medicaminibus parens. Sanguis si hauriebatur, is sincerus mucosusque spectabatur. Urina crassa, pinguis, divulsa et subrubens. Quo solo signo cum non adesset febris, multos praenotinus eo teneri morbo. Egestionis aegre redde-

bantur et illae mucosae siccae. His ergo notis tenebantur, qui tum eo morbo laborabant. Loquimur autem de his quasi de praeteritis. Quoniam tametsi nunc quoque ea contagio viget, post tamen illa prima tempora immutata videtur. Abinde enim annis fere viginti coeperunt pauciores videri pustulae, gummositates vero plures, quum e contrario primis annis fuisset. Factae item fuerunt pustulae (si quae apparebant) sicciores ac dolores (siqui accedebant) sunt acerbiores. Porro et annis labentibus, annis jam fere sex in quibus nunc sumus, magna rursus mutatio facta est ejus morbi. Quippe quum in valde paucis pustulae jam visantur et dolores fere nulli, aut multo leviores, gummositates vero multae et quod mirum omnibus visum est, capillorum et reliquorum fere pilorum casus, homines fere ridiculos facit, aliis sine barba, aliis sine superciliis, aliis glabro capite in conspectum venientibus: quod infortunium prius putabatur ex medicaminibus evenire, praesertim ex argento vivo. Mox certiores facti omnes, sciunt ex ipso morbo immutato procedere, quin immo (et quod pejus est) jam nunc multis videntur labefactari dentes, quibusdam etiam cadere."

De hujus labis origine non convenit inter medicos, aliis ab America ipsam repetentibus, aliis ab Africa, aliis Epidemiae more ex complurium morborum concursu natam esse perhibentibus. Nec nostrum est tantos inter hos componere lites, de

quibus in artis historia exponendi et locus erit et tempus. Nunc notasse sufficiat, ab hac prima mali saevitia deinceps deflexisse ac mitiorem fieri coepisse morbum, qui qualis hodie cernitur, a topico genitalium vitio fere initia ducere solet. Quae cum nostra plurimum referat dignovisse, de his primo videamus.

Post coitum impurum altero, tertio, quarto, sexto, octavo die irritationis, titillationis, pruritus, sensus in pene sub frenulo percipitur, quem post biduum sequitur sensus doloris: orificium urethrae rubet, tumet, hiat exque urethra profluit humor limpidus primum, deinde flavus, viridis, purulentus, rubet glans atque increscunt, sub urinarum praesertim profluvio dolor et irritatio et ubi colicis erigitur: quod crebro fit ac praeter voluntatem, qua erectione crebra et crebra mingendi cupiditate somni turbantur; inde post alteram, tertiam, quartam hebdomadem symptomata remittunt, profluvium fit parcius humorque albidior, spissior, viscosus, tandemque cessat omnino: subinde contra vel ad corpora cavernosa progreditur inflammatio, colicis curvatur erectus (gonorrhoea chordata) vel ad vesicam, epididymides, testes, prostatam, glandulas inguinales traducitur, vel propter inflammationis vehementiam nihil secernitur (gonorrhoea sicca) vel mucifluxus chronicus superest (blennorrhoea) vel nato ulcere puris fluxus fit (blennorrhoea ulcerosa, pyuria) aut strictura urethrae: subinde glans inflammatur (balanitis) humorem

que profundit (blennorrhagia spuria) aut tumet retracto praeputio paraphimosin faciens, aut tumet praeputium, cujus tumore et angustia phimosis nascitur, qua glans strangulari visa est; vel denique urinae officina partibusque vicinis inflammationis ischuria, aut suppressum profluvium: otitis, ophthalmitis, syphilis universalis sequuntur (\*).

Mulierum blennorrhagia magis vaginae est, quam urethrae: interim tamen recentiorum adcuratio cognitio quatuor ejus species distinxit: vulvae, vaginae, urethrae, uteri: quarum symptomata sedis ratione different, quamvis caeterum blennorrhagiae in viro similia, mitiora tamen esse animadvertantur sique paullo saeviora fuerint, ulcera subesse observavit experient. SWEDIAUR, classicus de syphilide auctor; quae ulcera crebro latent, nec facile, nisi per speculum deteguntur.

Blennorrhagiae virilis sedem praecipue investigavit MORGAGNUS: eamque, primam scilicet, in iis potissimum quos detexerat majoribus urethrae canaliculis statuit, i. e. sub frenulo, ad fossam navicularem inque lacunis mucosis; quodsi longius procedat morbus, vel pravam medicationem accu-

---

(\*) Phimosis, paraphimosin aliosque genitalium morbos pulcris iconibus illustratos Vid. in opere splendido magis, quam erudito et ad novae doctrinae placita prorsus composito, Viri Clar. DEVERGIE: *Clinique de la maladie Syphilitique*, Paris 1826. *avec atlas*.

sandam esse, vel aliam quamcunque causam, quae profluvium suppresserit, auctor est celeb. SWEDIAUR. Contra in longe plurimis casibus partes altiores urethrae ipsamque prostatam inflammari contendit LAGNEAU atque symptomata et sequelas in suae theoriae fidem citat. Esse scilicet ponderis dolorisque obscuri at continui sensum et tenesmum et urethrae totius turgorem vel tactu manifestum et nodos et stricturas ad bulbum, quam ad exitum sive orificium crebriores jure suo, nec sine causa profert.

Ex iis, quas scripto consignavit MORGAGNUS, observationibus unam referam. » Juvenis annum agens vigesimum quintum, cujus flavescebat facies, virulentam gonorrhoeam vetustam recentiore altera ante sex menses renovaverat. Qua perstante ex profundo vulnere in colli sinistrum latus inflicto tantum sanguinis et toties profluxit, ut inevitabilem mortem attulerit inter initia a. 1740. Cadaver ob praegressas haemorrhagias propemodum exsangue eoque perquisitionibus anatomicis aptissimum ibidem, nostris inspectantibus auditoribus, tanto diligentius persectum est, quod perpauca habuit ab naturali constitutione discrepantia. Ubi ad genitalia ventum est, praeputium, glandem, urethram totam perattente inspiciens, nihil usquam ulcerum, erosionis, ruboris inveni, nec quidquam aliud, quod ad praesentem gonorrhoeam attineret, si madorem excipias, quam soleat, majore

rem, a media urethra ad glandem usque pertinentem" ac reliquis, quae huc non attinent, traditis, » miraberis forsitan, pergit, in propositis observationibus, cum praesens esset gonorrhoea, non plura nobis occurrisse, quae ad praesentem quidem referri possent, quam urethrae madorem nonnunquam cum rubore conjunctum:" ex quibus viri summi verbis jure quodam nostro effici existimamus, non alia eum invenisse, quam inflammationis urethralis praegressae signa: unde sequitur, gonorrhoeam sive blennorrhagiam nihil esse aliud, quam urethrae inflammationem.

Quae cum ita sint, ex alia causa, quam ex syphilide blennorrhagiam fieri, intelligetis, neque hanc veteribus ante syphilidem cognitam fuisse, mirabimini aut peculiari ad eam opus esse medicatione, credetis.

MURRAYUS in lucem ediderat observationem gonorrhoeae sive blennorrhagiae rheumaticae dolores artuum rheumaticos secutae, quam medicina anti-rheumatica feliciter inhibuit: atque ab aliis blennorrhagiae memorantur, herpeticæ, leprosae, suis ex causis natae suisque sanatae remediis. Rem vero, ut evinceret, ipse in se periculum fecit celeb. SWEDIAUR, sibi injiciens solutionem ammoniac satis acrem, eo cum eventu, ut inde nata sit blennorrhagia gravissima, ex qua post sex demum hebdomades perfecte convaluit.

» Sumpsit, sic ipse rem refert, sex uncias aquae,

cui tantum ammoniae addidi, quantum sufficiebat ad impertiendum liquori saporem acrem, ardentem. Liquorem hora octava matutina injeci, comprimens urethram manu altera sub frenulo, eum supra locum, quo sedes esse blennorrhagiae solet.

Hoc ipso tempore, quo urethram intus attingebat liquor, dolorem sensi adeo intolerabilem, ut ultra horae minutum secundum retinere illum nequirem, sed retrahens actutum cannulam effluere sivi. Verum utut dolor fuerat acerrimus per octavam horae partem, decrevi periculum alterum facere: quo facto tantus excitatus est dolor, ut cannulam retrahere coactus sim. Mox magnum sensi desiderium mingendi: cum autem ante factum periculum studio minxeram, desiderium repressi. In lectulum recubui rei eventum expectans. Dolor erat tantus, vix ut artus primam horam movere possem. Deinde legendo me delectavi, coenavi ea, qua solebam hora; verum tempestive lectum petii. Tunc primum urinam excernere coactus, ubi haec ad eum venisset locum, quo haeserat liquor, dolorem sensi atrocem quidem, nec tamen adeo atque expectaveram.

Mane post somnum quietum examinans membrum, materiem vidi puriformem ejectam viridem, qualis est a blennorrhagia virulenta; dolor sub urinarum excretionem increverat ac nocte altera somnum turbaverunt erectiones involuntariae et dolentes. Proximo mane copiosior evacuatus humor

magisque viridis ac dolor tam acerbus, ut lenire ipsum injectione oleosa debuerim. Verum novus timor, propter novam phlogosin loco altiore urethrae, quo nullus pertinuerat humor: exinde copiosum profluvium eademque symptomata post sex demum dies mitigata. Neque hic res substitit, sed tertia exorta est inflammatio, quae ipsum vesicae collum videbatur attingere. Tunc quidem vehementer commotus sum, intelligens scilicet ab una parte urethrae ad alteram delatum morbum ac metuens vesicae phlegmasiam plenam periculi. Itaque per octiduum inter spem ac metum dubius animus, tandem decrescentibus sensim inflammatione et profluvio, ab omni symptomate harum trium phlegmasiarum sexta exacta hebdomade magno cum gaudio meo liberatus sum."

Ne igitur omnem blennorrhagiam habeamus ac dicamus syphiliticam hac periclitatione docemur. An autem nulla nota altera ab altera discerni poterit? Adfirmant HUNTERUS, LAGNEAU, negat RICHORD. Illi exempla proferunt natae ex blennorrhagia syphilidis, proferunt etiam alii: de quibus cunctis hortandi estis, ne credatis syphilidem fuisse morbum, levi negotio sublatum, aut nulla latuisse ulcuscula sive in urethra, sive in vagina feminarum, quarum haec sola per speculum investigatione detegi possent. Quamobrem dubitamus blennorrhagiam ad symptomata virulenta referre ejusque curationem principio esse debere antiphlogis-



ticam contendimus, quo pertinent suspensoria, fomentationes, lotiones, cataplasmata emollientia, quies, abstinencia ab omni acri cibo et potu, emulsiones, lotiones alvi cact., neque prius alia requiri, quam manifestae fuerint syphilidis praesentis notae: natis scilicet ulcusculis aliisque affectionibus cachexiae venereae.

Blennorrhagiae superest blennorrhoea, quae ab illa distat, ut catarrhus acutus a chronico aliamque vel stimulantem magis, vel tonicam medicationem requirit: quorsum referunt balsamica, piperina exque iis praesertim balsam. copaivae et piper cubeba, nuper celebratum.

Ea vero priusquam adhibeatis, ne omittite perquirere, utrum irritationis ac phlegmasiae omnino desierint symptomata, an vero coitu petulantiore profluvium suscitetur, aut subsit strictura urethrae, discrimen indicante medico percelebri LAGNEAU, memores eorum, quae de catarrho chronico deque blennorrhoeis supra a nobis animadversa sunt neque imitemini empiricos indiscriminatim sua specifica praescribentes.

Iis autem siquando utamini puris optimaque utamini notae. Id quod de copaivae balsamo hoc nobis exemplo persuasit is, quem dixi, auctor gravissimus. Complures milites invalidi veterani diu et incassum ad blennorrhoeam cohibendam usi erant copaivae balsamo ex supellectile pharmaceutica ejus, quo curabantur, Nosocomii. Forte for-

tuna idem remedium recens advectum ex India  
iis datum est idque dosi modica: atque ecce pau-  
cos intra dies prorsus convaluerunt.

Piper cubeba sive caudatum ab Anglis praeser-  
tim adhibetur. Francis minus acceptum est ab eo-  
que urinae vias irritatas ipsamque vesicam, fau-  
ces, ventriculum, intestina testatur LAGNEAU, quam  
irritationem ipse sedare, omisso hoc medicamine  
coactus est: vidisse etiam crebro fluxum blennor-  
rhagicum reverti idque saepius licet continuata  
eadem medicatione: unde effici arbitratur, pluri-  
bus opus esse experimentis, ut eam fidem merea-  
tur piper istud, quam ei nonnullis medicis practi-  
cis tribuere placuit.

Magis huic remedio favet RICORD, monetque es-  
se plures casus ubi juvat, altero remedio frustra-  
neo: saepe alternatim ipsis utendum, saepe con-  
iunctim.

Vos autem, qui fortunatam vobis optatis artem,  
ne nimium specificis credatis, verum ad therapeu-  
ticen universalem adcommodeis curandi metho-  
dum, quaeso.

Ulcuscula venerea primaria, caneros vocant,  
quorum genesin bene interpretatus est HUNTERUS,  
quorumque characteres rite exposuit RICORD, re-  
spectu sedis differunt. Vel in glande sub praepu-  
tio in ipsoque praeputio, urethra, vagina, vel in  
ore, faucibus, palato aliisque partibus cernuntur.  
Nempe adficit virus venereum praesertim cryptas

et membranas mucosas: genitalia, nasum, fauces. Nec tuto negliguntur haec ulcera, siquidem ubicunque adsunt, ibi resorbto pure, nisi jam facta sit, instat saltem universi corporis infectio.

Quocirca perquiramus, quibus notis discerni possint ac quo pacto caveri, quominus ex topico vitio generalis cachexia oriatur.

Ulcuscula venerea primaria sive cancos virulentos hisce dignoscite characteribus. (Cf. RICORD lib. I.) Sunt profunda, fundo lardaceo, marginibus exstantibus, duris, annulo rubro, fusco, violaceo. Ejusmodi ulceris sive canceri virulenti adspexit, post veteres, quorum meminit RAYERUS, descripsit HUNTERUS, idque eapropter *cancrum classicum Hunterianum* adpellaverunt. Hujus pure, tanquam vehiculo virus venereum continetur, quod ut deleatur ac quominus absorbtum syphilidem creari universalem possit, cauteriode nitrate argenti destrui ulcus, mali fomitem quantoeyus jubet RICORD miraturque cur dum virus viperæ aut canis rabidi hoc pacto figunt et inhibent refraenantque, virus canceri syphiliticum, illorum tot nominibus simile, suscipi corpore permittant: cum primis quinque diebus aut serius etiam, quamdiu symptomata secundaria desint, malum topicum sit, quod topica curatione possit abstergi atque sanari. Hanc methodum rejicit LAGNEAU: quia non tollit infectionem jam ante ulcus existentem, quia saepe bubones glandularum vicinarum ipsam sequuntur, quia ulcere

cicatrice clauso male securus aeger negligit curationem prophylacticam symptomatum secundariorum, quae talis praxis debet provocare. Fateor, me harum rationum vim non satis capere, praesertim cum videam ipsum auctorem hac methodo usum esse, urgente necessitate et usum esse fortunato eventu, quemadmodum hoc exemplo docemur. » Dux militum in bellum profecturus ex coitu impuro in glande duos caneros patitur: praevidens nullum locum fore curationi syphilidis legitimae, viro curam topicam iterato roganti cedo haecque ulcera nitrate argenti tango simul praecipiens, quid ei in posterum esset metuendum. Cancris cito cicatricibus ductis sanati et aeger bellum gessit absque ullo incommodo atque ex bello redux me auctore curatione methodica praevertit sequelas infectionis generalis."

Quis credet, virus non deletum in corpore latuisse nullaue inter medios militiae labores ac vicissitudines sui praebuisse indicia, ut occulti veneni opus fuerit expulsionem; nec potius convictus est, ipsa cauterisatione et morbum et morbi fomitem fuisse destructum?

Cancris SWEDIAUR mercurii externo pariter internoque usu, LAGNEAU interno praesertim, novae scholae alumni hirudinibus ac lenienti medicina medentur: cunctis suae methodi experientiam testem invocantibus.

Quod ita interpretari decet, ut quemyis curan-

di modum suo ponatis loco et tempore, in aliis ubi magna irritatio est, antiphlogisticam curationem, in aliis ubi cachexia venerea corpus tenuerit, mercurii praestantem virtutem, in aliis ubi nondum absorbtum est virus causticam nitratis argenti potentiam adhibentibus, quod facientes consilio rem geretis atque ab omnibus proficietis plurimum.

Epididymidum et testium post blennorrhagiam tumores partim huic mala arte suppressae, partim nimio motui, refrigerio atque erroribus in victu tribuunt. Tumor iste epididymidum vix initio, plerumque contra sub finem blennorrhagiae ac declinante inflammatione exoritur. Sentitur dolor inguinis, tumet funiculus, rubet scrotum tandemque ipse testiculus inflammatur atque ab irritatione universali febris accenditur gravis.

Originem et curationem hujus tumoris in semet ipse observavit descripsitque laudatus saepius SWEDIAUR. » Anno aetatis 25. blennorrhagiam patiebar syphiliticam, quam in corpore tenero et irritabili symptomata gravia comitabantur. Adii medicum aliquem tunc temporis principem, qui me jussit potiones mucilagineas copiosas sumere atque bis quavis hebdomade pilulas catharticas de muriate mercurii inprimis factas. Eventus hujus curandi methodi fuit, ut post alteram harum pilularum dosin testiculo venereo affectus sim. Sensi, ab ipso initio morbi mei symptomata observans,

aegritudinem, tensionem ac dolorem obscurum per omnem funiculum spermaticum dextrum ad scrotum usque: eaeque partes tuebant et dolebant ad tactum. Decumbere coactus proximo mane locum affectum examinans mirabar, testiculum integrum esse, nec dolere: epididymidem vero maxime duram esse ac tumidam; tumere etiam funiculum spermaticum cum sensu doloris obtusi tensionisque ac ponderis. Re cum pluribus medicis, qui me inviserent, communicata, hi errare me credebant, verum facto examine, compertum oculis habuere, quod dixeram. Omnes tum rei novitatem mirati sunt. Consilio medici scroto admovi cataplasmata emollientia, calida, plures dies continuos, crescente semper malo ac decrescente profluvio: testiculus durus ac tumens, dolor urethrae, praecipue inter mingendum, acutus. Quapropter amovi cataplasmata, adposui suspensorium ad minuendam tensionem dolorosam atque ad profluvium revocandum genitalibus bis terve de die admovi vapores aquae calidae. Haec auxilia fortunatum habuerunt eventum; altero jam die profluvium auctum; inde promptum levamen et paucos post dies morbus testis et funiculi delituit atque post paucas iterum septimanas blennorrhagia ipsa prorsus sanata est. Haec observatio deinceps crebro repetita legis vim auctoritatemque nacta est."

A morbo diu superest durus epididymidis tu-

mor (\*); deinceps tamen sponte delitescens.

Futurum praeverti potest hoc malum cavendo ab omni caussa irritante ex refrigerio, motu, injectione, catharticis, balsamicis et vitando tensionem funis spermatici per suspensorium. Praesens curabitur sedando, revocando blennorrhagiam per balneum vaporis et cataplasmata emollientia non scroto, sed peni circumponenda: atque ubi ipse testiculus jam tumuerit, sanguinis depletione sive generali, si febricitet aeger, seu topica; fomentis frigidis repellentibus: facta jam testium induratione, pluribus incassum propinatis remediis ita dictis resolventibus, blennorrhagiae inoculatione sibi feliciter sanationem successisse testatur SWEDIAUR. Huic methodo minus favet LAGNEAU, quam tamen interdum juvare opinatur, postquam irritationis symptomata disparuerunt per curationem mercurialem. Negat RICORD, blennorrhagiam plane cessare, existente epididymitide, ac licet copiosior fiat, hac inflammatione remittente, blennorrhagiam tamen arte suscitata nullam vim habere epididymitidem mitigandi, pariter negat: ideoque antiphlogisticam curam, tumoris compressionem, suppressionem denique profluvii commendat.

---

(\*) Ad quem curandum laudat LAGNEAU inunctiones ex unguent. Neapolit. hydroiodat. potass. protoiodur., aut deutoiodur. mercurii, empl. mercur. gummos. linim. volat. (pag. 47. l. l.)

En medicorum celeberrimorum sententias contrarias, quas observationum historiarumque, quibus nitantur, accuratior notitia componere sola poterit: quare dolemus, eas non adjecisse **RICORDUM**. Ex blennorrhagiae sequelis etiam sunt ophthalmia et cophosis blennorrhagica. Alteram observavit tempore hyberno ex refrigerio **SWEDIAUR** ejusque exemplum protulit hocce: Centurio vir juvenis dum gravem patiebatur blennorrhagiam, tempestate frigidissima aëri totum diem ac vesperam expositus nocte media utrumque oculum graviter dolentem habuit, ut lucem ferre nequiret: successit altero die profluvium purulentum, albuginea admodum rubente ac turgente. Medicum ad eum mittunt eheu! ignarum, qui vulgaria praescribit remedia, sanguinis depletiones, una cum fomento cicutae.

Tertio die re accuratius perquisita, corneam vident obscuratam et hypopyon factum, sine ulla exulceratione.

Denuo cicuta, sed incassum praescripta. Duodecimo die sedata phlogosi, desinente fluxu, nec cornea pelluciditatem, nec aeger visum recuperavit. Medici in consilium vocati neque corneam incidere, nec profluvium urethrae restituere tentarunt: quae tamen non neglectis evacuationibus, praecipua sunt mitigandae hujus ophthalmiae auxilia."

Altera ejusdem originis oculorum inflammatio; psorophthalmia est, pariterque exemplo ab eodem



auctore illustratur, quod cognoscatur, dignissimo.  
» Juvenis Londini ophthalmiae ejusmodi caussa  
auxilium imploravit meum. Postquam optimis usus  
erat, quae cognoveram, remediis et internis et  
externis, abiit: neque quicquam amplius de eo au-  
divi, per duos menses, cum me adiens consulens-  
que blennorrhagiae syphiliticae caussa narravit, se  
plures praticos convenisse, nec tamen eorum  
praescriptionibus plus profecisse, quam meis: octo  
abhinc diebus blennorrhagiam passum sensisse sibi  
oculos levare, qua ophthalmia indies decrescente  
jam perfecte hoc morbo liberatum esse. Tum ego  
ex eo quaerens, an nunquam antea ex blennorrha-  
gia aegrotavisset, accepi, ante primam consulta-  
tionem de morbo oculorum se ejusmodi profluvio  
multum fuisse cruciatum, nec tamen ad me rem  
retulisse, quoniam nullum esse nexum credebat  
inter gonorrhoeam et recens malum oculorum.  
Quamobrem in ejusmodi casibus blennorrhagiae  
inoculationem suadet SWEDIAUR hocque consilium  
altero lanionis exemplo confirmat. Contrariam sen-  
tentiam tuetur RICORD, post sanguinis depletiones  
levem cauterisationem adhibens inque chemosi ex-  
cisionem: monens, numquam blennorrhagiam ex  
genitalibus sub hac ophthalmia prorsus esse co-  
hibitam: cujus quidem auctoritate quomodo fa-  
ctae relataeque observationes infirmari possint,  
non video. Cophoseos blennorrhagicae curationem  
mercurio perfecit SWEDIAUR: otorrhoeae ejusdem

originis blennorrhagiae inoculatione perficiendam esse idem auctor opinatur. Phimoses, praeputium tumente et constricto, paraphimoses eodem retro glandem retracto, ubi notabilis inflammatio, depletione topica, fomentis, cataplasmatibus emollientibus, injectionibus, subinde incisione, actu frigidis, repellentibus curandas docuere quos citavi de lue venerea auctores.

Superest bubo syphiliticus, qui vel primarius esse, vel secundarius, vel sympathicus, vel tonicus, vel atonicus dicitur. Bubonem idiopathicum nasci posse non tantum propter virus absorbentum, ex ulcere syphilitico genitalium, verum ex alio alius partis cujuscunque celeb. SWEDIAUR suo ipse exemplo probavit, ex veteris philosophi praecepto, eos morbos expertus ipse, quibus in aliis mederi cupiebat. Nempe ulcus syphiliticum glandis secuta est efflorescentia syphilitica cubiti, hanc axillae tumor: tumorem dolor sterni, hunc dolor pedis huncque tumor inguinis: quem bubonem omniaque mala migrantia frictiones mercuriales abstulerunt.

Bubones sympathicos ex absorbentium lymphaticorum vicinorum irritatione, hac sublata, sponte discuti solere, notandum est aliosque sine ulcere aut excoriatione ex absorptione directa provenire, post coitum impurum testantur SWEDIAUR, LAGNEAU, RICORD. Bubonum curatio per frictiones mercuriales secundum vasorum lymphaticorum de-

cursum a MASCAGNO indagatum quomodo fieri debeat, illo auctore discite. De horum tamen curatione quantopere dissentiant viri docti, si cognoscere velitis, comparate hujus praecepta cum praeceptis RICORDI ac reputate, quemadmodum recte praeceperat LAGNEAU, varia eorum genera discernens, non omnes eodem tractandos esse genere medicinae.

Atque hae praecipuae affectiones sunt et symptomata morbi syphilitici incipientis, quae sicubi bene ac prudenter a medico perito aegroque docili curentur, haud infaustam habent prognosin: sin contra negligantur maleque tractentur sive medici culpa, sive aegri, cachexia corporis generatur numerosa mala proferens, interdum difficulter sananda, nec tantum aegro vitam reddens calamitosam, vix vitalem, verum in seram usque progeniem subinde propagata et plurimarum aegritudinum fons ac principium.

Syphilidis confirmatae nomine intelligunt cachexiam propriam, ex viru syphilitico natam, cujus signa sunt primaria: ulcera oris, faucium, nasi, cutis vitia varia, ossium morbi, tandem in cariem transeuntes.

Nimirum post affecta primum genitalia, quae affectiones indubia haud raro relinquunt pristini mali vestigia, primo partes molliores aegrotant, inde duriores ipsaque ossa, ut lues sibi relicta oeconomiae singulos adparatus petat: post absorb-

tionem primo lymphatica, unde bubones; tum mucosas membranas, quo ulcera nasi, oris, faucium referte; porro cutem et cutis accessoria organa: hinc morbi cutanei, tubercula, vegetationes, ulcera, pilorum, unguium laesiones: tandem contextum osseum et fibrosum, quo tumores ossium, periostotes, exostoses, tophi attinent. Nec tamen semper tam regularis est morbi decursus, ut neque haec sine exceptione sit regula ossiumque tumores continuo symptomata primitiva sequantur. Verum talis decursus anomalus prorsus atque animum si advertas, ita RICORD, raro deprehendes, periostoses, exostoses, tubercula, nullo symptomate secundario intermedio, ex canceris nata.

Is optime tres symptomatum ordines distinxit. Primi ordinis sunt: cancri, bubones; secundi ad syphilidem universalem pertinentia: syphilides, ulcera secundaria, iritis syphilitica, testiculus veneris, alopecia; ordinis tertii tubercula, dolores osteocopi, periostitis, ostitis, tumores ossium, nodi. Ad symptomata non virulenta denique retulit: blennorrhagiam, phimosis, paraphimosis.

Ulcerata secundaria primariis multum similia sunt. A mercurialibus differunt, quod magis profunda; bene circumscripta, rubore erysipelaceo, magisque solitaria, coloris sordide grisei. A scorbuticis distant: sede, forma, fundo, colore. Ulcerum haec discrimina perscripsit in tabula diagnostica celeb. LAGNEAU. Cutis exanthemata ad radicem pilorum,

in fronte, temporibus, mento, ad barbam efflorescere jam pridem credebantur, universe ad partem capillatam corporis, sive macularum flavarum cuprearum, sive crustarum siccarum foedarum forma prodeuntes.

De quo tamen colore cupreo monet RICORD, eum nonnisi tarde adparere inque talibus maculis post sanationem manifestum esse.

Tenendum autem, ingentem esse et formarum et colorum in syphilidibus istis discrepantiam.

Nam tum exanthematum, tum bullarum, vesicularum, pustularum, papularum, macularum sub specie proveniunt sique ordinem quaeratis quo frequentiores, sive rariores, ita ponantur oportet: tubercula, squamae, papulae, exanthemata, pustulae, maculae, bullae, vesiculae (\*) teste RAYERO (II. pag. 372. l. l.). Colorum autem varietates si cognoscere aveatis, inspicite quaeso egregias icones XVI — XIX. Rayerianas, quae oculis subjiciunt fidelibus, quae segnius irritarent animos demissa per aures.

Fissurae, rhagades in labiis, ad manuum volas et plantas pedum suboriuntur siccae, callosae, durae. Dolores osteocopi etiamsi plerumque noctu post primum brevemque somnum atrocius saeviant, cui signo plurimum confidit LAGNEAU; subinde tamen

---

(\*) Scabiem venercam esse negat RICORD.

hoc tempore augeri non observantur. Dolores isti in cranio, artubus, radio, ulna, tibia, fibula potissimum sentiuntur, ubi nuda cuti subjacent ossa et in his quoque locis, tum etiam in clavicula et sterno topi venerei conspici solent. Prima mali sedes ab aliis in ossibus, ab aliis rectius forsitan in membrana ponitur medullari (\*) idque perperam a recentioribus hydrargyro imputatur: siquidem teste RICORDO, etiam absque mercurio virus ossa laeserit. Haec deinde carie exeduntur (†) unde miseri illi palato osseo, aut naso or-

---

(\*) Omnibus forsitan recte sentientibus, ut in singulis prima sedes differat: quemadmodum docere videntur, quae in speciminibus anatomicis observantur cf. *Mus. Anat. Lugd. Bat.* Tom. IV.

(†) Quae in vocis organa cadens phthisin creat laryngeam, quale exemplum commemorat ALIBERT *Nouv. Élém. de Thérapeut. et de Mat. Médic. Proleg.* pag. 17. Quempiam novi, scribens, qui diu expertus erat maxime manifesta phthiseos laryngeae symptomata. Se morti proximae consecratum credebat. Implorabat opem medici, cujus sagacitas summa in ipso dignovit quasvis infectionis syphiliticae notas, nec haesitavit, ei praescribere doses legitimas mercur. sublim. corros. cujus administratio methodica prosperum omnino successum habuit.

Caries ossium venerea egregie descripta ac pulcre accurateque tabulis eximiis illustrata in *Museo Anat. Lugd. Bat.* Tcm. IV. monstrat ossa tuberosa, ponderosa, vegetationibus characteristicis notabilia ac crebro ex medullari ossium parte profecta videtur. In hac, inquit clarissimus Musei in-

bantur, nec raro hectici pereunt. Interim vox rauca fit, aut nasalis, quibusdam ungues cadunt ac defluunt capilli (alopecia syphilitica) trahuntque vitam, omnium miseriarum plenissimam, quemadmodum vere cecinit FRACASTORIUS:

*» Iis nulla quies aderat, sopor omnis in auras  
Fugerat: iis oriens ingrata Aurora rubebat.  
Iis inimica dies inimicaque noctis imago.  
Nulla Ceres illos, Bacchi non ulla juvabant  
Munera: non dulces epulae: non copia rerum:  
Non urbis, non ruris opes, non ulla voluptas."*

Ad symptomata tertii ordinis, ita RICORDUS, etiam revocari potest ingens morborum male definitorum incertaeque omnino diagnoseos cohors: qui casus

---

terpres, substantia admodum est rara, porosa, partim in spinas, partim in squamulas degenerata, dum ubique manifesta sunt indicia consumptionis ossis et contra aliis in locis species vegetationis osseae rursus observantur: unde squamulae vel lamellae, novae secretionis osseae producta, superficiem tegentes, sed a cariiosa parte separatae, interdum vero inter cariiosa foramina productae: alioque loco ex vegetatione illa peculiari ossea spinulis, tuberculis, vel squamulis externa ossis superficies obtegi dicitur: quae rotundatae alibi reperiuntur; alibi substantia ossea valde inaequabilis, sinuosa, porosa et aspera, una cum spinis longissimis: ex qua graphica descriptione atque egregiarum tabularum contemplatione cum ipsis speciminibus comparata exactam vobis comparabitur huius cachexiae ossium notitiam.

obscuri, donec perfecte nobis sint cogniti, contenti simus MERCURIALIS praecepto: cum videritis morbum quempiam communibus remediis non curari, putate esse morbum Gallicum cognominatum. Quod quidem praeceptum, utut tantis auctoritatibus commendatum, mihi magis vulgarem empiricorum, quam medicorum liberalium artem decere videtur.

Caussam syphilidis contagiosam esse, multi sunt qui nuper negarunt, praesertim inter Franciae medicos, sive ita jubente cui adhaerebant doctrina, sive neglecta morborum genitalium accurata distinctione, seu minus bene intellecta aetiologia pathologica. Incredulis illis experimentorum copia respondit eximius naturae interpretes RICORD, indicans cancerum Hunterianum tanquam contagii fomitem atque inoculatione plurima hanc suam probans sententiam. Contenderat scilicet novae doctrinae auctor syphilidi, quae aliis morbis, subesse irritationem, sede tantum ac gradu discrepantem nihilque aliud medicinae physiologicae faciendum esse, quam ut hanc irritationem rite temperet.

Convictus, inquit RICORD, ibi non esse positas columnas Herculis mihi quae aliud impositum esse munus, laborem suscepi, cujus eventum traditurus sum.

Itaque inoculando pus ex ulcere syphilitico vigente alia aliis locis ulcera syphilitica procreavit, omnibus notis ei similia, unde pus ductum erat.



Atque hoc modo criterium indagavit, quo possit tum symptoma syphiliticum a non syphilitico discerni, tum morbi genesis ac progressio explicari, tum aliorum dijudicari observatio. Atque primum blennorrhagia virulenta non est, quamdiu nullo ulcere venereo stipetur: etiam ulcera blennorrhagica a veris canceris differunt, neque bubonis pus aut epididymitidis neque canceri ipsius humor secretus tempore sanationis contagiosus est.

Inoculari denique cum fructu nequit pus ex morbo quodam syphilitico secundi ordinis, aut ubicunque praeter syphilidem universalem nulla sit primariae contagionis sequela.

Ad hanc normam exigentes aliorum auctorum observationes dijudicari illae poterunt: cujus censurae specimina aliquot edidit RICORD.

Ut igitur lues contrahatur, pus ex ulcere syphilitico admoveatur corpori necesse est, tanquam contagionis venereae vehiculum, sive per lactationem, aut quaecunque contrectationem, sive per coitum; hujus modi exempla nimis abundant, illius per lactationem etiam non desunt, sive miseri infantes ubera sugent ulcusculis venereis infecta, seu sana nutrix infanti syphilitico ubera praebeat.

Ex hac theoria quo pacto infantes nascentur lue venerea infecti, explicuit SWIETENIUS. » Si ulcera, inquit, in pudendis muliebribus adsint et infans diu haeserit, capite v. g. inclavato, vel alio cor-

poris membro in partu praeternaturali prodeunte ; alluitur tabo venereo contagioso , qui et obstetrices inficere poterit , uti certa observata docuerunt."

De altero modo per lactationem hanc profert idem observationem ex *Medic. Essays et Observat.* Tom. III. pag. 323 sqq.

» Mulier quaedam solita sugendo evacuare puerperarum mammas , ulcus venereum habebat in ore , quod celabat , ne quotidiani lucri jacturam faceret : unde plures et quidem melioris sortis matronas infecit pessime. Egregius medicus BARRY , qui opportunitatem habuit videndi plurimas ex infectis his , mirabatur celerem malignae luis progressum , quem sic describit : papillae primo leviter inflammabantur , dein sequebatur excoriatio plorans liquidum tenue ; in circuitu loci excoriati sparsim emergebant pustulae rubrae , quae et gradatim per pectus dispergebantur et nisi medela adhiberetur , ulcera producebant. Paulo post inficiebantur pudenda cum pruritu vehementi , sequebantur cancri in his partibus , qui parum liquidi plorabant et post paucum temporis spatium pustulae spargebantur per totum corpus. In plerisque lues sic suscepta trium mensium spatio decursum suum absoluebat. Mariti ab uxoribus inficiebantur et canculos habebant , a quibus virus venereum cito dispergebatur , ita ut sequerentur ulcera oris interni et pustulae per corporis habitum. Mulier haec , quae tot malorum causa fuit , dum examinabatur ,

Inventum fuit parvum ulcus in radice linguae et larga recens cicatrix in parte interna labii inferioris. Negabat quidem pertinaciter, ulcus unquam adfuisse in loco cicatricis, sed postea veritatem confessa dixit, sed dissimulasse foedum malum ob metum infamiae et lucri jacturam. Quantum potuit sollicito examine cognoscere medicus, in hac muliere nulla eruptio cutanea adfuit, nec videbatur virus venereum unquam limites oris interni excessisse. Quaedam matronae, quarum ubera duxerat, nullum damnum inde senserunt; sed causa hujus felicitatis inveniebatur, quod hoc contigerit, postquam largum illud labii inferioris ulcus consolidatum jam fuerat. Infantes, qui infectarum matrum lac hauserant, inficiebantur pariter et maxima pars illorum periit. Adeo autem celer erat luis per lactationem susceptae decursus, ut salivatione obicem ponere debuerit medicus ilico, etiam in talibus, quae leviter tantum infectae videbantur. Vidi ipse, sic pergit, miserum puellum lue correptum, qui intra tres septimanas periit, dum sanissimae nutrici substituebatur alia, cujus palatum osseum foedo ulcere venereo fuit exesum totum."

Intelligitis, quanta medico opus sit cautione in nutricis examine, quae non tantum ipsa examinanda, verum etiam nutricis infans. Nam hic quoque oculis major, quam auribus fides habenda: quippe fallax gens nutricum est.

Circa alios propagandi modos notandum est, non omnibus aegrotantium narratiunculis credendum esse. Etenim praecipue coitu propagatur malum: idque eo facilius, quo major est ejusdem suscipiendi occasio, quo magis oestro venereo turgeant quoque teneriori ac sensiliori epithelio tegantur genitalia. Nempe partes tenui tectae cuticula: labia, os internum, genitalia, glans in viris, vulva in feminis praesertim contagio patent. Quod autem nonnulli homines aliis et crebrius et gravius hujus flagitii poenas luant, illud potissimum ab irritabilitate et corporis universi et genitalium repeti debet.

Videntur etiam exempla complura suadere, magnam hoc respectu esse vim consuetudinis: siquidem peregrinae mulieres magis, quam familiares viris, qui iiscum rem habeant, obsint.

DESUELLES compluribus exemplis hanc vim consuetudinis demonstrat (Tom. I. pag. 142 sqq.) ei que adsentitur RICORD; quam si teneamus, cur venere volgivaga sibi noceant adeo scortatores, cur meretrices, concubinae, adulterae novis amatoribus crebrius, quam priscis malam prolem pariant, explicari commode poterit.

In hoc morbo curando natura parum, ars plurimum valet. Neglectus aut male tractatus immedicabilis fieri solet. Nam licet quaedam exempla ferantur luis inveteratae, laboribus duris, parco victu, tenuissima diaeta curatae, hae rarae sunt aves in terris eosque potissimum casus spectant,

qui mercurio fuerant rebelles et nisi severo exactoque servato regimine, non potuissent sanari: qualem diaetam his celebrat versibus FRACASTORIUS.

*» Vidi ego saepe malum, qui jam sudoribus omne  
Finisset sylvisque luem liquisset in altis.*

*Sed nec turpe puta, dextram summittere aratro,  
Et longum trahere incurvo sub vomere sulcum  
Et valida aeriam quercum exturbare bipenni  
Atque imis altum eruere a radicibus ornum;*

Deque victu:

— — *» Tibi pinguis anas, tibi crudior anser  
Vitetur potiusque vigil Capitolia servet.*

*Viteturque gravi coturnix tarda sagina.*

*Tu leneros lactes, tu pandae abdomina porcae;  
Porcae heu! terga fuge et lumbis ne vescere aprinis,  
Venatu quamvis toties confeceris apros.*

Haec aliaque auctorum testimonia LEONIS AFRICANI, GONSALVI FERNANDES, ANTONII MUSAE BRASSAVOLI, FALLOPII, excitans SWIETENIUS." Vidi ipse (sic pergit) memorabilem casum, qui me docuit, quid constans aegri animus, cum victu penitus macilentum ac validiorum laborum tolerantia efficere possit in lue venerea inveterata et vix non desperata.

Nobilis juvenis a me petebat consilium, qui in calamitosissimo statu versabatur. Quater salivationem mercurialem subiverat, semper postea repullulante lue venerea, quae sanata credebatur.

Ter tentata fuerat cura per decoctum Guajaci; nec meliori successu. Gerebat in sterno ac claviculis tumores, in fronte similem unicum; cutis in variis locis maculis foeda erat et dolores nocturnos ossium patiebatur. Omnium rerum inops cum esset, nemo recipere illum volebat, aut curam ejus gerere. Universa familia detestabatur miserum. Fatebatur se non semel cogitasse, ut violenta morte miseriarum finem quaereret. Moerentem animum erexi, lenimen malorum promittens, dum integram curam spondere non audebam in morbo adeo inveterato. Fidem dabat, se omnia tentare velle et posse etiam durissima, modo aliqua sanationis spes affulgeret. Cum satis robusta esset corporis compages et adesset aetatis vigor, rustica veste indutum hominem elocavi agricolae, ut absque ulla duri laboris mercede famulum ageret, solo victu contentus et vili quidem. Praeter panem enim alebatur dauci et pastinacae radicibus, solani esculenti tuberibus, pomis, pyris, hordeo, avena in sola aqua coctis et similibus. Potus erat lactis ebutyrati serum acidulum, tenuissimum. Mensis Aprilis initio incepit hoc vitae genus et duros ruris labores constantissime tulit usque ad mensis Octobris initium, quando me accessit sanus.

Toto hoc tempore a carnibus, piscibus, ovis, lacte, butyro, caseo abstinuit severissime. Vidi illum post aliquot annos in foecundo conjugio vi-

ventem et formosa sanaque prole beatum (\*)

Mirum certe exemplum, quod docet, venereum contagium posse elui ex locis corporis, quibus pertinaciter haerebat et expelli per sudores, validis laboribus in aëre calido excitatos, dum simul diaeta macilentissima servabatur et copiosus liquidi solventis potus sudori aptum vehiculum praebebat. Rari tamen sunt, qui possent, rariores, qui velent constanti animo hanc curandi methodum tolerare."

Nimirum nulla est medicinae pars magis taediosa, quam curatio syphiliticorum. Non tantum quia empiricis temerariis majorem fidem habent, quam medicis prudentibus, verum etiam, quia his raro obtingunt aegri praeceptis obtemperantes. Nam qui sibi imperare nequeunt, quomodo medici imperium ferent. Gonorrhoeas quasi leve malum spernunt, immo de iis tanquam praeclaris victoriis aut vulneribus in pulcro certamine acceptis exsultant. Praeterea in humidis nostris frigidisque regionibus, nisi summa adhibeatur cura, difficulter admodum sanantur hi morbi.

Est igitur medici, vere homines amanti haec omnia aegris praecipere eosque monere, ut diaetam observent ipsis praescriptam, sine qua ne vel

---

(\*) En effectum curationis per inediam, quam recentiori tempore quoque Germaniae medici praedicaverunt!

ab optimis remediis boni aliquid, aut salutaris spectandum est aut expectandum.

Omniū ad syphilidem curandam remediorum efficax maxime et palmarium est hydrargyrum, siue mercurius, cujus ut virtus manifesta est, sic agendi ratio latet, quam alii a proprio stimulo, quo febris concitaretur et criticae evacuationes duxerunt, alii ab adfinitate inter mercurium et virus venereum, qua ille hujus virulentiam domaret, alii ab oxygenio, aut acidis mercurio additis.

Ingens est mercurialium in praxi adhibitorum diversitas. Alia sunt oxyda leniora, alia sunt acria, salina; afficiunt alia cito glandulas salivales; laeduntur ab aliis facile ventriculus et intestina. Aliorum vires imbecilliora quoque corpora ferunt; aliorum robusta vix tolerant. Quocirca oportet medicum rationalem in singulis casibus delectum facere, neque immerito SWEDIAUR eos, qui eodem semper mercuriali utuntur, empiricorum nomine designat. Nam in hoc remediorum delectu verus artis magister maxime cernitur.

Ex mercurialibus plurimum usitatis sunt ejusdem trituratione paratae oxydationes: mercurius gummosus Plenckii et pilulae ejusdem. Porro mercurius solubilis Hahnemanni, mercurius dulcis, denique mercurius sublimatus corrosivus, qui reliquis longe acrior.

Alia methodo per cutim corpori inducitur mercurius, alia deglutitur. Prior methodus omnium



antiquissima fuit. Est sane efficax; magna tamen cautione instituenda. Nam corpus prius praeparandum leni purgatione alvina et balneo calido pilique radendi sunt. Tum infricatur vespere dr. j. unguenti mercurialis in partibus internis crurum et brachiorum, ubi major absorbentium numerus est idque hyberno tempore prope ignem, per semihoram aut horam integram: deinde pars ipsa probe tegenda est. Quae frictiones primum die interposito (ut num ferant aegrotantes, adparcat) repetuntur, ita tamen ut crebro partes fricandae mutantur, ne nimium irritentur ipsae. Praestat illas fieri ab aegro ipso, quod si propter obesitatem, graviditatem aut imbecillitatem nequeat, ei, qui hoc munere fungitur, cheirotheca manus tegenda est, tum ne sibi ipse infricet unguentum, tum ut exacte dosis unguenti corpori inducta computari possit. Juvat saepe sicca aridaque cuto, balnea tertio quovis die adhibere.

Recenti malo sufficient ut plurimum 30—35. frictiones: inveterato opus erit 50—70; semper tamen aegri corporis ratio habenda et post frictiones cutis abstergenda est. Notandum, ab usu mercurii non debere desisti, quam primum symptomata dispareant; hinc etiam toties recidivae: quare 10. ad minimum, aut 15, aut 20. dies in iis pergendum est.

Cum hisce monitis Cel. SWEDIAUR de frictionibus mercurialibus consentiunt fere ea experient.

**LAGNEAU**, quae conferre, siquidem lubet, poteritis (l. l. pag. 190.)

Ubi vero signa affecti oris, halitus foetidus, gingivae tumentes, intermissio fiat curationis. Nempe haec corporis mercurio saturati signa morbum praenotant mercurialem, quo facto percipitur sapor cupreus in ore, tument gingivae, lingua, fauces, increscit salivae copia, os foetet, tumet caput, turgent omnes salivales glandulae, continuus est salivae foetidissimae fluxus, vacillant dentes ipsaque oriuntur ulcera oris scorbutica. Ita credebant antiquiores, morbi materiem educi huicque ptyalismo critici quid subesse. Male tamen. Nam mercurii effectus est, non morbi. Idcirco jure crudelem hanc per salivationem methodum reliquerunt posterius, quae et incerta maxime et raro si umquam proficua. Praestat igitur mercurio uti, donec prima adpareant salivationis ingruentis indicia tumque aliquamdiu seponere. Salivatio autem ut praecaveatur, cavendum summopere est a refrigerio corpusque probe vestiendum, utendum balneo calido, diaphoreticis, diureticis cum mercurio junctis, interponendum subinde purgans.

Nata jam salivatione, quae non semper averti potest, praescribi solent a medicis eccoprotica, clysmata, balnea, mucilaginea, demulcentia, gargarismata emollientia cum borace, sulphur, sulphureta: interdum camphora, opium; plethoricis diaeta tenuis, antiphlogistica, subinde venaesectio, ubi

subsit phlogosis; debilibus vero, infirmis gargarismata adstringentia: decoct. C. Peruv. Salic. alb. victus nutriens, vinum, aër siccus, rusticanus.

Quorum quaedam salubria, quaedam nocentia, nec pauca inefficacia prorsus habeo, ea praesertim, quae nomine antidotorum mercurii celebrantur. Quamobrem ne nimiam in specificis illis sive chemicis, sive aliis antidotis spem ponite vestram, verum iis, quae emolliunt, quae revellunt, quae derivant majorem fidem habete: itaque gargarismatibus emollientibus, potioni demulcenti, depletionibus topicis, balneis, pediluviiis, purgantibus, vesicatoriis nuchae adponendis, quae efficacissima expertus est LAGNEAU; neque adstringentibus utimini, nisi post remittentem manifesto, quam mercurius concitaverat, irritationem.

Mercurialia, sive extus, sive intus adhibita anni tempori, aegro, morbi stadio, gradui, symptomatibus adcommodanda.

Etiamsi omni tempore, quum opus sit, lues curari queat, optimum tamen anni tempus in nostris regionibus ver est et aestas prima. Sensibili aegro respondent formulae Plenckii, mercurius Hahnemannii, additis mucilagineis, anodynis, opiatis: torpidiori vero minusque mobili, aut ipsis ossibus vitiat, mercurius sublimatus corrosivus, cujus percelebris est SWIETENII formula, qua spir. frumenti solvitur sal illud atque ita propinatur, ut mane et vespere sumatur cochlear,  $\frac{1}{4}$  grani partem

ejusdem solutam habens. Inventi remedii historiam sic narrat SWIETENIUS. v Celeberrimus ASTRUC salivationem statuit ad exterminandum morbum absolute necessariam non esse. Praeterea novimus, foeditatem et molestias salivationis non produci à lue, sed ab argento vivo, etiam sola inunctione corpori adplicato. Sanissimi homines, qui unguentis mercurialibus perfricant alios, toties molestissimam salivationem passi fuerunt; uti nimis notum est.

Hinc incepi suspicari primo salivationem non requiri ad luis venereae curam, vel saltem levissimam tantum. Attentus vidi aliquoties de die aegros, quos a lue curabam, contuli cum iis, quae olim observaveram; sicque credidi, me vidisse prima signa in ulceribus venereis, dum argentum vivum corpori ingestum; incipiebat fieri actuosum, licet nullum adhuc signum incipientis salivationis observarem. Videbam enim ulcerum fundum humescere, sordes vacillare, vicinae cutis colorem emendari. Conabar tunc hunc statum praesentem conservare diutius, non urgendo salivationem repetitis mercurii dosibus, sed procrastinando potius; nulla tamen dabam purgantia: incipiebant dolores nocturni mitescere; bubones minuebantur mole. Hoc successu incitatus, coepi cogitare de alio remedio mercuriali, quod quidem magnae foret efficaciae, sed tamen posset dilui pro lubitu adeoque vel in minutissima dosi tentari.

Dum haec animo volvebam, incidit in mentem tentare vitriolum mercurii sed dilutissimum. Spem animo fovebam, forte efficacissimo tali remedio mercuriali luem curari posse sine salivatione. Non deterrebat me cognita remedii acrimonia. Poteram enim illud aqua solutum diluere pro lubitu. Animum addebant quae apud optimum praeceptorem leguntur. » Sapor hujus vitrioli terribilis austerus. Granum unum aquae uncia dilutum dat remedium cosmeticum prudenter usurpantibus. Si drachma talis misturae syrupo violaceo mitificata potatur, bis terve in die, mira praestat in multis morbis incurabilibus. At prudenter a prudenti medico! Abstine, si methodum nescis! Et sic pergit, narrando adhibuisse primo ad ulcus curandum, deinde lue venerea admovisse simulque accepisse, quod veteranus chirurgus daret mercurium sublimatum in sp. ferment. ex hordeo vel secale parato, par remedium composuisse ex merc. sublim. corros. in larga copia sp. frumenti rectific. idque adhibuisse: sed statim superbibendam libram decocti althaeae vel alterius decocti emollientis, addendo aliquam glycyrrhizae partem ob saporis gratiam. Hoc modo facile tulisse remedium aegros et de nulla re quostos fuisse atque octo annorum spatio curatos fuisse 4880 lue venerea laborantes eodem remedio etc.

Ecce remedii inventi historiam ab ipso inventore relatum! Formula autem quam ipse laudat SWIETE-

nus, sequens est: R. Mercur. sublim. corros. drachmam, spiritus fermentati ex hordeo vel secale parati semel rectificati uncias centum et viginti, cujus dabatur mane ac vespere uncia. Ejus alias formulas minus nauseabundas profert LAGNEAU, non sp. frumenti ventriculum nimium stimulante, verum aqua destillata sive tantillo alcoholis addito, sive sola nullaque miscela paratas: is hac uti solebat:

R. mercur. sublim. corros. gr. viii. aq. destillat.  $\mathfrak{z}$  xxxii. ita ut quaeque uncia liquoris contineat gr.  $\frac{1}{4}$  partem deuto-chlorureti mercurii. Hunc suum liquorem, quem ipse toties salutarem expertus erat SWIETENIUS, princeps esse immo unicum fere, quo in Hospitio Venereorum utantur Parisienses, testatur ejus quondam chirurgus LAGNEAU. Hic iis qui liquorem aegre ferebant, remedium praescribebat pilularum forma, quibus lente in canali cibario solutis, neque solius ventriculi mucosae admotis, hanc minus stimulari existimabat. Tali medicaminis formula (\*) et alios tractavi feliciter et mulierem per plures annos gravissima lue decumbentem, atrocissimis doloribus osteocopis vexa-

---

(\*) Ea, qua vulgo utor haec est:

R. Merc. sublim. corros.

Opii puri  $\mathfrak{ss}$  gr. v—x.

Pulv. g. Arab.  $\mathfrak{ss}$ .

Extr. Glycyrrh.  $\mathfrak{ss}$ .

M. F. pilul. No. XL.

tam: cujus brachia et crura tophis venereis erant quasi oblecta. Ab alio medico diu at incassum adhibita fuerant opiata tanta dosi, ut ventriculus tandem plane atonicus fereque paralyticus factus esset. Primo naturam sensim désuescere conatus sum ab opio, tumque sublinatum dedi cum decocto lignorum eo cum eventu, ut post paucos menses (aestivo tempore curam institui) doloribus cessantibus tophisque resolutis, perfecte convalesceret.

Saepe postea vidi hanc feminam, sanitate florentem mihi gratum declarantem animi sensum.

Raro plusquam  $\frac{1}{2}$  grani pars hujus praeparati tuto datur (\*). Caetera mitiora (calomel v. c.) ad gr. j. cum saccharo g. arab. interdum opio, hyoscyamo additis.

Ad pilularum formulam notandum, si diu anteparatae prostent, praecipue de amylo, g. arab., mica panis factae adeo durescere, ut immutatae nec solutae alvo exeant.

Caeterum utramque methodum per frictiones et liquorem Swietenii comparavit LAGNEAU huicque quia minus infida incertaque, minus aegro molesta ac gravis minusque immunda est, primum locum dedit. Rem alibi exemplo ostenderat (pag. 196.)

---

(\*) Majori dosi praescribitur secundum methodum Dzondianam, ultimo curationis tempore: quam ut aliis praeponam, fortunatae artis desidero testimonia.

juvenis, qui per frictiones inciderat in nervorum intemperiem summam, morbo non sublato et cui liquor Swietenii et nervorum turbas sedavit et sanitatem perfecte restituit. Est igitur mercurius sublimatus corrosivus ex optimis ad syphilidem expugnandam auxiliis, nec tamen ut recte ipse, quamvis medici periti arte remedium fieri possit certissimum ac mitissimum, meretur panacea dici mercurialis: siquidem nullum sit mercurialium semper et ubivis efficax pluresque novisse conveniat, ut ab uno ad alterum mutatio fieri possit. Quamobrem non supervacaneum erit notasse, ut reliqui plerique merc. sublimat, sic RICORDUM caeteris praeponere protojodur. mercur. a grano i. facto initio idque forma pilularum, adscendendo subinde ad grana vi.; dedisse autem per totum tempus curationis ad ducenta usque grana: quae remedii requisita dosis, utrum ejus testetur efficacitatem, equidem hoc loco perquirere nec possum, nec volo.

Praeter mercurium propter antisiphiliticam virtutem celebrantur: bardana, china, sarsaparilla, sassafras, guajacum, mezereum: ex quibus componuntur decocta lignorum: quorumque tria priora sunt mitia; quartum magis stimulans aromaticum, ultima acria: acerrimum mezereum, quod non nisi suspensa manu (dr. 1—1β. ad libr. colat.) tuto praescribitur; guajacum denique ULRICI HUTTENI encomiis inclaruit.

Malo plurimum inveterato ac mercurium non



ferente aegro, talibus utendum est decoctis, quorum formulas proposuit SWEDIAUR in *Pharmacop. Syphilit.* operi addita cujusque praestans est decoct. sarsaparillae, quod crebroque summoque cum fructu maloque vetustiori, post mercurialia aut perperam, aut diu nimis data, aegrotantibus praebui. Etenim in praxi non rari sunt casus, in quibus corpora mercurio tanquam supersaturata luis symptomatibus affectibusque non sublatis, tali decocto lignorum perfecte sanata sunt.

Atque hoc loco monitum prudentissimum viri experientissimi RICORD circa usum mercurii vobis tradendum est. Nempe qui ab hoc remedio impetrari cupiat, quod jure expectet, ei praebendum esse dosi legitima eaque aucta, facto non pedetentim, sed magis subito, interpositis aliquot diebus, ab exigua ad validiorem transitu, neque computandam esse copiam remedii exhibiti, verum singulam quamque dosin: ita ut qui centum v. c. grana mercurii sublimati refracta dosi magnoque temporis intervallo sumpserit, minus mercurio saturatus futurus sit, quam qui minori copia, sed dosibus efficacioribus breviori tempore eo sit usus. (pag. 626.)

Vos si scire aveatis tempora singulis curandi methodis opportuniora, audite RICORDUM, de iis hunc in modum disserentem:

Regulam therapeuticam memorare oportet gravissimam. Quo altius in oeconomiae penetralia labes

descenderit propriumque characterem exuerit, eas subiens mutationes, quibus aliis aliis naturae morbis gravibus similior fit, eo curatio erit difficilior et impotentior. Praesertim quae per mercurium fit, id proprium obsert ejus actionem observantibus, quod minus efficax aut crebro nocens prima periodo, crescente ulceratione, efficax fiat ac potens, ubi callositas, sive induratio in canceris manifestatur summamque potentiam monstret, ubi infectio generalis characteristica in periodo versatur symptomatum secundi ordinis, iterum vero perdat virtutes medicatas, salutare, symptomatibus tertii ordinis existentibus idque eo magis, quo haec forma ac facie a praecedentibus magis remota sint. Itaque hoc maxime tempore, symptomatum tertii ordinis scilicet, sudorifera isthaec: decocta lignorum, roob antisyphilitica similique juvabunt, non tantum ex RICORDI, verum ex aliorum etiam testimonio.

Horum remediorum reliquis palmam praeripiunt smilax sarsaparilla et guajacum officinale, quorum illius radix quantis sit praedita viribus, docent arcana ita dicta celebratissima, sive roob ac syrupi, quibus ipsa hanc nominis famam conciliasse videtur: hujus autem lignum a primis morbi syphilitici temporibus ad nostram usque aetatem plurima medicorum experientia celebratur: minorum longe virtutum sunt china et sassafras: hoc rectius corrigentis titulo, propter aroma quo pollet, caeteris admiscetur.

Auctores priscos pervolventes incidimus in **PETRUM FORESTUM** nostratem, cujus circa lue veneream observationes guajaci miras testantur vires, quo cum cephalaeam, tum cariem veneream, tum ulcera serpentina ac nodos, tum dolores osteocopos, adjecta sarsaparilla, tum pustulas foedas sanavit. Nec tamen praetermisit, unius aegrotantis historiam referre, **Gerardi Piscatoris** est, navis gubernatoris **Brielensis**, qui frustra adhibito guajaci decocto, unguento deinde mercuriali curatus est. Ex recentioribus testis sit **CULLERIER**, Nosocomio quondam Syphiliticorum **Parisiensis** medicus, cujus ex numerosis exemplis, cum viro celebri **LAGNEAU** communicatis, hic tria memoriae tradidit: alterum matronae ex ulcere faucium laborantis, intra triginta dies ptisana, sive decocto lignorum sanatae: secundum obstetricis, morbis doloribusque ossium vehementibus vexatae, pari medicatione ac balneis curatae, duorum mensium spatio; tertium mulieris senescentis, cui ulceratione faucium et pharyngis ingenti affectae roob antisyphiliticum, una cum decocto chinae chinae, propter summam virium debilitatem addito, post tres menses curationis factae medebantur.

In Nosocomio Syphiliticorum utebantur decocto ex uncia una ras. **L. Guaj.** et duabus **Rad. Sarsapar.** cum quatuor libris aquae ad duarum librarum colat. decoctis inque malo rebeli pari utriusque remedii duarum unciarum dosi ad eandem colaturam

adhibita, aut adjectis etiam decocto una alteraque dr. essentiae sive extr. liq. sarsapar. Londinens. RICOED etiamsi de his sudoriferis minus magnifice sentiat, esse tamen conditiones fatetur, quibus recte et utiliter opponuntur, ubi cutis male munere suo fungitur, ubi mercurius vel adhiberi omnino nequit, vel perperam adhibitus seponendus est, in morbis ossium ac praecipue facta suppuratione, denique mente aegris ex syphilophobia. Inter haec primas sarsaparillae, secundas ptisanæ Feltzii (ex eadem, ichthyocolla et antimonio crudo (vid. LAG-NEAU l. l. p. 394. formularum num. 67. qui pariter ipsam laudat) tertias denique guajaco in ossium morbis praesertim efficaci tribuit. Decoctum Zittmanni, veram medicaminum farraginem, Galli minus acceptam, magnis laudibus cumulant Germaniae medici.

De antisypiliticis reliquis: auro, ammonia, opio, aut dubiae aut parvae virtutis, qui plura scire cupiant, laudatos supra auctores conferant.

Prius vero quam hunc de morbis syphiliticis locum mittamus, de duobus adhuc locis adhortandi estis: alter spectat mercurialium in corpus ejusque valetudinem vim ac potestatem: alter morbi syphilitici complicationes.

Duplex est eaque diversa mercurialium in corpus actio: altera cum nimia irritabilitate conjuncta, altera cum torpore atque atonia. Omnium optime, quoad nos quidem novimus, hosce mercuri-

rialium effectus interpretatus est vir doct. SWEDIAUR.

Aliquando morbosa corpori innascitur irritatio: ulcera fiunt stationaria, excavata, inaequalia, exedentia, pus acre plorantia; pulsu simul irregulari, crebro, celeri, vigilia, sudore nocturno, animo mobili ac si corpus nimium fuisset oxydatum, aut stimulaturn. Aliquando contra notatur debilitas, facie pallida, livida: ulcera fiunt cruenta, atonica, scorbutica, habitu corporis cachectico, ore foetente. Priori conditioni, morbosae videlicet irritabilitatis, conveniunt, ipso auctore, sulphurea, balnea, aquae minerales, sulphureae, alcalina, adstringentia, cortex denique Peruvianus. Alteri scorbuticae vero acida vegetabilia, mineralia, aquae minerales acidulatae, martiales, medicamina antiscorbutica, quae vocantur.

Tandem paralysis mercurialis, affecto genere nervorum (quam in viro observavi ex artificio) exigit antidota mercurii propria: sulphureta, corticem Peruvianum, adstringentia nervinis juncta.

Superest locus de complicationibus morbi syphilitici: scrofulosa, scorbutica, nervosa; quae fiunt malis aegrotantium rebus.

In scrofulosa complicatione juvabunt antiscrofulosa, praecipue formula Plummeri, inf. stipit. Sol. Dulcam. L. Laur. Sassafr. similia. In scorbutica primo sanandus scorbutus est, quem mercurialia redderent insanabilem, immo lethalem: et qui

dem sanandus est acidulis, acidis, victu vegetabili recenti. Atque hic quidem casus est, cui profuisse dicuntur acida, tum alia, tum imprimis nitrosum in syphilidis curatione. Status nervosus nervina requirit auxilia, nimiam sedantia mobilitatem, opiata tum sola, tum mercurialibus copulanda: ac praeterea corticem Peruvianum, quo firmandus est saepenumero corporis habitus. Atque hoc modo sua cuivis aegro aptari debebit propria medendi methodus.

Diaeta denique debilibus, infirmis nutriens sit roborans, fortioribus vero tenuis, refrigerans, oportet. Qua quidem in re valde ac crebro peccatur a medicis: qui cunctis syphiliticis praescribunt victum tenuem solaque lactinia, quibus inultos incassum ac praeter rem fatigant. Nam uti haec validioribus conferunt, quorum plethorica est, aut subphlogistica corporis conditio, ita infirmis, exhaustis, inanitis victus animalis ipsumque vinum profutura sunt.

De curatione mulierum et infantum syphiliticorum copiose exposuit LAGNEAU l. l. qui solo primo et ultimo graviditatis periodo contra-indicari curationem mercurialem animadvertit ac tenellis etiam tuto praeberi posse mercurialia dosi, ad aetatem teneram composita eosque, qui lacte materno vescuntur, curatione mixta, i. e. mercurio et matri et infanti parvis refractisque dosibus dato, tractari optime solere in Nosocomio syphiliticorum, refert.

Haec sunt Auditores optimi! quae de syphilide tradiderunt scriptores medici scitu dignissima, quatenus hujus esse loci videbantur, quae vobis ut mihi siquando non tam certa firmaque habeantur ac quidem in re tam gravi desideraretis, nobis incitamento esse poterunt, ut caste fideliterque observando nobis horum quoque morborum scientiam perficiamus: nam

*Labor omnia vincit improbus,  
Et duris ingens in rebus egestas.*

---

#### DE MORBIS ORGANICIS PROPRIE ITA DICTIS.

Finem huic operis parti, id est priori libri alterius imponam, nonnulla monendo de morbis organicis proprie ita dictis, sive ex homoioplasia, sive ex heteroplasia originem traxerint.

Ii quales sint, nostis ex pathologicis (Cff. *Initia Discipl. Patholog.* §. 220 sqq. pag. 75 sqq.) Hoc autem loco ea praesertim volo genera, quae vita plastica aberrans creat quaeque communi paratrophiae nomine comprehenduntur. Haec fiunt vel ad typum normalem, sed loco alieno, vel ad typum novum prorsus, a norma recedentem. Illud homoioplasiam, hoc heteroplasiam nuncupave-

runt: illius generis sunt metamorphosis cellulosa, fibrosa, ossea: hujus tuberculosa, scirrhusa, fungosa (§. 272.)

Harum metamorphosium historiam tradere pathologiae ac praecipue anatomes pathologicae munus est: quamvis ipsa latiori sensu pars Biologiae dicenda sit. Minus vero artis sunt, quam quidem scientiae: quoniam nemo mortalium huic paratrophiae sive homoioplasticae, sive heteroplasticae rite mederi docuit. Idcirco omnis ars humana versatur in metamorphosis istis tum praevertendis, tum coërcendis, aut saltem reliqua ab iis tuenda corporis oeconomia. Hoc duplici munere quomodo fungi possit, agite paucis declaremus.

Sunt illa vel junioris aetatis, vel senioris. Pueros ac juvenes a tuberculo, fungo et utriusque vitii malis servare optime poterimus gymnastice praesertim aptoque vitae regimine, victu nutriente, animali, motu corporis in aëte puro, munditie corporisque lotionibus, balneis omnique diaeta antiscrofulosa, quam laudavimus, vitando vitam sedentariam atque praecocia nimis aut severiora studia. Denique animorum cura, qua pulcrum, verum, bonum et amare et sequi discant ac Deum colant et venerentur. Nam in religione firmissimum valetudinis praesidium est positum.

Seniorum morbos organicos diaetetice pariter praevire in multis poterit, temperantia potissimum eaque victus moderatione, quam haec aetas exigit,



qua crescere desiit corpus. Atque hoc loco ille redarguendus error est, quo copiosiori cibo credunt valetudini prospicere homines, etiamsi evolutionis periodum transgressi sint ipsique senes corporis ex aetate infirmitati pleniore alimento mederi: quo fit, ut torpente digestionem, corpus humoribus crudis abundet iisque male nutriatur, id est ut fiat paratrophia ejusque varia genera exoriantur aut homoioplastica aut heteroplastica: cujus quidem nascentiae major metus crit, cum neque labore subigantur cibi, neque desint pristinae cachexiae, sive scrofulosae, sive syphiliticae, sive alius cujuscunque occulta in corporis penetralibus semina.

In sexu sequiori haec eo magis timenda sunt; quo laetius exuberaverit vita plastica, neque menstruis sanguinis detractionibus prudenter a medico cautum sit, ne foetus parasitici generentur.

Eam vere subesse plerisque horum vitiorum causam, palliativa curatio docet, quae idoneo maxime diaetae regimine continetur: quo quia uti vel nesciunt, vel nolunt tum medici, tum aegri, in solis medicamentis ipsisque arcanis valetudinis recuperandae spem ponentes, morbum alunt mortemque praecipitant.

Memoria, quaeso, recolite exempla feliciū curationum scrofuloseos, syphilidis, quae uni diaetae debentur, in vitam intuemini infirmorum, debiliū, qui hac sola valetudinem custodiunt morborumque incrementa cohibent: cogitate denique;

quae cura famis, sive inediae in refracnandis pertinacissimis malis mira prorsus ac praeclara perfecrit.

Nequaquam vero ex horum curatione morborum, quae ex therapeutico fonte petuntur auxilia, excludo. Sunt illa diaeteticis, quae primo loco habeo, juncta, saepenumero saluberrima.

Jam sanguinis detractiones memoravi menstruas in feminis, aetate climacterica celebrandas: neque in viris eas semper tuto neglexeritis: praesertim senioribus, tollendo plethoram abdominalem per hiru-  
dines ano admotas. Tum per evacuantia alvum, exutoria, fonticulos, setacea. Denique per antiplastica, quae dicuntur: mercurium, stibium, muriatem ammoniae, barytae, per cicutam, per jodium, similia.

Hisce quo pacto utendum sit, antea, ubi de morbo scrofuloso verba fecimus, exposuimus, ita ut jam de iis eorumque administratione inque singulis casibus delectu, dicere non opus sit. Illud tantummodo addere haud inutile existimo, ubi cum torpore sunt excitantia et validiora praestare; mercurium, barytam, similia: ubi cum erethismo sedantia ex iisque cicutam, pleniori quidem dosi; quae si non juvet, in atrocissimis carcinomatibus doloribus subinde ab opio petendum esse majorum lenimen: saepe vires nutrientibus lenioribus: lacte, lacticiniis, decocto albo sustentandas esse. Aliquando contra pugnandum antiphlogisti-

cis, ut quem intentant aut movent ea vitia renissum virium, inhi-beant, aut temperent: quod praeceptum sequendo tuberculorum pulmonalium evolutionem posse retardari, prius didicistis: unde ea nonnullorum nata firmataque opinio est, ex inflammatione nasci tubercula ipsamque phthisin omnem morbum esse inflammatorium.


Exposui breviter generalem morborum organicorum therapeuticen sicque priorem hanc alterius libri de arte medica partem absolvi.

Sequitur pars altera, quae numerosam neurosium familiam complectetur, de qua in posterum sermonem instituam.

Vos interim o amiceissimi Juvenes! sinite me paulisper otari, vosque ipsi otiamini. Nam feriae instant, quae vobis quidem studiorum remissio: mihi vero ad animum doctrina excolendum publici muneris vacatio sunt. Quare:

*Sylvestrem tenui Musam meditemur avena.*

— — *Deus nobis haec otia fecit.*





## ADDENDA ET CORRIGENDA.

pag. 45. lin. 7 laudem	<i>lege</i> : laudari
— 57. — antepenultima in nota : ecse	— esse
— 59. — 3 figerit	— : fixerit
— 81. — ult. ANT. DE HAAN	— ANT. DE HAEN
— 103. — 15 sistendam	— sistendum
— 115. — 1 et 2 vinum ge- nerosum , similia	— vino generoso , similibus
— 205. — 1 , 2 quo — quemque	— qua — quam- que
— 260. — ult. ROEDERERUM WAGLERUM	— ROEDERERUM et WAGLERUM
— 273. — Tart. vitriol. 3 β	— Tart. vitriol. 3j β
— 280. — 13 exanthematis tuberculi	— exanthematis , tuberculi
— 326. — 2 interrogavimus. Hydropicam	— interrogavimus , hydropicam
— 327. — 24 similibram	— semilibram
— 339. — 8 linpidam	— limpida
— 396. — 3 aetatis	— aestatis
— 399. — 18 coeperat	— coeperant
— 415. — 4, insignium	— insigniori
— 418. — 4 alteram	— alterum
— 430. — 21 , 22 phosphato	— phosphate

pag. 436. *lin.* antepenult. pag. 28 sqq. quae vocabula  
deleantur

— 437. —	1 REOUM	<i>lege:</i> RENUM
— 442. —	antepenult. Falkon- neri	— Falconneri
— 448. —	16 vocatis	— vocato
— — —	18 archihalassi	— Archithalassi
— 495. —	18 cauteriode	— cauterio de
— 513. —	19 FALLOPII	— GABRIELIS FAL- LOPII
— 520. —	17 ingestum; inci- piebat	— ingestum inci- piebat

































